



*Перша допомога при
переломах та вивихах.*

Виконала

учениця 10 класу

Павленко Вікторія

При переломі плеча фіксують плечовий і ліктьовий суглоб



Малюнок №1



Малюнок №2



Малюнок №3


При переломі променевої кістки в “типловому місці”

- Перш за все пошкодженій руці необхідно створити спокій. Для цього її згинають в ліктьовому суглобі під прямим кутом, а кисть повертають долонею до тулуба, дещо зігнувши пальці. Для фіксації руки в цьому положенні можна використовувати дощечки, міцний картон, декілька зв'язаних лозин (мал. №4)



Малюнок №4


При переломі ключиці



Малюнок №6

При переломі стегна


- При переломі стегна фіксують три суглоби – кульшовий, колінний і гомілковостопний (мал. №8).



Малюнок №8

При переломах ребер, кісток таза

- При переломах ребер для зменшення болю грудну клітку міцно перев'язують бинтами, рушником, простирадлом або надають потерпілому зручного для нього положення.
- При переломі кісток таза потерпілого необхідно покласти на спину на тверду рівну поверхню, зігнувши його ноги в колінах, дещо розвести їх в боки і підкласти валик під коліна (поза «жаби») (мал. №9).



При пошкодженні хребта



- При пошкодженні хребта найбільш небезпечним ускладненням є частковий або повний розрив спинного мозку. Тому потерпілого необхідно обережно покласти на рівну горизонтальну поверхню (підлога, щит, широка дошка) (мал. №10).

При пошкодженні шийного відділу



- При пошкодженні шийного відділу хребта і переломах кісток черепа потерпілого укладають на спину на жорстку поверхню, а голову і шию фіксують з боків двома валиками із згорнутої одежі, ковдри, подушок (мал. №11).

При переломі щелепи

- Переломи щелеп – розповсюджена травма. При переломі верхньої щелепи між верхніми і нижніми зубами прокладають шину (дощечку), а потім пов'язкою через підборіддя фіксують щелепу (мал. №12).



Вивих нижньої щелепи



- Надаючи допомогу стає обличчям до нього, обгорнувши великі пальці руки бинтом або матерією, вводить їх в рот потерпілого, натискаючи на кут нижньої щелепи (задні кутні зуби), зміщуючи нижню щелепу вниз і назад, одночасно рештою пальців піднімаючи підборіддя (мал. №13).

Накладання пов'язки на щелепу

- При травматичному вивихові необхідно прикрити рот потерпілого носовою хусточкою, накласти пов'язку (мал. №14), яка підтримує щелепу, і доставити потерпілого в лікарню.



Перша допомога при пораненнях

- Перш ніж почати обробку і перев'язку рани, необхідно помити руки і обробити їх спиртом. Шкіру навколо рани 2-3 рази протерти марлею або ватою, змоченою дезинфікуючим розчином, починаючи від краю рани до периферії (мал. №15).



Малюнок №15

- Надаючи першу допомогу при пораненнях, не можна:
 - ◆ промивати рану спиртом, розчином йоду, це може викликати опіки;
 - ◆ відривати прилиплі шматочки одягу;
 - ◆ засипати рану ліками у вигляді порошків, змащувати її будь-якими мазями або маслом;
 - ◆ класти вату безпосередньо в рану;
 - ◆ видаляти сторонні тіла, а при випаданні внутрішніх органів – вправляти їх в рану (можна тільки закрити їх стерильним матеріалом).

Дякую за увагу!

