

Общая психопатология

часть 5

патология влечений и воли

Сферы психической деятельности

человека

1. Чувственное познание (ощущение и восприятие)
2. Мышление
3. Память и внимание
4. Интеллект
5. Эмоции
- 6. Воля и психомоторная сфера**
- 7. Влечения**
8. Сознание

Влечения –

- неосознанная, но целенаправленная деятельность человека (основаны на инстинктах).

Инстинкты:

- Пищевой
- Самосохранения
- Половой

Нарушения:

- Усиление
- Ослабление
- Извращение

Импульсивные влечения

Расстройства пищевого влечения (пищевого поведения)

- Усиление – **БУЛИМИЯ** (повышенное влечение к пище, повышенное и неутолимое чувство голода)
- Ослабление – **АНОРЕКСИЯ** (утрата чувства голода)
- Извращение – поедание несъедобного

Данные расстройства могут быть при:

- Соматических заболеваниях (эндокринная патология, опухоли; у беременных – поедание глины, извести)
- Психических заболеваниях (психическая анорексия - при бреде отравления, вкусовых галлюцинациях, депрессии, кататонии)
- Нервной анорексии – самостоятельное заболевание, выражающееся в сознательном стойком стремлении к похуданию, часто достигающему выраженной кахексии с возможным летальным исходом. В основе - дисморфомания с болезненной убежденностью в излишней полноте. Может сопровождаться приступами булимии.

Расстройства инстинкта самосохранения

- *Усиление* – страх смерти и/или болезней, **агрессия** (активное устранение опасности)

- *Ослабление* – **аутоагрессия**, **самоубийства**

- *Россия:* по числу суицидов **3 место** в мире (после Литвы и Белоруссии); **36 чел/100тыс в год** (2007г), норма ВОЗ – **10**; с 1995 по 2003г **500 тыс человек в РФ** покончили с собой!

■ **Суицид:**

- **Истинный** – хорошо спланированное действие с целью лишить себя жизни

- **Демонстративный** – на глазах у окружающих для привлечения их внимания, с возможностью спасения, но может не рассчитать!

- **Скрытый** – аутодеструктивное поведение (пьянство, курение, отказ от медицинской помощи, пренебрежение ПДД, экстремальный спорт)

Расстройства полового влечения

- *Усиление* – гиперсексуальность:
нимфомания (у женщин), сатириазис (у мужчин)
- *Ослабление* – гипосексуальность:
фригидность, импотенция
- *Извращение* – фетишизм,
эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия,
садомазохизм и пр.

Импульсивные влечения (1)

- внезапно возникающие неодолимое
- стремление к совершению какого-либо
- действия, реализующиеся без
- сопротивления и борьбы мотивов, хотя и с последующей критической оценкой.
- **Навязчивые влечения,** в отличие от импульсивных, никогда не реализуются.

Импульсивные влечения (2)

- **Дипсомания** – импульсивное влечение к употреблению алкоголя, проявляется в виде повторяющихся запоев. В промежутках между алкогольными эксцессами признаки психической и физической зависимости не выявляются.
- **Дромомания** – импульсивное влечение к бродяжничеству, уходы из дома.
- **Пиромания** – импульсивное влечение к поджогам.
- **Клептомания** – импульсивное влечение к краже предметов. Хищение вещей часто происходит без подготовки и принятия мер предосторожности. Похищенные вещи не используются по назначению, отсутствует материальная заинтересованность.
- **Копролалия** — непреодолимое стремление употреблять в речи циничные ругательства (болезнь Жюль де Турета)

Воля

– целенаправленная сознательная психическая деятельность

Этапы волевого процесса:

- возникновение побуждения
- борьба мотивов,
- принятие решения,
- исполнение решения.

Нарушены могут быть различные этапы волевого процесса.

Патология воли

- **Гипербулия** – болезненно повышенная волевая активность. Любые идеи сразу реализуются, этап борьбы мотивов отсутствуют, что приводит к необдуманным, скоропалительным действиям (характерно для мании).

- **Гипобулия** – болезненное понижение волевой активности, вплоть до ее отсутствия (**абулия**).

Парабулии – извращение волевой активности, сюда относятся кататонические симптомы (след слайд)

Кататонический синдром

- психопатологический синдром основным клиническим проявлением которого являются двигательные расстройства (*от греч. katátonos - напряженный*)
 - выделяют кататоническое **возбуждение** и
 - кататонический **ступор** (*см. след. слайд*)
- кататония может быть **люцидной** (не сопровождается помрачением сознания) и **онейроидной** (сопровождается онейроидным помрачением сознания)

Кататонический синдром (2)

1. кататонический ступор - *обездвиженность с повышением мышечного тонуса* . Может сопровождаться:

- *мутизмом* (отказ от речи при сохранности речевого аппарата)
- *негативизмом* (бессмысленное противодействие, немотивированный отказ от действий (пассивный Н.) или выполнение противоположных действий (активный Н.)

2. кататоническое возбуждение - *немотивированное, бессмысленное двигательное возбуждение*. Может сопровождаться:

- *стререотипиями* (бессмысленное, монотонное повторение действий или слов)
- *эхо-праксией* (нелепое, немотивированное повторение действий окружающих)

Виды кататонического ступора и возбуждения

Ступор

ступор с восковой гибкостью – повышение мышечного тонуса вследствие чего тело больного может длительное время поддерживать неудобное положение, любое изменение позы сохраняется продолжительное время (*каталепсия*, с-м «воздушной подушки» и пр.)

ступор с негативизмом – мышечное напряжение с противодействием всем попыткам изменить позу

ступор с оцепенением – эмбриональная поза и резкое

Возбуждение

-экстатическое – подвижны, много говорят, с патетикой, экстазом, декламируют стихи

-гебефреническое – преобладает дурашливость, нелепые действия, немотивированная веселость.

-импульсивное – неожиданные, внезапные действия, часто разрушительного и агрессивного характера

-немое – двигательное неистовство с агрессией и разрушительными действиями направленными на себя и окружающих. Возникает внезапно, в т.ч. при переходе из

Гебефренный синдром

- в клинической картине преобладает гебефренический тип кататонического возбуждения (характерны примитивные, дезорганизованные формы поведения: дурашливость, гримасничанье, расторможенность влечений, больные прыгают, кривляются, пляшут, неуместно шутят, нецензурно бранятся, могут проявить немотивированную агрессию).

Часто развивается в подростковом возрасте (*Геба – богиня юности*), синдром характерен для гебефренной шизофрении.

Состояния психомоторного возбуждения

Маниакальное – двигательное возбуждение при

- маниакальном синдроме

- **Тревожное** — характерно для тревожной депрессии; в виде метаний, причитаний, стонов, взываний о помощи, заламывания рук, возможны неожиданные аутоагрессивные действия

- **Галлюцинаторное** – вызвано галлюцинаторными переживаниями угрожающего или устрашающего характера. Целиком определяется содержанием галлюцинаций. Характерен выраженный страх, оборонительное поведение. Наиболее характерно для делирия и сумеречного помрачения сознания.

Бредовое – целиком определяется характером

- бредовых идей и отражает их содержание

- **Эпилептическое** – сопутствует дисфории

Кататоническое – (описано в рамках кататонического