

Первая помощь при кровотечениях

Подпишите работу
Исправления считаются за ошибку

УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!

ГОТОВЫ?



**При ранении сонной артерии
необходимо срочно:**

А- наложить тугую повязку.

Б- наложить жгут.

**В- зажать пальцем артерию ниже
раны.**

**При ранении кровь течёт
непрерывной струёй. Это
кровотечение**

А- Паренхиматозное

Б- Венозное.

В- Капиллярное.

Г- Артериальное..

**Самым надежным способом
остановки кровотечения в случае
повреждения крупных
артериальных сосудов рук и ног
является:**

А- наложение давящей повязки;

Б- пальцевое прижатие;

В- максимальное сгибание
конечности;

Г- наложение жгута;

**При открытом переломе
конечности с сильным
кровотечением раны необходимо в
первую очередь:**

А – Обработать край раны йодом;

**Б – Провести иммобилизацию
конечности;**

**В – Промыть рану перекисью
водорода;**

Г – Остановить кровотечение.

Жгут накладывается:

**А- При капиллярном
кровотечении.**

**Б. При артериальном и венозном
кровотечении.**

**В. При паренхиматозном
кровотечении.**

**Как правильно выбрать место
наложения
кровоостанавливающего жгута при
артериальном кровотечении?**

А- наложить жгут на обработанную рану;

Б- выше раны на 10-15 см;

В- на 15-20 см ниже раны;

Г- на 20-25 см ниже раны;

Д- ниже раны на 30 см.

Вместо жгута можно использовать:

А- Давящую повязку.

Б- Закрутку.

В- Холод к ране.

Г- Компресс

Вместо жгута можно использовать:

А- Давящую повязку.

Б- Закрутку.

В- Холод к ране.

Г- Компресс

При оказании первой помощи в случае перелома запрещается:

А- проводить иммобилизацию повреждённых конечностей;

Б- вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость;

В- останавливать кровотечение

Вот и всё 😊

Спасибо за работу.