

Правила выписывания твердых и мягких лекарственных форм

Инскрипция

Кафедра фармакологии и
биоинформатики
взрослый/~~детский~~

1.09.2020

Ф.И.О.(пациент) Иванов И.И.

Возраст: 35 лет

Ф.И.О.(врач) Таран А.С.

Твердые лек.формы.

Порошок
(Pulvis):
простой
(состоит из
одного
вещества),
сложный
(состоит из 2 и
более
ингредиентов)

Таблетка
(Tabuletta)

Драже
(Dragee)

Капсула
(Capsula)

Порошки (Pulv.)

Rp.: Действующее вещество (в родит. падеже) **Доза** (в граммах)

D.S. Описание приёма (кратность, количество, время...)

Выписать: 10 г анестезина (Anaesthesinum). Присыпка.
Rp.: Anaesthesini_{10,0} -um → -i

D.S. Присыпка.

#

Выписать: 100,0 г порошка, содержащего 5% салициловой кислоты (Acidum salicylicum), 20% окиси цинка (Zinci oxydum) и 75% талька (Talcum). Для присыпки.

Rp.:	Ac. salicylici	5,0
	Zinci oxydi	20,0
	Talci	75,0

M.f.pulv.

D.S. Присыпка.

*Misce ut fiat – Смешай,
чтобы образовалось*

#

Основные правила

Пропись порошка растительного происхождения (коры, листьев, травы, корня...) начинают с указания лекарственной формы порошка (Pulv.).

Пример:

Rp.: Pulv. rad. Rhei ... (порошок корня ревеня)

Если порошок синтетического происхождения, то лекарственную форму не указывают.

Пример:

Rp.: Calcii gluconatis ...

При выписывании лекарственных веществ, доза которых очень мала, добавляют индифферентные вещества, например, сахар (Saccharus)

Растительного происхождения	Синтетического происхождения
$m \leq 0,05$	$m \leq 0,1$
Sacchari 0,3	

Выписать: 6 порошков корны ревеня (Pulvis radicis Rhei)
разовая доза 0,5. Принимать по 1 порошку в день.

Rp.: Pulv. rad. Rhei 0,5

D.t.d.N. 6

S. По 1 порошку в день.

*Da tales doses numero –
Выдать такие дозы
числом*

#

Выписать: 15 порошков глюконата кальция (Calcium gluconas), разовая доза 0,5. По одному порошку 3 раза в день.

Rp.: Calcii gluconatis 0,5

D.t.d.N. 15

S. По 1 порошку 3 р/д.

#

Выписать: 20 порошков димедрола (Dimedrolum), разовая доза 0,05. По одному порошку 3 раза в день.

Rp.: Dimedroli 0,05

Sacchari 0,3

M.f.pulv.

D.t.d.N. 20

S. По 1 порошку 3 р/д.

#

Выписать: 12 порошков, содержащих солянокислый папаверин (Papaverini hydrochloridum), разовая доза 0,01.
По одному порошку 3 раза в день.

Rp.: Papaverini hydrochloridi 0,01

Sacchari 0,3

M.f.pulv.

D.t.d.N. 12

S. По 1 порошку 3 р/д.

#

Выписать: 20 порошков, содержащих эуфиллин (Euphyllinum), разовая доза 0,15. По одному порошку 3

раза в день.
Rp.: Euphyllini 0,15

D.t.d.N. 20

S. По 1 порошку 3 р/д.

Выписать: 15 порошков, содержащих кофеин (Coffeinum) по 0,02, парацетамола (Paracetamolium) и Анальгина (Analginum) поровну по 0,1. По одному порошку при

головной боли
Rp.: Coffeini 0,02

Paracetamoli

Analgini aa 0,1

M.f.pulv.

D.t.d.N. 15

S. По 1 порошку 3 р/д.

Выписать: 10 порошков, фенобарбитала
(Phenobarbitalum), разовая доза 0,1 в воощаной бумаге. По
одному порошку 2 раза в день.

Rp.: Phenobarbitali 0,1

D.t.d.N. 12 in ch. cer.

*in charta cerata – в
воощаной бумаге*

S. По 1 порошку 2 р/д.

#

Выписать: 12 порошков, оксациллина натрия
(Oxacillinum-natrium), разовая доза 0,25. 3-4 раза в день.

Rp.: Oxacillini-natrii 0,25

D.t.d.N. 12

S. По 1 порошку 3-4 р/д.

#

Таблетки (Tabl./in tab.)

Выписать: 30 таблеток кальция пантотената (Calcii pantothenas), разовая доза 0,1. По одной таблетке 2 раза в день.

Rp.: Calcii pantothenatis 0,1

D.t.d.N. 30

S. По 1 порошку 2 р/д.
#

Rp.: Calcii pantothenatis 0,1

D.t.d.N. 30 in tab.

S. По 1 таблетке 2 р/д.
#

Rp.: Tabl.Calcii pantothenatis 0,1

D.t.d.N. 30

S. По 1 таблетке 2 р/д.

Выписать: 20 таблеток покрытых оболочкой,
содержащих ибупрофен (Ibuprofen), разовая доза 0,2.
Принимать 3 раза в день после еды.

Rp.: Ibuprofeni 0,2

D.t.d.N. 50 in tab. obd.

S. По 1 таблетке 3 р/д.

#

Rp.: Tabl. Ibuprofeni obd. 0,2

D.t.d.N. 50

S. По 1 таблетке 3 р/д.

#

Выписать: 20 драже бромгексина (Bromhexinum), разовая доза 0,008. Принимать по 1 драже 2 раза в сутки.

Rp.: Dragee Bromhexini 0,008

D.t.d.N. 20

S. По 1 драже 2 р/д.

#

Выписать: 30 официальных жевательных таблеток Бифиформа (Bifiform). Принимать по 1 таблетке 2-3 раза в сутки независимо от приема пищи.

Rp.: Tabl. «Bifiform» 0,2 N. 30

D.S. По 1 таблетке 2-3 р/д.

#

Выписать: 20 таблеток, содержащих тетрациклина
(Tetracyclinum) с нистатином (Nystatinum) по 100000 ЕД.
Назначить по ½ таблетки 6 раз в день

Rp.: Tetracyclini
Nystatini \overline{aa} 100000ЕД
D.t.d.N.20 in tab.
S. По 1/2 таблетки 6 р/д.

#

Мягкие лек.формы.

Мазь
(Unguenta)

Паста
(Pastae)

Свеча
(Suppositorium)

Порошок
(1 или более
действующих
веществ)
+
мазевая основа
(Vaselinum /
Lanolinum)

Порошок
(25-60% от всей
пасты, если
действующего
вещества не хватает,
добавить Talcum/
Zinci oxydum/
Amylum)
+
мазевая основа

Порошок
(1 или более
действующих веществ)
+
основа
(Oleum Cacao)

Выписать: 5,0 5% мази ацикловира (Aciclovirum). Для нанесения на пораженные участки кожи 5 раз в сутки

Rp.:	Acicloviri	0,25	5,0 – 100%
	Vaselini	ad 5,0	X - 5%
			$X=5,0*5/100$
	M.f.ung.		X=0,25

D.S. На пораженные участки
кожи 5 р/д.

#

Rp.:

Ung.Acicloviri	5%-5,0
----------------	--------

D.S. На пораженные участки
кожи 5 р/д.

#

Выписать: 15,0 мази, содержащей бетаметазон (Betamethasonum) 0,0005, гентамицина (Gentamicinum) 0,001 и клотримазола (Clotrimasolum) 0,01. Наносить на пораженные участки кожи.

Rp.: Betamethasoni 0,0005
Gentamicini 0,001
Clotrimasoli 0,01
Vaselini ad 15,0

M.f.ung.

D.S. На пораженные участки
кожи.

#

Выписать:10,0 мази, содержащей 0,25% оксалина (Oxolin).
Наносить на слизистую носа утром и вечером.

Rp.: Oxolini 2,5 10,0 – 100%
Vaselini ad 10,0 X - 0,25%
M.f.ung. X=10,0*0,25/100
X=2,5

D.S. На слизистую носа.

#

Rp.: Ung.Oxolini 0,25%-10,0

D.S. На слизистую носа.

#

Выписать: 50,0 пасты, содержащей 5% бензокаина (Benzocainum). Для нанесения на пораженные участки кожи.

Rp.: Benzocaini 2,5
Amyli 25,0
Vaselini ad 50,0
M.f.pasta.
D.S. На пораженные участки. #

50,0 – 100%

X - 5%

$X = 50,0 * 5 / 100$

X=2,5

В пасте сухого вещества
25-60%!

20% = 10,0

50%=25,0

55%=27,5

Выписать: 50,0 пасты, содержащей 2% салициловой кислоты (Ac.salicylicum), 25% окиси цинка (Zinci oxydum), 25% крахмала (Amylum). Наносить на раневую поверхность.

Rp.:	Ac.salicylici	2,5	50,0 – 100%
	Zinci oxydi		X - 5%
	Amyli	aa 12,5	Y – 25%
	Vaselini	ad 50,0	X=50,0*5/100
	M.f.pasta.		X=2,5
			Y=50*25/100
			Y=12,5

D.S. На раневую поверхность.

Выписать: 25,0 официальной грамицидиновой пасты (Pasta Gramicidini).

Rp.: Past. Gramicidini 25,0

D.S. На раневую поверхность.

Выписать:10 ректальных свечей, содержащих диклофенак натрия 0,05 (Diclofenac-natrium). По 1 свече 2 раза в сутки в прямую кишку.

Rp.: Diclofenac-natrii 0,05

Ol.Cacao 3,0

M.f.supp.rect.

D.t.d.N. 10

S. По 1 свече 2 р/д.

#

Выписать:10 вагинальных свечей, содержащих 500000ЕД нистатина (Nystatinum). По 1 свече во влагалище.

Rp.: Nystatini 500000ЕД

Ol.Cacao 4,0

M.f.supp.vag.

D.t.d.N. 10

S. По 1 свече.

Выписать:10 официальных ректальных свечей с анестезином (Anaesthesinum). По одной свече при боли.

Rp.: Supp.rect. cum Anaesthesino N.10

D.S. По одной свече при боли.

Разные лек.формы.

Выписать: 30 глазных пленок, содержащих пилокарпина гидрохлорид (Membranulae ophthalmicae cum Pilocarpini hydrochlorido).

По одной пленке за край нижнего века.

Rp.: Membranulas ophthalmicas cum
Pilocarpini hydrochlorido N.30

D.S. По одной пленке за край нижнего
века. #

Выписать: Одну упаковку аэрозоля «Каметон» (Cametonum). По 3 ингаляции в день.

Rp.: Aerosolum «Cametonum» N.1

D.S. По 3 ингаляции в день.

