



ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА И ОРВИ У ДЕТЕЙ

Мирсадыкова Х
Группа: 611

Ремантадин

- ✓ Форма выпуска. Таблетки, 50мг.
- ✓ Применяется при лечении:
 - вирус гриппа А; • герпес;
- ✓ Фармакологическое действие. Наиболее результативен при приеме в первый день появления симптомов гриппа. Поступая в организм, наносит «точечный удар» по вирусу, мешая его размножению. Стимулирует иммунную систему, способствует увеличению синтеза интерферона.
- ✓ Схема приема препарата. Препарат принимают на полный желудок. Для взрослых: - 1,2,3 день – 2 таблетки (100 мг) после завтрака, обеда и ужина; - 4 день – 2 таблетки после завтрака. Детям младше десяти лет: курс лечения составляет 5 суток. Необходимо рассчитать дозу. В день она должна составлять 5 мг на 1 кг веса ребенка. Принимать препарат от двух до трех раз в день.



Тамифлю (Осельтамивир)

- ✓ Форма вып: таб, кап (30 мг; 45 мг; 75 мг), порошок для разведения суспензии.
- ✓ Назначение: - детям в возрасте от 1 года;
- взрослым
- ✓ Фармакологическое действие. Всасываясь из ЖКТ, проникает в кровеносную систему. Активным метаболитом препарата является осельтамивира карбоксилат, под воздействием которого подавляется синтез нейраминидазы вируса и останавливается возможность выхода новых составных вируса из пораженных клеток. Дальнейшее размножение вируса исключено.
- ✓ Схема приема: Препарат принимают после еды. Для взрослых: - по 1 капсуле (75 мг) два раза в сутки.
Для детей суспензия (порошок разводят в соотношении 12 мг:1 мл): - от 1 года до 3 лет – по 30 мг два раза в сутки; - от 3 лет до 6 лет – по 45 мг два раза в сутки; - от 7 лет до 12 лет – по 60 мг два раза в сутки.
Продолжительность лечения составляет пять дней.



Реленза (Занамивир)

- ✓ Форма выпуска. Порошок для проведения процедуры ингаляции (флакон содержит 5 ротадисков и 4 ячейки). В комплектующие части препарата входит Дискхалер (ингалятор). Однократная доза – 5 мг.
- ✓ Назначение: Детям в возрасте от пяти лет и старше, и взрослым людям.
- ✓ Применяется: Лечение и профилактика вирусов гриппа типа А и типа В.
- ✓ Фармакологическое действие. Активно подавляет вирусные инфекции, способствует их полному уничтожению.
- ✓ Схема приема: • при лечении - по две процедуры два раза в сутки в течение пяти дней;
- ✓ *Препарат Реленза применяют только ингаляционно!*



АМИКСИН (Тилорон)

✓ Форма выпуска. Таблетки по 125 мг (для взрослых), по 60 мг (для детей).



✓ Назначение: - для взрослых людей для лечения и профилактических мер против вирусных заболеваний; - детский возраст от 7 лет и старше исключительно для лечения. В профилактических целях препарат не назначают.

✓ Применяется при лечении: - вирусы гриппа типа А и типа В; - вирусные гепатиты; - ОРВИ.

✓ Фармакологическое действие. Препарат уничтожает вирусы, лишает их возможности дальнейшего размножения. Увеличивает продуктивность интерферона в организме человека.

✓ Схема приема: Для взрослых: в первые 2 дня лечения принимать по 1 таблетке (125 мг) один раз в день. Далее, принимается по 1 таблетке через сутки в течение 7 - 10 суток.

Для детей: в первые два дня – по 1 таблетке (60 мг) один раз в сутки. Далее – по 1 таблетке чередуя через сутки. Курс лечения составляет шесть дней.

Циклоферон

- ✓ Препарат комбинированного действия: противовирусный, иммуностимулирующий. Действующим веществом является Меглумина акридоацетат.
- ✓ Форма выпуска. Таблетки, мазь, растворы для в/м и в/в введения.
- ✓ Назначение: - раствор для в.м введения детям от четырех лет и старше; - мазь только для взрослой возрастной категории; - таблетки (150 мг) детям.
- ✓ Применяется при лечении: - герпетическая инфекция; - вирусы гриппа; - ОРВИ.
- ✓ Схема приема: один раз в день до приема еды. Для взрослых и детей старше 12 лет: по 3-4 таблетки. Для детей: • от 4 лет до 6 лет по 1 таблетке; • от 7 лет до 11 лет по 2 таблетки. Препарат применяют в течение двух дней постоянно, в последующие приемы – через один день, далее – один раз через три дня.



Арбидол

- ✓ Форма выпуска. Капсулы (100 мг) и таблетки (50 мг).
- ✓ Назначение: • детям от 3 лет; • взрослым
- ✓ Применяется при лечении : • вирусы гриппа А и В; • коронавирусов; • ОРВИ;
- ✓ Фармакологическое действие. - не дает вирусу попасть в клеточную оболочку мишени; - способствует выработыванию собственного интерферона в организме.
- ✓ Схема приема. Принимать препарат до еды, через каждые 6 часов. Для взрослых: по две капсулы четыре раза в течение суток. Для детей: • от 3 лет до 6 лет – по одной таблетке (50 мг) четыре раза в сутки; • от 6 лет до 12 лет – по одной капсуле (100 мг) четыре раза в сутки; • от 12 лет – по две капсулы (200 мг) четыре раза в сутки.



Эргоферон

- ✓ Форма выпуска: таблетки и раствор для приема внутрь(100 мл).
- ✓ Фармакологическое действие: Эргоферон содержит в себе основные действующие компоненты, которые подавляют активность биологически активных соединений, которые синтезируются клетками иммунной системы. За счет этого реализуется : противовирусное действие, иммуномодулирующий эффект, антигистаминное действие, противовоспалительное действие.
- ✓ Схема приема: Таблетки предназначены для рассасывания. Раствор принимают при помощи ложки, объем для разового приема составляет 5 мл. Средняя рекомендуемая дозировка для лечения вирусных инфекций составляет 1-2 таблетки или 5-10 мл раствора в первые 2 часа через каждые 30 минут. Затем в течение 1-х суток выполняется еще 3 приема препарата через примерно одинаковые промежутки времени. Дальше принимается 1 таблетка или 5 мл раствора 3 раза в день до полного выздоровления.

