

# Основы защиты населения в быту

Действия при укусе  
дикими животными и  
насекомыми

# Ранения дикими животными



## Крупные хищники

встречаются довольно редко  
звери, как правило, чуют  
человека задолго до того,  
как он сможет их увидеть, и,  
за редким исключением,  
всегда стараются уйти с его  
дороги.



Однако, если потревожить животное, преследовать его или ранить, оно может стать опасным. Опасны дикие животные и потому, что они иногда являются переносчиками различных заболеваний – **бешенство, грибковые, глистные и др.**





**Бешенство** (рабиес (лат. rabies) - гидрофобия, водобоязнь) - острое инфекционное заболевание, возникающее после укуса зараженного животного, протекающее с тяжелым поражением нервной системы и заканчивающееся, как правило, смертельным исходом.

# Профилактика нападения

## **ЖИВОТНОГО:**

При случайной встрече с крупным зверем нужно дать ему возможность скрыться. Иногда помогает крик, свист, огонь.

# Первая помощь при укусах

При оказании первой помощи пострадавшему от укуса животного не следует стремиться к немедленной остановке кровотечения, т.к. оно способствует удалению из раны слюны животного.



Рану промывают мыльным раствором, кожу вокруг нее обрабатывают раствором антисептического средства (спиртовым раствором йода, раствором марганцовокислого калия, этиловым спиртом и др.), а затем накладывают стерильную повязку. Пострадавшего доставляют в травматологический пункт или другое лечебное учреждение. Вопрос о проведении прививок против бешенства решает врач.



## Укус ядовитых змей и насекомых



Основной сезон, когда возможны укусы змей период времени с мая по сентябрь, что объясняется наступлением жары, когда активность змей усиливается.

Наиболее активный период у ядовитых змей во второй половине августа и сентябре - они сползаются к месту зимовки. Нарушать покой змей в этот период крайне опасно. Перед зимовкой змеи агрессивны, могут напасть.

Чтобы предупредить укус змеи, следует знать условия их местообитания и образ жизни. Змеи распространены в заболоченных местах, болотах, около заросших озер и прудов, в горах и пустынях. Являясь ночными животными, днем они прячутся в старых пнях, в копнах сена, под камнями или стволами деревьев. Поэтому эти предметы лучше не трогать голой рукой, а пользоваться палкой. В значительной мере предохраняет от укуса ботинки с высокими рантами и манжетами или толстый шерстяной носок.

# Первая помощь при укусе змеи



Крайне важно, чтобы пораженная конечность оставалась неподвижной, поскольку движения усиливают лимфоотток

(змеиный яд, всасывается именно через лимфатические сосуды), для этого конечность должна быть зафиксирована шиной или фиксирующей повязкой.



Противопоказаны прижигания места укуса, обкалывание его любыми препаратами, разрезы и другие локальные воздействия.



Наложение жгута на пораженную конечность, как правило, противопоказано, так как усугубляет тяжесть интоксикации.

Необходимо пить много жидкости, чай или кофе, для удаления змеиного яда из организма через почки, потовые железы. Алкоголь во всех видах строго противопоказан. Неоднозначно мнение о том, стоит ли отсасывать яд ртом из ранки. Для этого лучше использовать маленькую банку или пузырек.

Создайте разряженное пространство в полости банки, поднеся пламя, и быстро наложите банку горлышком на рану».



## Укус лесных клещей



Лесной клещ - это маленький паразит, переносящий вирусы клещевого энцефалита - острого и тяжелого воспаления центральной

нервной системы, сопровождающегося высокой температурой, сильнейшими головными болями, рвотой, судорогами, параличами.

# Профилактика укусов клещей

Важное значение имеет походная одежда. Это заправленная в брюки штормовка или плотная рубаша, обшлага которой рекомендуют делать на двойных резинках. На маршруте рекомендуется через каждые 2-3 часа осматривать открытые части тела, а при остановке на большой привал (днем и вечером) проводить полный осмотр одежды и тела.

## Первая помощь при обнаружении клеща



Ошибочное мнение – использовать масло, т. к. клещ, задыхаясь, активно выбрасывает

инфицированную слюну, и риск заразиться возрастает.

Удалить с помощью пинцета. При этом важно не раздавить его и не оставить в ранке головку. Рану обработать спиртовым раствором. Обратиться к врачу.



Спасибо за внимание !