



ЗАЙКАНИ
Е

Заикание – это нарушение темпа, ритма и плавности устной речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата.





Причины :

- Определённый возраст ребёнка;
- Состояние центральной нервной системы;
- Индивидуальные особенности протекания речевого онтогенеза;
- Особенности формирования функциональной асимметрии мозга;
- Наличие психической травмы;
- Генетический фактор

Можно перечислить ещё целый ряд факторов, которые могут предшествовать появлению заикания:

- Соматическая ослабленность;
- Неправильные формы воспитания;
- Аномальные черты характера;
- Неблагоприятная социальная среда и т.

Д.


Определенный возраст ребенка

Первые признаки заикания появляются в возрасте 2-6 лет. Имеются лишь единичные случаи, когда заикание появлялось после 7 лет. Наиболее часто заикание появляется в период формирования развёрнутой фразовой речи.



Состояние центральной нервной

СИСТЕМЫ



Нередко у заикающихся отмечается органическое поражение мозга резидуального характера, а у части детей не обнаруживается. В то же время поведение детей характеризуется, как повышенная впечатлительность, тревожность, низкий уровень адаптации к новым условиям, что свидетельствует о функциональных отклонениях в состоянии центральной нервной




Индивидуальные особенности протекания речевого онтогенеза

Появление развёрнутой фразовой речи к 1,6-1,8 года жизни делает формирующуюся функциональную систему речи более ранимой. В этот период речевого развития имеет большое значение поведение взрослых, окружающих ребёнка. Фиксация внимания ребёнка на итерациях может провоцировать появление заикания.

Особенности формирования функциональной асимметрии м

Электрофизиологические исследования свидетельствуют о том, что у заикающихся нарушается ведущая роль левого полушария в организации устной речи. Ослабление гармонического взаимодействия между симметричными структурами мозга у заикающихся делает такую ЦНС особо ранимой, что, в первую очередь, отражается на их речевой функции.





Наличие психической травматизации.

Многочисленные авторы связывают появление заикания с перенесённой психической травмой. В большинстве случаев психическая травма является пусковым моментом в возникновении заикания. Именно вскоре после перенесения острой психической травмы или на фоне хронических конфликтных ситуаций у многих детей появляются запинки судорожного характера.



Генетический фактор

Если среди близких родственников имеется хотя бы один заикающийся, то риск появления заикания в последующих поколениях резко возрастает, в особенности, если заикаются родители. По-видимому, по наследству передается определенная слабость центральных речевых механизмов, которые повышено подвержены воздействию факторов риска. Генетическая наследственность той или иной патологии проявляется, как правило, только при наличии дополнительной вредности.

Половой деформизм



У мальчиков заикание встречается в среднем в 4 раза чаще, чем у девочек. Предполагается, что у девочек в более сжатые сроки формируются моторные функции: они начинают раньше мальчиков ходить, говорить, тонкая моторика пальцев рук и речевые артикуляции у них также формируются быстрее. Возможно, в связи с эти речедвигательные механизмы у девочек более устойчивы к экзогенным вредоносным влияниям.

Разумеется, перечисленные
этиологические факторы не исчерпывают
всех причин, с которыми может быть
связано появление заикания.

Однако, здесь выделены те факторы,
которые играют прямую или косвенную
роль в возникновении заикания по
данным современных многочисленных
исследований.



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**