

**Съедобные грибы.**

# Съедобные грибы.

- Белый гриб
- Подберёзовик
- Подосиновик
- Сыроежка
- Волнушка
- Лисички
- Опята
- Масленок
- Шампиньоны
- Груздь



# Подберезовик.

- Произрастает в лиственных и смешанных лесах. Часто встречается с конца мая до поздней осени.
- Шляпка до 10 см в диаметре, сначала выпуклая, позднее подушковидная, белого, бурого, жёлтого, коричневого цветов. Мякоть белая, не изменяющаяся на разрезе.
- Ножка до 20 см длины, 2-3 см толщины, белая, покрыта тёмными чешуйками.
- Наиболее распространённые виды: подберёзовик обыкновенный, розовеющий, болотный, чёрный.



# Белый гриб.

- Произрастает в лиственных и хвойных лесах, одиночно или группами.
- Шляпка до 25см в диаметре, вначале полушаровидная, позднее подушковидная, от светло-бурой, до жёлто-бурой, сухая, гладкая. Мякоть белая, на разрезе не изменяется.
- Ножка до 17см длины, 2-5 см толщины.
- Наиболее распространённые формы белого гриба: гриб белый



# Подосиновик.

- Произрастает в лиственных и смешанных лесах, особенно в молодых осинниках. Часто встречается со второй половины июня до октября.
- Шляпка до 25см в диаметре, вначале колпаковидная с прижатыми к ножке краями, позднее подушковидно-выпуклая, ярко-красная, оранжевая, белая, серая, бархатисто-волокнистая, гладкая. Мякоть белая, плотная, толстая, на разрезе краснеющая, потом зеленеющая, и затем чернеющая.
- Ножка до 20см длины, 2.5см толщины, цилиндрическая, беловато-серая, покрыта чёрными волокнистыми чешуйками.



# Сыроежка.

- Произрастает в лиственных и хвойных лесах. Появляется в июле. Растёт одиночно и небольшими группами.
- Шляпка до 13см в диаметре, сначала выпуклая, потом становится расплостёртая, оранжево-жёлтая, красная, Мякоть белая, на вкус пресная, без запаха.
- Ножка до 10см длины, до 3см толщины.
- Наиболее распространённые виды: сыроежка зелёная, ломкая, болотная, жёлтая, сереющая, буреющая.



# Волнушка.

- Произрастает в лиственных и смешанных лесах, под берёзами, с июня по октябрь. Очень урожайный и широко распространённый гриб.
- Шляпка до 15см в диаметре, розовая или розовато-красная, шерстисто-волокнистая, с завёрнутым, лохматым краем, в середине вдавленная.
- Мякоть рыхлая, очень острого вкуса. Сок у розовой волнушки белый, горький.
- Ножка до 7см длины, до 2см толщины, ровная или к низу суженная, полая, гладкая, бледно-розовая.



# Лисичка.

- Один из самых популярных грибов. Встречается в хвойных и лиственных лесах, произрастает чаще семьями, редко одиночно, с июля до октября.
- Гриб яично-жёлтый или светло-жёлтый выцветающей окраски.
- Шляпка мясистая, плотная, у молодых грибов выпуклая, часто плоская, с завёрнутыми краями. У зрелых шляпка воронковидная, с волнистыми краями, от 5 до 10см в диаметре. Мякоть гриба вначале желтоватая, потом белеющая, сухая, плотная, упругая.
- Ножка сросшаяся со шляпкой, плотная, жёлтая, гладкая, 4-7см длины, 2-4см толщины, цилиндрическая, вверху расширенная, книзу суженная, сплошная. Споры бесцветные гладкие. Вкус гриба острый, запах приятный.



# Опенок.

- Произрастает на пнях, живых и валежных стволах. Появляется в конце августа или в начале сентября и растёт до осенних морозов, большими колониями.
- Шляпка до 10-15см в диаметре, вначале выпуклая, почти шаровидная, потом плоская, затем расправляются. Кожица буроватая, серо-коричневая, жёлто-коричневая, чешуйчатая, в центре более тёмная. Мякоть тонкомясая, белая, с приятным грибным запахом.
- Ножка до 15см длины, 0.8-1.7см толщины, цилиндрическая, с перепончатым кольцом в верхней части, упругая, под шляпкой светлая, внизу коричневая.



# Масленок.

- Произрастает большими группами в сосновых лесах, особенно в редколесье или в молодых посадках сосны, на лесных опушках и в других местах, хорошо освещаемых солнцем, с июня по октябрь.
- Шляпка до 10см в диаметре, вначале полушаровидная, затем плоско-выпуклая, подушкообразная, иногда с загнутыми вверх краями, жёлто-коричневая или шоколадная, иногда с фиолетовым оттенком, гладкая. Мякоть толстая, на изломе цвета не меняет . Кожица шляпки легко отделяется от мякоти. Запах гриба приятный.
- Ножка цилиндрическая до 10см длины, 1-2см толщины, сплошная, над кольцом белая, под ним бледно-желтоватая, темнеющая.

