Космические телескопы

Атмосфера:

- Ограничения по спектру
- Ограничение углового разрешения
- Дифференциальная рефракция
- Хроматическая рефракция

Прозрачность атмосферы

INTERNATIONAL Gamma-RAY Laboratory

- Рентгеновская и гамма - обсерватория
- Высокоапогейная околоземная орбита
- 2002 год
- РН Протон

INTEGRAL (ESA + PΦ)

INTEGRAL

9 000 x
153 000 KM

INTEGRAL

INTEGRAL Instrument Consortia

INTEGRAL

Центр Галактики в линии 511 кэВ

Chandra (NASA + SAO):

23.07.1999 г., STS-93, Columbia

Chandra (AXAF - Advanced X-ray Astrophysics Facility)

- Рентгеновская обсерватория
- Высокоапогейная околоземная орбита
- Зеркала косого падения
- Разрешение около $0,3''$

Chandra

Остаток SN Кассиопея А

XMM Newton (с 1999 г.)

XMM Newton

- Рентгеновская обсерватория
- Высокоапогейная околоземная орбита
- 4 300 кв.см – площадь собирающей поверхности
- 3 рентгеновских телескопа

Hubble Space Telescope

HST: T3

- Многоцелевая астрономическая обсерватория
- Не менее 4 научных приборов
- Срок работы 15 лет
- Точность наведения и сопровождения лучше 0,1"
- Угловое разрешение лучше 0,1"

Space

Shuttle

SS идет на посадку

www.vsemila.com

HST

ТЕЛЕСКОП:

$D = 2,4 \text{ м}$

Ричи - Кретьен

Кварц, сотовое

Наведение $0,01''$

$\lambda > 115 \text{ нм}$

28 зв. величина

Угл. разрешение $0,1''$

АППАРАТ:

24.04.1990

Дискавери

13,4 м, $d = 4,3 \text{ м}$

12 500 кг

около 600 км

15 лет

HST

HST:

ремонт

До и после коррекции оптики

HST

Ground Based

HST/FOC

HST

10 000 статей (ИЦ в 2 раза выше, чем основанных на других данных)

$\Delta H = 10\%$ (ранее 50%)

Более 1 млн снимков

Карта поверхности Плутона

Галактика в 13,2 миллиарда световых лет

Изотропность Вселенной (HDF & HDFs)

Протопланетные диски

Спектроскопия экзопланет

HST

HST

HST

Hipparcos (астрометрия)

Hipparcos

ТЕЛЕСКОП:

АППАРАТ:

$D = 29$ см

08.08.1989

Шмидт

Ariane-4.4LP

$F = 140$ см

Курю

0,001 ''

500 × 36 500 км

Hipparcos (37 месяцев работы)

определены **пять** астрометрических параметров

(в частности, параллаксы)

118 324 звёзд

с точностью, превосходящей точность наземных наблюдений

в **100** раз

Hipparcos (37 месяцев работы)

- определены положения (два астрометрических параметра) для **1 млн** звёзд, с точностью, превосходящей точность наземных наблюдений в **5—10** раз;
- определены фотометрические данные (звёздные величины в двух цветах) для **1 млн** звёзд;
- открыто свыше **8 000** переменных и около **3 000** двойных звёзд

Hipparcos (37 месяцев работы)

создан новый фундаментальный каталог,

а также два других дополнительных

каталога, удовлетворяющих множеству

задач астрономии значительно лучше

каталогов, полностью базирующихся на

наземных наблюдениях

Gaia

Gaia (13 лет и 740 МЕвро)

- Трехмерная карта Галактики с указанием координат, собственного движения и цвета 1 млрд. звезд;
- До 500 тысяч малых тел СС;
- До 500 тысяч QSOs (z + фотометрия);
- 7 μas $V < 12$, 25 μas $V = 15$, 300 μas $V = 20$;
- 10 000 экзопланет до 200 пс;
- 106 CCD, 938 Мр;
- 150 ТВ информации (геном человека – 25 ТВ).

Gaia

ТЕЛЕСКОП:

АППАРАТ:

2 зеркала 1,45×0,5 м

19.12.2013

SiC

РН Союз – РБ Фрегат

$F = 35$ м

Курю

0,000007 ''

L2

Spitzer

Spitzer

ЦЕЛИ:

- Коричневые карлики;
- Внесолнечные планеты;
- ГМО
- Области за облаками космической пыли

4 больших обсерватории NASA

- CGRO – гамма-излучение
- Chandra – рентген
- HST – оптический диапазон
- Spitzer – инфракрасный диапазон

Herschel Space Observatory (FIRST)

Herschel Space Observatory

ЦЕЛИ:

- Формирование и развитие галактик в ранней вселенной;
- Формирование звезд и их взаимодействие с межзвездной средой;
- Химический состав атмосфер и поверхности тел Солнечной системы, включая планеты, кометы и спутники планет

Herschel Space Observatory

ТЕЛЕСКОП:

АППАРАТ:

$D = 3,5$ м (12 элементов) 14.05.2009

Ричи - Кретьен

Ariane-5

Карбид кремния

Куру

$A = 1 : 8,7$

L2 Земля - Солнце

60 – 670 мкм

3 300 кг

$T = 2$ К (He)

4 года

Herschel

Область
звездо-
образования
в Орле

© ESA & the PACS Consortium

Herschel

Галактика

M51

Kepler

- 7 марта 2009 г.
- РН Delta II
- 3,5 года
- 100 000 звезд
- Видимая зв.вел.
9 - 16
- 95 мегапикселей

Kepler

Kepler

Kepler

Поиск экзопланет

Наземные наблюдения
1995 – 2011 годы

Космическая
обсерватория
«Кеплер»

552 планеты

Обнаружено 6-ю
методами на всей
небесной сфере

Одна – в зоне
обитаемости

За год – 1235 планет
Из них 54 – в зоне
обитаемости

Cheops — CHaracterising ExOPlanets Satellite

- 800 км ССО
- Рокот или Вега (200 кг)
- 33,5-см телескоп
- 1-ый из класса малых миссий ESA
- 2017 г., 3,5 года
- 50 M\$

James Webb Space Telescope

(JWST)

(NGST)

JWST

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ:

- проблем космологии и структуры Вселенной;
- происхождения и эволюции галактик;
- истории Млечного Пути и соседних галактик;
- рождения и образования звезд;
- происхождения и эволюции планетных систем.

JWST

ТЕЛЕСКОП:

$D = 6,5 \text{ м}$

0,6 – 28 мкм

Be + Au

АППАРАТ:

2019

L2 Земля – Солнце

Ariane-5

Должен закрыть промежуток

от 1 млн. лет

(реликтовое излучение)

до 1 млрд. лет

(телескопы)

JWST primary mirror

Hubble primary mirror

Спектральный диапазон

Γαλλο – ορβιτα ροκνιγ 1 2

Figure 2. Representative Trajectory with JWST MCC maneuvers

Гало – орбита вокруг L2

ЦЕНА ВОПРОСА

- Hubble: 400 M\$ → 6 G\$;
- GWST: 500 M\$ → 8,8 G\$;

Бомбардировщик B-2 Spirit – G\$ 2.1

Эсминец Zumwalt – G\$ 4

Авианосец Gerald R. Ford – G\$ 13

ЦЕНА ВОПРОСА

МКС – уже > 150 G\$;

Военный бюджет США:
\$ 700 000 000 000 в год