

F

<i>F</i>	...	$2s^2$	$2p^5$
<i>Cl</i>	...	$3s^2$	$3p^5$
<i>Br</i>	...	$3d^{10}$	$4s^2$ $4p^5$
<i>I</i>	...	$4d^{10}$	$5s^2$ $5p^5$

At

ГАЛОГЕНЫ

Cl

Br

I

Общая характеристика галогенов

открытый урок по химии
в 9 классе

Подготовила: Выскребенцева С.В.
учитель химии МБОУ СОШ №6
ст. Октябрьской

Цели урока:

- Дать представления о галогенах на основании их сравнительной характеристики;
- Рассмотреть простые вещества – галогены, их физические и химические свойства;
- Продолжить формирование умения сравнивать свойства простых веществ.

Проверка домашнего задания:

тестирование

выписать номера свойств и характеристик для **(1)** варианта) металлов, для **(2)** варианта) неметаллов:

1. Маленький радиус атомов
2. Большой радиус атомов
3. На внешнем уровне от 1 до 3 электронов
4. На внешнем уровне от 4 до 8 электронов
5. Ковкость
6. Металлический блеск
7. Газообразное агрегатное состояние
8. Пластичность
9. Различная окраска
10. Плохая электропроводность
11. Твердое агрегатное состояние
12. Хорошая теплопроводность
13. Хорошая электропроводность
14. Ярко выраженные восстановительные свойства
15. Ярко выраженные окислительные свойства
16. Аллотропия

Правильные ответы: для металлов характерно:


1. Маленький радиус атомов
2. Большой радиус атомов
3. На внешнем уровне от 1 до 3 электронов
4. На внешнем уровне от 4 до 8 электронов
5. Ковкость
6. Металлический блеск
7. Газообразное агрегатное состояние
8. Пластичность
9. Различная окраска
10. Плохая электропроводность
11. Твердое агрегатное состояние
12. Хорошая теплопроводность
13. Хорошая электропроводность
14. Ярко выраженные восстановительные свойства
15. Ярко выраженные окислительные свойства
16. Аллотропия

Правильные ответы:

для неметаллов характерно:

1. Маленький радиус атомов
2. Большой радиус атомов
3. На внешнем уровне от 1 до 3 электронов
4. На внешнем уровне от 4 до 8 электронов
5. Ковкость
6. Металлический блеск
7. Газообразное агрегатное состояние
8. Пластичность
9. Различная окраска
10. Плохая электропроводность
11. Твердое агрегатное состояние
12. Хорошая теплопроводность
13. Хорошая электропроводность
14. Ярко выраженные восстановительные свойства
15. Ярко выраженные окислительные свойства
16. Аллотропия

Цепочка превращений:



- 1) $\text{H}_2 + 2\text{Na} = 2\text{NaH}$
- 2) $\text{NaH} + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{H}_2\uparrow$
- 3) $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 = 2\text{HCl}$
- 4) $\text{NaH} + \text{H}_2\text{O} = \text{NaOH} + \text{H}_2\uparrow$
- 5) $2\text{NaOH} + 2\text{Al} + 6\text{H}_2\text{O} = 2\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4] + 3\text{H}_2\uparrow$

Задача №2 стр. 93

Дано:

$$V(\text{ возд.})=100 \text{ л}$$

$$\varphi(O_2)=21\%$$

$$\varphi(N_2)=78\%$$

$$n(O_2)=?$$

$$n(N_2)=?$$

Решение:

$$V(O_2)= V(\text{ возд.}) * \varphi(O_2) = 100 * 0,21 = 21 \text{ л.}$$

$$n(O_2)= V / V_m = 21 \text{ л} / 22,4 \text{ л/моль} = 0,94 \text{ моль}$$

$$V(N_2) = 100 * 0,78 = 78 \text{ л}$$

$$n(N_2)=78 \text{ л} / 22,4 \text{ л/моль} = 3,48 \text{ моль}$$

Ответ: 0,94 моль, 3,48 моль.

Задача №3 стр.103

Дано:

$$m_{\text{тех.}}(\text{WO}_3) = 928 \text{ кг}$$

$$W(\text{примес.}) = 25\%$$

$$V(\text{H}_2) = ?$$

$$n(W) = ?$$


Решение:

$$W(\text{WO}_3) = 100\% - 25\% = 75\%$$

$$m(\text{WO}_3) = m_{\text{тех.}} * W(\text{WO}_3) =$$

$$928 \text{ кг} * 0,75 = 696 \text{ кг}$$

$$n(\text{WO}_3) = m/M = 696 \text{ кг} / 232 \text{ кг/кмоль} = \\ = 3 \text{ кмоль}$$



$$1 \text{ моль} \quad 3 \text{ моль} \quad 1 \text{ моль}$$

$$3 \text{ кмоль} \quad 9 \text{ кмоль} \quad \underline{\text{3 кмоль}}$$


$$V(\text{H}_2) = nV_m = 9 \text{ кмоль} * 22,4 \text{ м}^3/\text{кмоль} = \underline{\text{201,6 м}^3}$$

Ответ: 201,6 м³, 3 кмоль.

Изучение нового материала:

1. Положение в ПСХЭ и строение атомов:

VII группа главная подгруппа



Общая характеристика галогенов:

- 
- на внешнем уровне 7 электронов;
 - увеличивается радиус атомов;
 - ослабевают неметаллические свойства;
 - окислительная способность уменьшается.

Фтор – самый сильный окислитель (с.о.-1)

У остальных: с.о. -1, +1, +3, +5, +7

Галогены – простые вещества

1. Фтор **F₂** –
ядовитый газ светло-
желтого цвета с
резким
раздражающим
запахом.




Фтор



Фтор – от греческого «фторос» –
что означает разрушение, гибель.

9




В 1886 году **Анри Муассану** удалось
получить фтор электролизом безводного
фторида водорода и в 1906 году ему была
присуждена Нобелевская премия

Когда Муассан докладывал Парижской академии наук о
своем открытии, один глаз ученого был закрыт черной
повязкой



Славу этого открытия и звание лауреата Нобелевской премии по праву должны были разделить предшественники Анри Муассана: **Томас и Георг Нокс** – члены Прландской академии наук, бельгийский химик **Лайет**, французский химик **Джером Никлес** – принявший мучительную смерть при проведении опытов, получили серьезные ожоги французские химики **Жозеф Гей–Люссак** и **Луи Теннар**, Эдмон Ферми, английский электрохимик **Георг Гор** и даже **М.Фарадей**






Флюорит или плавиковый шпат (CaF_2) – основной минерал, содержащий фтор, так как свободный фтор в природе не встречается

Фтор также входит в состав фторапатита $3\text{Ca}(\text{PO}_4)_2 * \text{CaF}_2$,



криолита Na_3AlF_6

Содержание фтора (элемента) в земной коре составляет $6,25 * 10^{-2}$ от общей массы.



В качестве «рабочего вещества» применяются в холодильных установках фреоны CCl_2F_2 - дифтордихлорметан



Тефлон более устойчив к агрессивным средам, чем золото и платина, хотя в его составе более 75% самого агрессивного из галогенов - фтора



Фтор входит в состав не только хладоагентов, лекарств, ядохимикатов, но и в состав искусственной крови, полимеров, красителей



Соединения фтора применяются в ракетной технике как окислитель ракетного топлива



Соединения фтора широко применяются в медицине как кровезаменители



Шестифтористая сера SF_6 — газообразный изолятор в электротехнической промышленности

Криолит $3 NaF \cdot AlF_3$ сделал промышленное производство алюминия доступным и дешевым, понижая температуру плавления оксида алюминия

Простые вещества -галогены

2. Хлор Cl_2 –

желто-зеленый газ с
резким
удушливым
запахом



ХЛО



В свободном состоянии хлор впервые был получен в 1774 году шведским химиком **Карлом Вильгельмом Шееле**



C1	17
ХЛОР	
35.453	7
$3s^2 3p^5$	8 2



Этот газ **Гэмфри Дэви**, английский химик, в 1810 году назвал хлорином. По древнегречески «хлорос» - желто-зеленый



Современное название этому газу «хлор» дал в 1812 году французский химик **Гей-Люссак**



Содержание элемента хлора в земной коре составляет $1,7 \cdot 10^{-2}$ по массе. В природе хлор содержится в виде минералов:



галита (каменной соли) NaCl , сильвина $\text{KCl} \cdot \text{NaCl}$, бишофита $\text{MgCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$



карналита $\text{KCl} \cdot \text{NgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$,

каинита $\text{KCl} \cdot \text{MgSO}_4$



Наиболее распространённый способ обеззараживания питьевой воды - хлорирование - основан на способности свободного хлора и его соединений угнетать ферментные системы микроорганизмов, катализирующие окислительно-восстановительные процессы

В пищевой промышленности зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е 925



Отбеливающие свойства хлора известны с давних времен, хотя не сам хлор «отбеливает», а атомарный кислород, который образуется при распаде хлорноватистой кислоты:



Этот способ отбеливания тканей, бумаги, картона используется уже несколько веков



В металлургии соединения хлора применяются для производства чистых металлов: титана, олова, tantalа, ниобия



Производство хлорорганических
инсектицидов — веществ,
убивающих вредных для посевов
насекомых, но безопасные для
растений



Простые вещества - галогены

3. Бром Br_2 –


жидкость бурого
цвета со
зловонным
запахом



Бро м



«Точь-в-точь как ртуть есть единственный металл, который имеет жидкую фазу при комнатной температуре, бром есть единственный жидкий неметалл» – писал **Антуан-Жером Балар**, открывший бром в 1825 году.



35

Br

БРОМ

79,904

7
184s² 4p⁵8
2



В свободном состоянии бром не встречается из-за высокой химической активности



Самый известный
минерал, содержащий
бром – бромаргирит AgBr

Морская вода – главный источник рассеянного элемента – брома.
В организме человека больше всего брома содержится в мозге, а
среди растений больше всего накапливают бром бобовые и
морские водоросли



Из прозрачных кристаллов бромида калия изготавливают линзы для приборов ночного видения.

Бромид натрия – незаменимая добавка к дубителям в кожевенном производстве



Широко применяются тетраброминдиго – стойкий синий, диброминдиго – красный, красители



Бромид серебра стал первоосновой для изготовления фотопленки, кинопленки, фотобумаги

Успокаивающие препараты также содержат соединения брома.



Простые вещества - галогены

4. Йод I_2 –
твёрдое вещество
чёрно-серого цвета
с металлическим
блеском и
резким запахом




I

иод
126,904
 $5s^2 5p^5$

7
18
18
8
2

Йод был открыт в 1811 году французским химиком-технологом Бернаром Куртуа.

ЙОД



Название элемента происходит от греческого «*iodes, ioeides*» – похожий на фпалку, фиолетовый.



Йод не образует самостоятельных месторождений, его содержание в земной коре составляют $4 \cdot 10^{-5}$ по массе.



«Йод вездесущий» – писал о нем академик А.Е.Ферсман, так как невозможно назвать вещество, в котором бы современные методы анализа не открыли бы присутствия хотя бы незначительных следов йода.



В организме человека йод входит в состав белка тиреоглобулина, содержащегося в щитовидной железе. Он абсолютно незаменим при синтезе гормонов, вырабатываемых этой железой.

Недостаток йода у взрослых людей вызывает зобную болезнь, а в детском возрасте нехватка йода приводит к развитию страшной болезни – кретинизму.



Суточная потребность в йоде составляет:

микrogramм (мкг);

дети грудного возраста 50
(первые 12 месяцев жизни)


дети в возрасте 90
от 1 до 6 лет

дети в возрасте 120
от 7 до 12 лет

взрослые и дети 150
старше 12 лет

беременные 200
и кормящие женщины








Соединения йода особенно широко применяются в медицине и фармацевтической промышленности



Под в виде спиртовой настойки всем известен как антисептическое и кровоостанавливающее средство.

Аналогично используется и одно из его производных – йодоформ



Подные лампы применяются для освещения больших площадей и стадионов.



Для сварки и пайки металлов и стекла также применяются подные лампы – ведь стальной лист толщиной 1 мм нагревается подной лампой за 90 секунд до 1500 °

Кристаллы иодида серебра, распыляемые над облаками, искусственно вызывают дождь.



Химические свойства галогенов

1. Взаимодействие с простыми
веществами:


а) с водородом H_2



б) с металлами

F_2 при нагревании реагирует даже с
Au, Ag и Pt

Горение сурьмы в хлоре



Химические свойства галогенов

2. Взаимодействие со сложными веществами:

а) с водой



б) с галогенидами металлов



окислительная способность уменьшается

Вопрос № 1

«Вездесущий» – так назвал этот галоген академик А.Е. Ферсман

А) Бром

В) Хлор

Б) Фтор

Г) Йод

Вопрос № 2

**Этот галоген назвали «всесъедающий»,
хотя он входит в состав зубной эмали**

A) Бром

B) Хлор

Б) Фтор

Г) Йод

Вопрос № 3

Галоген, возможность существования которого предсказал Д.И. Менделеев

А) Бром

В) Хлор

Б) Астат

Г) Йод

Вопрос № 4

В природе галогены встречаются в виде

A) простых
веществ

B) соединений

B) свободных
атомов

G) не знаю

Вопрос № 5

Как изменяется радиус атомов галогенов с увеличением относительной атомной массы?

А) уменьшается

Б) увеличивается

В) не знаю

Г) не изменяется

Домашнее задание:

- Параграф 18,
- задания после параграфа 18 №4,5
- Параграф 20,
- задания после параграфа 20 №1

Спасибо за внимание!