

Влияние алкоголя, курения и наркотиков в период эмбрионального развития




Во время эмбрионального периода зародыш связан с организмом матери через плаценту и находится в постоянной зависимости от её состояния здоровья



Влияние курения на плод

Никотин, попадающий в кровь матери при курении, легко проникает сквозь плаценту в кровеносную систему плода и вызывает сужение сосудов. Если поступление крови в плод ограничено, то снижается его снабжение кислородом и питательными веществами, что приводит к задержке развития.





По статистике ребёнок курящих женщин при рождении весит в среднем на 300-350 грамм меньше нормы. Ещё чаще происходят преждевременны роды и выкидыши на поздних сроках беременности.



На 30% выше вероятность ранней детской смертности и на 50% - вероятность развития пороков сердца у детей, чьи матери не смогли во время беременности отказаться от сигарет.



Употребление спиртного при беременности

Употребление спиртного при беременности может вызвать у ребёнка состояние, известное как *алкогольный синдром плода*.



При этом синдроме наблюдается задержка умственного развития, микроцефалия (недоразвитие головного мозга), расстройства поведения (повышенная возбудимость, невозможность сосредоточиться), снижение скорости роста, слабость мышц.





Воздействие наркотических веществ на плод.

Если женщина имеет зависимость от наркотических веществ, то её ребёнок в эмбриональный период развития приобретает такую же зависимость.



После рождения у ребёнка возникает синдром отмены (ломка), потому что исчезает постоянное поступление наркотика, который до этого ребёнок получал из крови матери через плаценту.



Так как наркотики поражают нервную систему, у таких детей ещё в период внутриутробного развития может возникнуть поражение головного мозга, что приведёт в дальнейшем к задержке умственного развития или нарушению поведения.






Заболевания, распространённые среди наркозависимых

Вирусные заболевания представляют серьёзную опасность для развития плода. Наиболее опасны гепатит В и ВИЧ-инфекция.

В случае заражения на первом месяце беременности у 50% детей развиваются врождённые пороки: слепота, глухота, расстройства нервной системы и пороки сердца.



Курящие подвергают опасности не только себя, но и окружающих людей!!

ЗАЩИТИТЕ

МЕНЯ...

ПРОДУКЦИЯ
МЫ!