

МБОУ ПРУДКОВСКАЯ СОШ

Скажем туберкулезу : "Нет!"

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ

Митрофанова С.А.

В настоящее время в мире около 15 млн. больных туберкулёзом, из них 11 млн. — в трудоспособном возрасте.

Около трети жителей нашей планеты инфицированы микобактерией туберкулёза.

У подавляющего большинства инфицированных людей (90%) заболевание не развивается. По прогнозам ВОЗ в ближайшие двадцать лет ожидается до 90 млн. новых случаев туберкулёза и до 30 млн. смертей от него.

В 1993 г.
Всемирной организацией
здравоохранения
туберкулез
был объявлен
национальным
бедствием, а день 24
марта
«Всемирным днем борьбы
с туберкулезом».



Роберт Кох
(1843 - 1910)

Немецкий врач –
микробиолог,
один из основоположников
современной
бактериологии.
Открыл возбудителя
туберкулеза.
Лауреат Нобелевской

Что такое туберкулез?

ТУБЕРКУЛЕЗ ЗАРАЗЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН.

**В отличие от других инфекций,
он имеет хроническое течение, что
повышает количество заразившихся
многократно.**

**Заболевание, как правило, наступает
не сразу:**

**от заражения до появления может
пройти от нескольких месяцев до
нескольких лет.**

**Туберкулез
называют
“белой
чумой
XX века”.**

Возбудитель заболевания



**Возбудитель заболевания –
Микобактерия туберкулеза (МБТ) –
была открыта Робертом Кохом в 1882
году, ее называли “палочкой Коха”**

Важная особенность микобактерии туберкулёза

После первичного заражения может не наступить никаких клинических проявлений болезни. Заболевание не разовьется, однако Микобактерия туберкулёза (МБТ) может длительное время (годы, десятилетия) находиться в организме, не причиняя ему вреда.


Такое состояние относительного равновесия может нарушиться в пользу возбудителя при снижении защитных сил организма (ухудшение социальных условий жизни, недостаточное питание, стрессовые ситуации, старение).

Вот почему заразиться в детском (подростковом) возрасте пожилой человек (старше 60-ти лет) может заболеть туберкулезом, хотя инфицирование наступило полвека назад и более.

Заражение туберкулезом актуально для людей любого возраста.

Пути заражения туберкулезом

ВХОДНЫЕ ВОРОТА - пути проникновения инфекции чаще всего – дыхательные пути, куда бациллы в огромном количестве попадают с капельками слизи и мокроты, которые выбрасываются больными при **чихании, разговоре, кашле.**



У кого выше риск заражения?



Люди, страдающие
алкоголизмом



Наркоманы



Лица, отбывающие наказание в
местах лишения свободы



Бездомные

СИМПТОМЫ



**Длительный кашель
(более трех недель)**

Кровохарканье



Потеря массы тела

**Сильное потоотделение
(особенно ночью)**



Потеря аппетита

**Периодическое повышение
температуры (37,2-37,5),
чаще бывает вечером
(17-21 час.).**



Упадок сил и слабость




Одышка



Боли в грудной клетке

Меры профилактики

Здоровый образ жизни, отказ от курения, алкоголя, токсикомании, личная гигиена, вакцинация





Спасибо за внимание!