



Виды наркотических средств, психотропных,  
сильнодействующих веществ





- Децитилморфин (героин)
- Опий
- Нарк. ср-ва амфитамин группы
- Кокаин
- и др.

- **Каннабис (марихуана)**
- **ЛСД**
- **Мескалин**
- **Курительные смеси**
- **Метамфетамин (первитин)**
- **Гашиш (анаша, производные конопли)**

*Способы употребления:*

вдыхание, инъекция (в/в, в/м, п/к, курение, глотание, прикладывание к мембранным поверхностям, добавка к пище, жевание, втирание в слизистые рта, влагалища, прямой кишки.



# Курительные смеси

## Последствия хронического употребления:

- повышенное артериальное давление
- учащенное сердцебиение
- сильные головные боли
- тошнота
- рвота
- галлюцинации
- потеря сознания
- суицидное поведение



По воздействию на организм человека их можно сравнить с курением марихуаны, приобрести такие смеси спокойно можно в торговых точках, продающих табачные изделия, через сеть Интернет

- Вызывают психоактивные галлюциногенные эффекты у человека

## *Как влияют на организм галлюциногены?*



- Человек может начать видеть узоры по контурам предметов, присутствуют другие визуальные, слуховые и смысловые галлюцинации. Наблюдается возможность проникновения сквозь стены отдельных частей тела, поглощение тела предметами, вселение в иные предметы, стекание пространства в разные стороны. Возможны панические атаки, как во время действия вещества, так и в нормальном состоянии, после регулярного употребления. Оказывает негативное влияние на деятельность мозга.

Наркомания, вызванная препаратами конопли (анаша, марихуана, гашиш, банг, киф, гуаза, хусус, план, харас, хуррус, дагга, гунья, черес, кафур)



## **Психические расстройства при курении конопли:**


- Острое нарушение психомоторных функций
- **Острые нарушения кратковременной памяти и других познавательных функций**
- Острые кратковременные психические расстройства
- **Хронические резидуальные расстройства сложных познавательных функций после прекращения использования**
- Формирование клинически значимого синдрома зависимости от конопли
- **Психические расстройства средней продолжительности в результате длительного злоупотребления каннабисом**
- Возникновение шизофрении Обострение существующей шизофрении

# Действие препаратов конопли

- *Начинается с чувства жажды и голода, сухости во рту. Постепенно по всему телу разливается ощущение тепла. Появляются ощущение невесомости, желание прыгать, танцевать, принимать вычурные позы. Незначительные действия окружающих вызывают нелепый неудержимый смех. Становится невозможно сосредоточиться. Ассоциации возникают легко и быстро сменяют друг друга. Произносятся набор фраз, часто незаконченных. Возникает быстрый поток мыслей. Все больше суживается контакт с окружающими, нарушается взаимопонимание с ними. Появляется импульсивность. Возникают иллюзии, фантазии, все звуки приобретают особый резонанс, ощущение, что разговор идет в зале с усиленной акустикой.*

# Заболевания и физиологические расстройства при употреблении конопли:

- Хронический бронхит
- Негативное влияние на психику
- Наибольший вред курение конопли наносит органам дыхания.
- Вместе с поступающим в кровь из дыма конопли угарным газом эти заболевания **снижают насыщение крови кислородом**, и следовательно, **приводят к кислородному голоданию головного мозга.**
- Развитие рака легких.
- Снижение иммунитета.





# Метамфетамин (первитин)

(на сленге: мет, meth, лёд, кристалл, тина, заводка, Винт)

- **Ощущения:** Через несколько секунд после инъекции «винта» наступает внезапное начало действия, очень сильное и ошеломляющее, иногда сопровождаемое галлюцинациями. После введения наступает чрезвычайная психическая стимуляция в течение около 8 часов, после чего наступает упадок сил, иногда депрессивное состояние. Это состояние продолжается в среднем два дня. С каждым новым приемом негативные последствия выражаются все сильнее.

## Последствия хронического употребления


- тромбофлебит (тромбоз вен)
- развиваются психические расстройства, связанные с истощением нервной системы (астения, неврозы и др.), депрессии, психозы (с бредовой и/или галлюцинаторной симптоматикой)
- долгое употребление приводит к самоубийству, к непроходящим кошмарам, боязни засыпать.



- У первитин-наркозависимых самого различного стажа, от 0,5 до 6 лет на фоне воспаления слизистой оболочки **возникает патологическая подвижность зубов с последующим их выпадением**. Лунки выпавших зубов не заживают, кость оголяется. Слизистая оболочка десен как бы сползает с кости, и костные отростки челюстей зияют во рту, приобретая грязно-серый цвет. Вначале пациенты не испытывают особых болевых ощущений и кость даже не кровоточит при травматизации. Однако по мере диффузного отмирания кости появляется **жесточкая боль, развивается отек лица, затрудняется прием пищи, нарастает контрактура жевательных мышц («сведение челюстей»)**, изо рта даже на расстоянии слышится гнилостно-некротическое зловоние. На лице и шее появляются свищи с **гнойнными выделениями**.



- Хирургическую помощь в достаточном объеме часто предоставить невозможно. Во-первых, потому, что диффузно, а не отдельным очагом поражается кость, во-вторых, из-за глубокой иммунодепрессии организма больного, снижения показателей крови, дистрофии вследствие ограничения питания.
- В дальнейшем темпы болезни протекают стремительнее, чем при злокачественных новообразованиях: нижняя челюсть поражается тотально и отмирает: из альвеолярного отростка верхней челюсти воспаление распространяется на гайморовые пазухи, решетчатый лабиринт, кости основания черепа, после чего смерть наступает от менингита, сепсиса.



**Амфетамины имеют форму капсул, таблеток или пилюлек.**

# Амфетамины

(дезоксин, дексидрин, кристал, меф, черная красotka, будильник)

- **Сильные возбуждающие средства**, оказывают стимулирующее воздействие на нервную систему. Таким образом, они увеличивают состояние общего возбуждения, что может далее привести к упадку сил.
- **Способ употребления:** проглатывание, инъекции, вдыхание
- **Ощущения:** физического благополучия, человек чувствует себя в форме, он уверен в себе. Внутривенная инъекция в большой дозе вызывает у наркомана вспышку острого наслаждения, которое часто сравнивают с сильнейшим оргазмом. Затем наступает состояние интеллектуальной экзальтации, непреодолимое желание говорить, творить, а также иллюзорное чувство превосходства над окружающими.
- **Последствия:** длительное употребление приводит к психотическим проявлениям параноидного типа: человек вскоре начинает чувствовать себя затравленным, и малейшее движение другого человека может быть воспринято как угроза. Бредовые идеи сопровождаются также слуховыми галлюцинациями, депрессия, суицидальное поведение.

# Употребление амфетаминов без перерывов приводит к...





# Дезоморфин

- Является наркотическим анальгетиком. Быстрое привыкание и высокая токсичность препарата сделало его недопустимым для применения во врачебной или ветеринарной практике.
- Дезоморфин опасен тем, что очень высок риск передозировки, так как при в/в употреблении дезоморфина наркоман не может остановить процесс всасывания наркотика.

- Необратимые изменения в организме наркомана принимающего дезоморфин наблюдаются уже через месяц после формирования зависимости!
- Больные с большим сроком зависимости не поддаются лечению, современная медицина способна лишь продлить их жизнь на небольшое время!!!
- У таких больных наблюдаются массивные повреждения тканей конечностей, внутренние некрозы и кровотечения, сгорают вены находящиеся вблизи места его введения, нарушения деятельности печени, селезенки, тромбофлебит, гноящиеся раны.

**Фактически больные дезоморфиновой наркоманией – живые трупы, помочь которым уже нельзя...**





**Кокаин** (кок, кока, джанка, кокс, марафет, первый, кокос, дорогой, снег, звездная пыль, орт, корс, си, орех, белый, коля, драконова перхоть)

## ДЕЙСТВИЕ КОКАИНА НА ОРГАНИЗМ

- Продуцирует эффект эйфории, блокируя реабсорбцию дофамина, и повторяющееся потребление кокаина может исчерпать запас дофамина, что становится причиной "**ломки**", ощущаемой к концу действия наркотика. Это также объясняет развитие физического пристрастия и толерантности к кокаину.
- Особенно катастрофично воздействие кокаина на **сердечнососудистую систему, систему дыхания и ЦНС, проявляющееся в поведенческих отклонениях, тяжелой депрессии, параноидных расстройствах, психозах (для которых введен термин "кокаиновый" психоз), галлюцинациях, мозговых инсультах и кровотечениях.**

## ДЕЙСТВИЕ КОКАИНА НА ОРГАНИЗМ КАК СТИМУЛЯТОРА:

- эмоциональный подъем, эйфория
- ощущение прилива энергии
- усиление умственной активности
- долгий период бодрствования
- снижение потребности во сне
- подавление аппетита
- увеличение физической выносливости

## ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ КОКАИНА:



- учащение пульса, тахикардия
- учащение ритма дыхания
- сужение кровеносных сосудов
- подъем давления
- повышение температуры тела
- потливость
- расширение зрачков

## ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ КОКАИНА

- потеря веса
- неопрятный внешний вид
- покраснения кожи из-за расчесывания кажущихся укусов так называемых «кокаиновых клопов»
- хронический насморк
- частые респираторные инфекции.
- находясь под воздействием кокаина, человек может оставаться бодрым несколько часов, а затем спать длительный период времени.

### Психологические признаки

потеря интереса к дружескому общению, прежним увлечениям или любой другой активной деятельности, проблемы дома, в школе и на работе, финансовые проблемы.

- Развивающийся психоз может проявляться в совершении повторяющихся конвульсивных движений, подобных работе пальцев при печатании или игре с волосами.

### В случае передозировки:

расширенные зрачки, тахикардия, потливость, гипертензия, слуховые галлюцинации, тяжелая депрессия, а также резкая смена настроения, проявления нетерпеливости и агрессивности, нервозности и чрезвычайного озлобления.

## СИМПТОМЫ ПРИВЫКАНИЯ. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ХРОНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ. ЭФФЕКТЫ ПЕРЕДОЗИРОВКИ.

- проблемы со сном, бессонница
- головная боль
- снижение аппетита
- тошнота
- Усталость
- Насморк
- воспаления носовых путей, геморрагический нос, кровотечения, некроз носовой перегородки
- расширенные зрачки
- неразборчивая речь
- покраснение кожи от кажущихся "укусов кокаиновых клопов"
- повторяющаяся судорожная активность
- конвульсивные движения пальцев рук (подобно печатанию на машинке или игре с волосами)
- раздражительность, злость, агрессивное поведение
- тремор, конвульсии, судороги, припадки
- Депрессия, психоз, паранойя
- бред, ложные и иррациональные идеи
- галлюцинации: обонятельные, слуховые, тактильные (ощущение присутствия "кокаиновых клопов" под кожей)
- нарушение дыхания, лёгочные заболевания, остановка дыхания, отёк лёгких
- сердечно-сосудистые проблемы: аритмия, фибрилляция, инфаркт, остановка сердца
- церебральный инфаркт, инсульт
- склонность к самоубийству

## ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ КОКАИНА ЖЕНЩИНАМИ ВО ВРЕМЯ ВЫНАШИВАНИЯ, РОДОВОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОДЫ

- риск спонтанного прерывания беременности (выше, чем для героина)
- риск врожденных уродств и пороков развития
- высокая смертность плода в период вынашивания, при родах и в послеродовой период
- отклонения поведения новорожденных, связанные с нарушениями нервной системы

## Негативное ДЕЙСТВИЕ КОКАИНА НА НОВОРОЖДЕННЫХ

- Потенциальной проблемой для потребителей кокаина - СПИД и гепатит, т.к. при использовании одних шприцов очень велика опасность переноса инфекции. Инфицированные кокаинисты могут далее заразить партнеров, супругов и детей, способствуя распространению инфекции и делая ее неконтролируемой.

# Негативное ДЕЙСТВИЕ КОКАИНА НА НОВОРОЖДЕННЫХ...



- Иногда они *страдают от сердечных приступов до и после родов. Отклонения функционирования легких, почек, печени, мозга, гениталий.* Имеют место также проблемы с дыханием, трудности двигательных функций, церебральный паралич и физические уродства.
- *Признаки расстройства нервной системы, связанные с действием кокаина: оцепенелость, возбудимость, трудности при кормлении, сверхчувствительность к свету и звукам.* "Кокаиновые младенцы" не осознают своего окружения и проявляют тип поведения, указывающий на *неврологические и психологические отклонения.* Однако, глубина нарушений может не проявляться и не распознаваться вплоть до достижения ребенком школьного возраста.

# Героин

(диацетилморфин,  
диаморфин)



**ГЕРОИН И АНОРЕКСИЯ**  
делают женщину невероятно красивой

- **Физическая зависимость:** Высокая
- **Психологическая зависимость :** Высокая
- **Толерантность:** Да
- **Продолжительность действия (в часах):** 3-6
- **Обычный способ применения:** Вводится внутрь; нюхается; курится .
- **Возможное воздействие:** эйфория, сонливость, дыхательная недостаточность, суженные зрачки, тошнота
- Сочетается эйфористическим наплывом, теплым чувством расслабления, ощущением защищенности, и прекращением боли, опасения, голода, напряженности и беспокойства. Наркоману кажется, что время может замедляться. Любое проявление гнева, расстройства или агрессии исчезает.
- **Воздействие от передозировки:** медленное и поверхностное дыхание, липкая кожа, конвульсии, кома, возможна смерть .
- **Синдромы от прекращения употребления:** Слезающиеся глаза; насморк; зевота; потеря аппетита; раздражительность; толчки; паническое состояние; колики; тошнота; озноб и потение, боли в суставах и костях, сильное расстройство желудка

Дегradировать  
просто.



# Будущее в твоих руках!



**Если Вам или  
Вашим близким  
нужна помощь,  
знайте, что Вы не  
одинок.**



Спасибо за  
внимание!

*Телефоны наших  
Консультантов*  
**8 (395 2) 20-20-52**

