

Биология

7 класс

Тип
кишечнополост
ные

Тип Кишечнополостные

- тип, объединяющий около 9 тыс. видов;
- имеют лучевую симметрию;
- обитатели морей и океанов;
- Имеют кишечную полость.



гидры



полипы



медузы

Классификация

ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ ОКОЛО 9000 ВИДОВ

КЛАСС КОРАЛЛОВЫЕ ПОЛИПЫ

КЛАСС ГИДРОИДНЫЕ



Португальский кораблик

Парусник

Пресноводная гидра

КЛАСС СЦИФОИДНЫЕ



Пелагия

Корнерот


Морское
пурпур



Активные




Красный коралл




Мозговик

Внешнее строение

Большинство кишечнополостных имеет две формы жизни: прикрепленный **полип** (бесполое поколение) и свободноживущая **медуза** (половое поколение).





Внешнее строение: полип



Полип имеет почти правильную цилиндрическую форму. На одном конце находится **рот**, окруженный 5 – 12 **щупальцами**, на другом конце – **подошва**. Могут быть одиночными (гидра) и колониальными (коралловые полипы).


Внешнее строение: медуза

Медуза имеет форму **зонтика**, под сводом которого расположен **рот**, окруженный **щупальцами**. Всегда одиночные.




Особенности кишечнополостных


1. Имеют **лучевой (радиальный) тип симметрии**. То есть через тело можно провести несколько плоскостей симметрии.



Особенности кишечнополостных

2. **Двухслойные** животные. Тело образовано двумя слоями клеток: наружным – **эктодерма** и внутренним – **энтодерма**. Между ними находится слой студенистого вещества – **мезоглея**. Внутри тела имеется **кишечная полость**.





Эктомдерма

Эндодерма

Клетки тела гидры

(заполнить в тетради или по
презентации или по учебнику)

Слой тела	Тип клетки	Функции
Эктодерма	Эпителиально-мускульная	
	Стрекательная	
	Нервная	
	Промежуточная	
	Половая	
Энтодерма	Пищеварительно-мускульная	
	Железистая	

Наружный слой клеток – эктодерма

Строение наружного слоя клеток (эктодерма)



Больше всего в наружном слое **эпитеиально-мускульных** клеток. Они создают покров тела гидры. В основании каждой такой клетки есть сократимое **мульчное волоконце**, играющее важную роль при движении животного.

Наружный слой клеток – эктодерма

Строение наружного слоя клеток (эктодерма)




Схема строения стрекательной клетки
(со свёрнутой стрекательной нитью)



Все тело гидры и особенно ее щупальца усажены большим количеством **стремительных клеток**. Стремительная клетка содержит овальную **капсулу** и **стремительную нить**. Снаружи имеется **чувствительный волосок**. Стремительные клетки служат средством нападения или защиты.

Наружный слой клеток – эктодерма

Схема строения стрекательной клетки
(со свёрнутой стрекательной нитью)





Схема строения стрекательной клетки
(с выброшенной стрекательной нитью)



Если добыча или враг прикоснётся к **чувствительному волоску**, который расположен снаружи **стрекательной клетки**, в ответ на раздражение **стрекательная нить** выбрасывается и вонзается в тело жертвы. По каналу нити в организм жертвы попадает вещество, способное парализовать жертву.

Наружный слой клеток – эктодерма

Строение наружного слоя клеток (эктодерма)



В наружном слое расположены и **нервные клетки**. Они имеют звездообразную форму, т.к. снабжены выростами. Отростки соседних клеток соприкасаются и образуют **нервное сплетение**.

Наружный слой клеток – эктодерма

Строение наружного слоя клеток (эктодерма)



Между **кожно-мускульными** клетками находятся группы мелких, округлых, с большими ядрами и небольшим количеством цитоплазмы клеток, называемых **промежуточными**. При повреждении тела гидры, они начинают усиленно расти и делиться и могут превращаться в остальные типы клеток тела гидры.

Наружный слой клеток – эктодерма

Строение яйцеклетки гидры




Строение сперматозоида гидры



С приближением холода осенью в эктодерме гидры из промежуточных клеток образуются половые клетки. Различают два вида половых клеток: **яйцевые**, или женские половые клетки, и **сперматозоиды**, или мужские половые клетки.

Внутренний слой клеток – энтодерма


Строение внутреннего слоя клеток (энтодерма)




Энтодерма выстилает изнутри всю кишечную полость. В её состав входят **пищеварительно-мускульные** и **железистые** клетки.

Клетки энтодермы

Пищеварительно-мускульные клетки



Кишечная полость



ЖГУТИКИ

Пищеварительные вакуоли

Мускульное волоконце

Питание

– гетеротрофное



Каждая из **пищеварительно-мускульных** имеет 1-3 жгутика. Колеблющиеся **жгутики** создают ток воды, которым пищевые частицы подгоняются к клеткам. **Пищеварительно-мускульные** клетки способны образовывать **ложножожки**, захватывать и переваривать в пищеварительных вакуолях мелкие пищевые частицы (фагоцитоз).

Питание

– гетеротрофное



Имеющие в энтодерме **железистые клетки** выделяют внутрь кишечной полости **пищеварительный сок**, который разжижает и частично переваривает пищу.

Питание

Добыча захватывается щупальцами с помощью **стрекательных клеток**, яд которых быстро парализует мелких жертв. Координированными движениями щупалец добыча подносится ко рту, а затем с помощью сокращений тела гидра «надевается» на жертву. Пищеварение начинается в **кишечной полости** (**полостное пищеварение**), заканчивается внутри пищеварительных вакуолей **пищеварительно-мускульных** клеток энтодермы (**внутриклеточное пищеварение**). Питательные вещества распределяются по всему телу гидры. Непереваренные остатки пищи выбрасываются через рот.

Дыхание

- Гидра дышит растворённым в воде кислородом. Органов дыхания у неё нет, и она поглощает кислород всей поверхностью тела.


Выделение

- Выделение продуктов обмена также происходит всей поверхностью тела.

Раздражимость

Нервная система **диффузного типа**.

Нервная сеть и раздражимость гидры



Рефлекс

Восприятие
раздражения

Передача
возбуждения

Ответная
реакция

Рефлекс – это

ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая и контролируемая нервной системой.


Размножение

Бесполое

почкование – путем образования выроста на материнском организме, из которого образуется новая особь;

Половое

– путем слияния половых клеток – **гамет**.




Размножение

- Гермафродиты – одна особь имеет и яйцеклетки, и сперматозоиды.
- Большинство раздельнополье.



Регенерация


- **Регенерация** – восстановление утраченных или поврежденных частей тела.




Hydra

Движение

«Шагающий» способ передвижения



«Кувыркающий» способ передвижения



Выводы

- Кишечнополостные - это водные животные, ведущие прикреплённый или медленно плавающий образ жизни. Прикреплённая форма называется полипом, а плавающая – медузой.
- Тело кишечнополостных двухслойное, с полостью внутри. Наружный слой клеток называется эктодермой, а внутренний – энтодермой. Для кишечнополостных характерна радиальная симметрия тела.
- Эктодерма кишечнополостных состоит из нескольких типов клеток, выполняющих разнообразные функции. Для кишечнополостных характерно наличие стрекательных клеток, служащих им как для защиты, так и для нападения.
- У кишечнополостных впервые появляется полостное пищеварение. У кишечнополостных наблюдается два типа пищеварения: полостное и внутриклеточное.
- Сложность движений гидры обеспечивают нервные клетки, а также согласованная работа эпителиально-мускульных клеток эктодермы и пищеварительно-мускульных клеток энтодермы.
- Для кишечнополостных характерно как бесполое, так и половое размножение. Половые клетки образуются из промежуточных клеток эктодермы.

Домашнее задание:

- Сделать записи в ***тетради***.
- ***Учебник***: §12-13 (отвечать на вопросы, знать термины и определения).
- Подготовиться к тестированию по темам:
**«Простейшие», «Тип
Кишечнополостные»**
- По желанию: подготовить сообщения об
актинии, кораллах, медузах.