Решение неравенств методом интервалов

далее »

Цели урока:

1. Познакомить учащихся с решением неравенств методом интервалов.
2. Отработка навыка решения неравенств методом интервалов.
3. Повторить решение неравенств второй степени с одной переменной с помощью графика.
4. Для подготовки к ГИА повторить нахождение «нулей функции», решение квадратных уравнений по формуле, решение неполных квадратных уравнений.
5. Воспитание внимания, ответственного отношения к учебе; тренировать память.

Правило

А) $2x^2 + 3x - 5 \geq 0$



$2x^2 + 3x - 5 = 0$

D =49

X_1=1; X_2= -2,5 **Ответ:** $(-\infty;-2,5] \cup [1;+\infty)$

Б) $-6x^2 + 6x + 36 \geq 0$

$-6x^2 + 6x + 36 = 0$



D=900

X_1= -2; X_2= 3

Ответ: $[-2;3]$

В)

$$-x^2+5\le 0$$

$$-x^2+5=0$$

$X_1=\sqrt{5}$; $X_2=-\sqrt{5}$



Ответ: $\left(-\infty;-\sqrt{5}\right]\cup\left[\sqrt{5};+\infty\right)$

Д) $4x^2 - 12x + 9 \rangle 0$



Ответ: $(-\infty;1,5) \cup (1,5;+\infty)$

Е) $25x^2 + 30x + 9 \langle 0$



Ответ: Решений нет

Ж) $-10x^2 + 9x \rangle 0$



Ответ: $(0;0,9)$

З) $-2x^2 + 7x \langle 0$



Ответ: $(-\infty;0) \cup (3,5;+\infty)$

Устно:

1) -2+24

-27+13

-32-25

24+(-16)

14+(-64)

3*(-2)

-25*(-4)

-36:(- 4)

45: (-5)

2) Формула дискриминанта квадратного уравнения

3)Решить неравенства:

f(x)>0

f(x)<0





4) Формула разложения квадратного трехчлена на множители

$$ax^2 + вx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Рассмотрим решение неравенств второй степени с одной переменной.

1. решение с помощью графика квадратичной функции;
2. методом интервалов.

Назад на титульный лист

Метод рассмотрения квадратичной функции

1) Рассмотрим квадратичную функцию $f(x) = x^2 – 5x - 50$ и найдем такие значения x, для которых $f(x) < 0$.

2) Графиком рассматриваемой функции является парабола, ветви которой направлены вверх, так как $a = 1$, $1 > 0$.

3) Найдем нули функции (то есть абсциссы точек пересечения параболы с осью Ох), для этого решим квадратное уравнение $x^2 – 5x – 50 = 0$.

$x^2 – 5x – 50 = 0, \quad a = 1, \quad b = -5, \quad c = -50.$

$D = b^2 – 4ac;$

$D = (-5)^2 –4*1*(-50) = 25 + 200 = 225 = 15^2, \quad 225 > 0$, значит уравнение имеет два действительных корня.

$x_1 = (-(-5) – 15) : 2 = -5;$

$x_2 = (-(-5) + 15) : 2 = 10.$

Нули функции: $x = -5$ и $x = 10$.

« назад далее »

4) Изобразим схематично параболу $f(x) = x^2 - 5x - 50$ в координатной плоскости ***Oxy.***

5) Из рисунка видим, что
$f(x) < 0$, при $-5 < x < 10$
(то есть берем в рассмотрение ту часть параболы, которая лежит ниже оси ***Ox***).



Замечание: ответ записываем в виде числового промежутка.

Ответ: ***(-5; 10).***

« назад

Метод интервалов

1) Рассмотрим функцию $f(x) = (x+2)(x-3)(x-5)$.

Область определения $D(f) = R$ (то есть множество всех действительных чисел).

2) Найдем нули функции, т.е.решим уравнений $f(x)=0$.

$$(x+2)(x-3)(x-5)=0$$

$$x+2=0 \quad \text{или} \quad x-3=0 \quad \text{или} \quad x-5=0$$

$$x = -2 \quad \text{или} \quad x = 3 \quad \text{или} \quad x=5$$

Числа **-2, 3, 5** – нули функции, они разбивают область определения функции на промежутки



« назад далее »

Выясним, каковы знаки этой функции в каждом из указанных промежутков



Выражение (x+2)(x-3)(x-5) представляет собой произведение 3 множителей. Знак каждого из этих множителей в рассматриваемых промежутках указан в таблице

	$(-\infty;\ -2)$	$(-2;\ 3)$	$(3;\ 5)$	$(5;\ +\infty)$
$x+2$	$-$	$+$	$+$	$+$
$x-3$	$-$	$-$	$+$	$+$
$x-5$	$-$	$-$	$-$	$+$

Мы видим, что в каждом из промежутков $(-\infty;-2)$ $(-2;3)$ $(3;5)$ $(5;+\infty)$

функция сохраняет знак, а при переходе через точки -2, 3, 5 ее знак изменяется.

Правило: стр 89

« назад

далее»

Это свойство используется для решения неравенств вида

$$(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)\ldots(x-x_n)>0 \text{ или}$$

$$(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)\ldots(x-x_n)<0,$$

где x_1, x_2, …x_n – не равные нулю числа.

№1. Решить неравенство $(x+6)(x+1)(x-4)<0$

Находим нули функции $(x+6)(x+1)(x-4)=0$

$$x+6=0 \text{ или } x+1=0 \text{ или } x-4=0$$

$$x = -6 \quad \text{или} \quad x = -1 \quad \text{или} \quad x = 4$$

Отмечаем эти числа -6, -1, 4 (нули функции) пустыми кружками (т.к неравенство строго больше 0) на числовой прямой. Числа разбивают числовую прямую на промежутки, в каждом из которых функция сохраняет знак.



далее »



Определим знак функции $f(x)=(x+6)(x+1)(x-4)$ ***на каждом из промежутков***

Если x = -7, то f(-7) = (-7+6)(-7+1)(-7-4) < 0 —

Если x = -3, то f(-3) = (-3+6)(-3+1)(-3-4) > 0 +

Если x = 0, то f(0) = (()+6)(0+1)(()-4) < 0 —

Если x = 6, то f(6) = (6+6)(6+1)(6-4) +

Мы решаем неравенство $(x+6)(x+1)(x-4)<0$. ***Нас интересует, на каких промежутках функция принимает значения меньшие нуля.***

Ответ: $(-\infty;-6)\cup(-1;4)$

Данный метод решения неравенств называется методом интервалов

Попробуйте решить неравенства данным методом:

$(x+8)(x-5) > 0$

$(x+8)(x-5)=0$

$x+8=0$ или $x-5=0$

$x = -8$ или $x = 5$



$f(x) = (x+8)(x-5)$

$x = -10$, $f(-10)=(-10+8)(-10-5) > 0$

$x = 0$, $f(0)=(0+8)(0-5) < 0$

$x = 7$, $f(7)=(7+8)(7-5)>0$

Ответ: $(-\infty;-8) \cup (5;+\infty)$

Самостоятельная работа

- **1вариант**

$x^2 - 8x + 15 > 0$

$3x^2 + 11x - 4 < 0$

$x^2 - 9 \geq 0$

$(x-1)(x-3) < 0$

$x(5-x)(x+2) \leq 0$

- **2 вариант**

$x^2 - 10x + 21 > 0$

$4x^2 + 11x - 3 < 0$

$5x - x^2 > 0$

$(x-2)(x-5) \geq 0$

$6(x+11)(4-x) \geq 0$