

МИФ – прививка является
причиной возникновения
аутистического расстройства

Карагандинская областная ПМПК
2023г.

✓ Есть ли связь между прививками и аутизмом?

✓ Нет, между прививками и аутизмом нет никакой связи!

Все международные специалисты пришли к однозначному выводу, который подтверждается результатами исследований, что прививки в целом, и прививка от кори, свинки и краснухи (MMR) в частности, не приводят к аутизму.

Как возник МИФ?

В 1998 году в журнале Lancet появилось исследование, проведенное доктором Andrew Wakefield и его коллегами, в котором утверждалось: между вакцинированием и аутизмом есть непосредственная связь

Нет ничего удивительного, что такая громкая статья вызвала у других специалистов интерес, и они, в свою очередь, решили провести собственные исследования.

В 2015 году работа доктора Jane показала, что среди семей без детей, страдающих аутизмом, было вакцинировано 84% детей в возрасте от двух лет и 92% детей в возрасте до пяти лет. В семьях, где старший ребенок страдал аутизмом, случаи вакцинации были значительно ниже: 73% детей от двух лет и 86% детей до пяти лет.

Исследования проводившиеся в нескольких странах *не выявили связи между вакцинацией и возникновением аутизма* у обследованных детей.

В мета анализе вакцинации MMR и исследований аутизма в 2014 г проведенных в Дании (5), Польше(17), Японии (4, 18), Великобритании(19) и США (20), **не выявлено подтверждающей связи.**

На сегодня исследование утверждающее, что возникновение аутизма связано с вакцинацией было опровергнуто и отозвано из журнала.

Вслед за статьей доктора Andrew Wakefield были отозваны и многие другие статьи, в которых говорилось об обнаружении связи между вакцинацией и аутизмом.

Благодарим за
внимание!

МИФ - вакцинация аутизмнің бұзылуының себебі болып табылады

Қарағанды облыстық ПМПК
2023ж.

✓ Вакцинация мен аутизм арасында байланыс бар ма?

✓ Жоқ, вакцинация мен аутизм арасында ешқандай байланыс жоқ!

Барлық халықаралық сарапшылар зерттеу нәтижелерімен расталған біржақты қорытындыға келді, бұл жалпы вакцинация және қызылша, паратит және қызамыққа (MMR) қарсы егу аутизмге әкелмейді.

МИФ қалай пайда болды?

**1998 жылы Lancet журналында доктор Andrew Wakefield пен оның әріптестері жүргізген зерттеу пайда болды:
вакцинация мен аутизм арасында тікелей байланыс бар**

Мұндай қатты мақаланың басқа мамандардың қызығушылығын тудырғаны таңқаларлық емес және олар өз кезегінде өз зерттеулерін жүргізуге шешім қабылдады.

2015 жылы Доктор Джейннің жұмысы аутизммен ауыратын балалары жоқ отбасылар арасында екі жастан асқан балалардың 84% және бес жасқа дейінгі балалардың 92% вакцинацияланғанын көрсетті. Үлкен бала аутизммен ауыратын отбасыларда вакцинация жағдайлары айтарлықтай төмен болды, екі жастан асқан балалардың 73% және бес жасқа дейінгі балалардың 86%.

Бірнеше елдерде жүргізілген зерттеулер вакцинация мен тексерілген балаларда аутизмнің пайда болуы арасында ешқандай байланыс таппады.

Данияда (5), Польшада(17), Жапонияда (4, 18), Ұлыбританияда(19) және АҚШ-та (20)2014 жылы MMR вакцинациясы мен аутизмді зерттеудің мета-талдауында, растайтын байланыс анықталған жоқ.

**Бүгінгі күні аутизмнің пайда болуы
вакцинациямен байланысты деген зерттеу
жоққа шығарылды және журналдан алынып
тасталды.**

Доктор Andrew Wakefield мақаласынан кейін
вакцинация мен аутизм арасындағы байланысты
анықтау туралы көптеген басқа мақалалар
алынып тасталды.

.

Назар
аударғаныңызға
рақмет!