

Протерозойская эра.

Содержание:

- *Название эры*
- *Начало и продолжительность эры*
- *Описание . Климат*
- *Растительные Организмы*
- *Животные Организмы*
- *Важнейшие Ароморфозы*
- *Вывод.*

Протерозойская эра.

Протерозойская эра



- Протерозойский эон, протерозой (греч. πρῶτερος — первый, старший, греч. ζῶή — жизнь) — геологический эон, охватывающий период от 2500 до 542,0 ± 1,0 млн лет назад. Приходит на смену архею.
- Протерозойский эон — самый длительный в истории Земли.

Начало и продолжительность эры.



- Протерозойская эра - вторая эра от начала геологической истории Земли, огромная по продолжительности, ~2000 млн. лет.

Описание . Климат.

- На рубеже архейской и протерозойской эры в результате процессов горообразования произошло видоизменение земной поверхности с перераспределением территорий суши и моря. Поверхность планеты, представлявшая собой безжизненную пустыню с холодным климатом, подвергалась частыми оледенениям, особо обширным в середине протерозоя. В конце протерозоя, около 2 млрд. лет назад, содержание свободного кислорода в атмосфере достигло 1%, что явилось достаточным условием для устойчивой жизнедеятельности одноклеточных аэробных организмов.



Растительные Организмы.

- В течении этой эры достигли расцвета бактерии и водоросли, с участием этих организмов началось активное образование осадочных пород. Именно к протерозою относится образование крупнейших залежей железных руд органического происхождения как продукта массовой жизнедеятельности железобактерий (железистые кварциты).



Животные Организмы.

- В конце протерозоя, 900-1000 млн. лет назад, возникли первые многоклеточные животные. Древние многоклеточные растения и животные жили в придонных слоях океана. Большинство животных позднего протерозоя были представлены многоклеточными формами. Конец протерозоя называют "веком медуз". Возникают кольчатые черви, от которых произошли моллюски и членистоногие. В течении протерозоя господство пред ядерных организмов (прокариот) сменилось господством ядерных (эукариот). На смену одноклеточным и колониальным формам пришли многоклеточные. Жизнь стала геологическим фактором. Живые организмы, изменяя формы и состав земной коры, формировали биосферу Земли, а в результате фотосинтеза изменился состав атмосферы. Накопление кислорода в атмосфере способствовало появлению и развитию высших организмов - животных; предполагается, что к концу протерозоя возникли все группы животных, кроме позвоночных.



Важнейшие Ароморфозы.



- Важнейшим ароморфозом было появление дыхания - процесса, при котором разрушения органических молекул производится в 19 раз более эффективно ,чем брожение.
- около двух миллионов лет назад содержание кислорода достигло точки Пастера - около 1 процента его содержания в современной атмосфере .Такое количество было достаточным для устойчивого существования аэробных бактерий.

Вывод:



В течении протерозоя господство прокариот сменилось господством эукариот. На смену одноклеточным и колониальным формам пришли многоклеточные. Жизнь стала геологическим фактором. Живые организмы меняли форму и состав земной коры, формировали ее верхний слой - биосферу. В результате фотосинтеза изменился состав атмосферы. Накопление кислорода в атмосфере способствовало развитию высших гетеротрофных организмов- животных.