


Савченко Е.М., учитель математики,
МОУ гимназия № , г. Полярные Зори, Мурманской обл.

Соотношения между сторонами и углами треугольника

Л.С. Атанасян "Геометрия 7-9"

Повторение

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника



$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

$$h = \sqrt{b_c \cdot a_c}$$


$$b = \sqrt{b_c \cdot c}$$

$$a = \sqrt{a_c \cdot c}$$

Теорема синусов.

Стороны треугольника пропорциональны синусам противолежащих углов.

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$



$$(1) S = \frac{1}{2} ab \sin C$$

$$(2) S = \frac{1}{2} bc \sin A$$

$$(3) S = \frac{1}{2} ca \sin B$$

$$S = \frac{1}{2} ab \sin C; \quad S = \frac{1}{2} bc \sin A; \quad S = \frac{1}{2} ca \sin B$$

(1) (2) (3)


$$\cancel{\frac{1}{2}} \cancel{ab} \sin C = \cancel{\frac{1}{2}} \cancel{bc} \sin A$$

$$\frac{\cancel{a}}{\cancel{\sin C} \sin A} = \frac{\cancel{c}}{\sin C \cancel{\sin A}} \quad /: \sin C \sin A$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$$


Стороны треугольника пропорциональны синусам
противолежащих углов.

$$\frac{MO}{\sin X} = \frac{MX}{\sin O} = \frac{OX}{\sin C}$$



Стороны треугольника пропорциональны синусам
противолежащих углов.

$$\frac{CD}{\sin E} = \frac{EC}{\sin D} = \frac{DE}{\sin C}$$



Стороны треугольника пропорциональны синусам
противолежащих углов.

$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B}$$


$$\frac{AB}{\sin 45^\circ} = \frac{4}{\sin 60^\circ}$$

$$AB = 4 \cdot \sin 45^\circ : \sin 60^\circ$$

$$AB = 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} : \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$AB = \frac{4 \cdot \sqrt{2} \cdot \cancel{2}}{\cancel{2} \cdot \sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{6}}{3}$$

Найти AB



Стороны треугольника пропорциональны синусам
противолежащих углов.

$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B}$$

$$\frac{2\sqrt{2}}{\sin 135^\circ} = \frac{2}{\sin B}$$


$$\sin B = 2 \cdot \sin 45^\circ : (2\sqrt{2})$$

$$\sin B = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$\sin B = \frac{1}{2}$$


$$\angle B_1 = 30^\circ \Rightarrow \angle A = 15^\circ$$

$$\angle B_2 = 150^\circ \text{ не у\o. усл.}$$



Стороны треугольника пропорциональны синусам
противолежащих углов.

$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A}$$



$$\frac{\sqrt{2}}{\sin C} = \frac{\sqrt{3}}{\sin 60^\circ}$$

$$\sin C = \sqrt{2} \cdot \sin 60^\circ : \sqrt{3}$$

$$\sin C = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} : \sqrt{3}$$

$$\sin C = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\angle C_1 = 45^\circ \Rightarrow \angle B = 75^\circ$$

$$\angle C_2 = 135^\circ \text{ не уд. усл.}$$

$$\angle B = 180^\circ - (135^\circ + 60^\circ) < 0$$

ABCD – параллелограмм. Найти BD.

Рассмотрим $\triangle ABO$

$$\frac{AB}{\sin O} = \frac{BO}{\sin A}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} = \frac{BO}{\sin 30^\circ}$$


$$BO = \sqrt{2} \cdot \sin 30^\circ : \sin 45^\circ$$

$$BO = \sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} : \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$BO = \frac{\sqrt{2} \cdot 1 \cdot 2}{2 \cdot \sqrt{2}}$$

$$BO = 1$$

$$BD = 2$$



ABCD – параллелограмм. Найти AC.

Рассмотрим $\triangle ACD$

$$\frac{AC}{\sin D} = \frac{AD}{\sin C}$$


$$\frac{AC}{\sin 120^\circ} = \frac{5}{\sin 30^\circ}$$

$$AC = 5 \cdot \sin 60^\circ : \sin 30^\circ$$

$$AC = 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} : \frac{1}{2}$$

$$AC = \frac{5 \cdot \sqrt{3} \cdot 2}{2 \cdot 1}$$

$$AC = 5\sqrt{3}$$



ABCD – параллелограмм. Найти BC.

Рассмотрим $\triangle ABC$

$$\frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{\sin C}$$


$$\frac{BC}{\sin 45^\circ} = \frac{2}{\sin 30^\circ}$$

$$BC = 2 \cdot \sin 45^\circ : \sin 30^\circ$$

$$BC = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} : \frac{1}{2}$$

$$BC = \frac{2 \cdot \sqrt{2} \cdot 2}{2 \cdot 1}$$


$$BC = 2\sqrt{2}$$



Теорема косинусов.


Квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла между ними.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$



$$\cos A = \frac{x}{b} \quad x = b \cos A$$

$$\sin A = \frac{y}{b} \quad y = b \sin A$$



$$d^2 = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$BC^2 = (b \cos A - c)^2 + (b \sin A - 0)^2 =$$

$$= b^2 \cos^2 A - 2bc \cos A + c^2 + b^2 \sin^2 A$$

$$= b^2(\cos^2 A + \sin^2 A) + c^2 - 2bc \cos A$$

$$x = b \cos A$$




$$x = OA \cdot \cos a$$

$$y = b \sin A$$



$$y = OA \cdot \sin a$$



$$d^2 = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$BC^2 = (b \cos A - c)^2 + (b \sin A - 0)^2 =$$

$$= b^2 \cos^2 A - 2bc \cos A + c^2 + b^2 \sin^2 A$$

1


$$= b^2(\cos^2 A + \sin^2 A) + c^2 - 2bc \cos A$$

Теорема косинусов.

Квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла между ними.

$$AB^2 = BC^2 + CA^2 - 2 \cdot BC \cdot CA \cos C$$

$$AB^2 = BC^2 + CA^2$$




Теорему косинусов иногда называют обобщенной теоремой Пифагора.

Квадрат стороны треугольника равен
сумме квадратов двух других сторон
минус удвоенное произведение этих сторон
на косинус угла между ними.

$$XR^2 = RO^2 + XO^2 - 2 \cdot RO \cdot XO \cos O$$


$$RO^2 = RX^2 + XO^2 - 2 \cdot RX \cdot XO \cos X$$


$$XO^2 = RX^2 + RO^2 - 2 \cdot RX \cdot RO \cos R$$



F

Запишите для данного
треугольника теорему синусов
и теорему косинусов для
каждой стороны.

D  **C**



$$c^2 = b^2 + a^2 - 2ab \cos C$$

$$2ab \cos C = b^2 + a^2 - c^2 \div : 2ab$$

$$\cos C = \frac{b^2 + a^2 - c^2}{2ab} > 0$$

На практике удобно сравнивать квадрат **большой** стороны и сумму квадратов двух других.

$$b^2 + a^2 \equiv c^2 = 0 \Rightarrow \cos C = 0, \angle C = 90^\circ$$

$$b^2 + a^2 \rhd c^2 > 0 \Rightarrow \cos C > 0, \angle C - \text{острый}$$

$$b^2 + a^2 \lhd c^2 < 0 \Rightarrow \cos C < 0, \angle C - \text{тупой}$$

Определите вид треугольника со сторонами 5, 6 и 7 см.

$$5^2 + 6^2 > 7^2 \Rightarrow \text{треугольник остроугольный}$$

Определите вид треугольника со сторонами 2, 3 и 4 см.


$$2^2 + 3^2 < 4^2 \Rightarrow \text{треугольник тупоугольный}$$

Какой угол в данном треугольнике тупой?

Найти угол В

$$2^2 + (2\sqrt{3})^2 = 4^2$$

$\Rightarrow$ треугольник прямоугольный




Квадрат стороны треугольника равен
сумме квадратов двух других сторон
минус удвоенное произведение этих сторон
на косинус угла между ними.

Найти АВ

$$AB^2 = BC^2 + AC^2 - 2 \cdot BC \cdot AC \cos C$$

$$AB^2 = 41 - 40 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$AB^2 = \sqrt{41 - 20 \cdot \sqrt{3}}$$




Квадрат стороны треугольника равен
сумме квадратов двух других сторон
минус удвоенное произведение этих сторон
на косинус угла между ними.

Найти BC

$$AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cos A$$

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cos A$$



$$BC^2 = 72 - 72 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$BC^2 = 108$$

$$BC = \sqrt{108}$$

36 · 3

$$BC = 6\sqrt{3}$$

ABCD – параллелограмм. Найти BD.

Рассмотрим $\triangle ABD$


2 2

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2 \cdot AB \cdot AD \cos A$$

$$BD^2 = 34 - 30 \cdot \frac{1}{2}$$

$$BD^2 = 19$$


$$BD = \sqrt{19}$$



ABCD – ромб. Найти AC.

Рассмотрим $\triangle ACD$

$$AC^2 = \overset{2}{AD^2} + \overset{2}{CD^2} - 2 \cdot AD \cdot CD \cos D - \cos 45^\circ$$
$$AC^2 = AD^2 + CD^2 - 2 \cdot AD \cdot CD \cos D$$



$$AC^2 = 18 - 18 \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$AC^2 = 18 + 9\sqrt{2}$$

$$AC^2 = \sqrt{9(2 + \sqrt{2})}$$

$$AC = 3\sqrt{2 + \sqrt{2}}$$