

Бауыр және өт жолдары, ұйқы безі ауруларын тағаммен емдеу және емдік дене шынықтыру

Тобы: ЖМ - 119

Қабылдаған: Есалиев Е

Орындаған: Нурматова Г

- Бауыр – ең күрделі безді құрылым және ең ірі паренхиматозды мүше болып табылады. Бауырдың функционалды бірлігі бөлікшелер болып табылады, олар бауырдың биосинтетикалық, секреторлы және экскреторлы процестерге қатысуын қамтамасыз етеді.



- Әр түрлі себептерге байланысты липидтер бауырда жинақталуы мүмкін. Бауырда майлар көп мөлшерде жинақталған кезде фиброзды өзгерістер жүреді. Бұл циррозға және бауыр қызметтерінің зақымдалуына әкеледі.

**Бауырдың
майда қайта
құрылуы**

**1.Қан
плазмасында
бос май
қышқылдарын
ың мөлшерінің
артуы**

**2.Қан плазмасы
липопротеиндер
і түзілуінің
метаболикалы
қ тежелуіне
байланысты**

Функциясының бұзылуы

- Бауыр қызметтерінің зақымдалуын анықтау – глюкозаны, тура және тура емес билирубинді, мочевианы, зәр қышқылын, индиканды, глобулиндерді, АлТ, АсТ және амилазаны анықтау сиықты тәсілдермен жүзеге асырылады. Өткір инфекциялық гепатит кезінде АсТ мен салыстырғанда АлТ белсенділігі күрт артады.





- Бауыр және өт жолдарының ауруларының бір неше түрі бар. Олар:
- **Өт жолдарының дискинезиясы** – өт жүруінің бұзылысына әкелетін өтқабының қабынуы
- **Созылмалы тассыз холецистит** –өтқабы қабырғасының зақымдануына, моторикасының бұзылуына әкелетін және өт тастарының түзілуіне септігін тигізетін өтқабының бейспецификалық қабыну ауруы
- **Созылмалы гепатит** – бауырдың 6 айдан артық созылатын полиэтиологиялық диффузды қабыну ауруы
- **Бауыр циррозы** – бауыр шамасыздығы мен порталды гипертензияға әкелетін бауырдың диффузды зақымдану процесі.

Емдәм

- №5 емдәм беріледі, өтқабының түйілуін қоздыратын өсімдік майы, майлы қамырдан жасалған тағамдар, газды сусындар шектеледі; науқасты аз аздан күніне 4 – 5 рет тамақтандырады.
- **Спазмолитіктік дәрмектер:** миолитиктер – но-шпа, галидор, нитроглицерин, нитросорбид. Бұл миолитиктерді ұзақ уақыт қолдануға болады



- **Холинолитиктер:** гастроцепин, атропин, метацин, платифиллин шаншуды басу үшін аз уақытқа қолданылады.
- **Холеретиктер тобының өт айдаушы дәрмектері:** лиобил, аллахол, холензим, фламин, жүгерінің шашақтары, итмұрын, никодин және т.б өттің сұйық затын көбейтеді.

- **Зондсыз дюбаж** – (минералды сумен немесе жүгері шашағының тұндырмасымен) аптасына 1-3 рет, барлығы 4-8 процедура.
- **Зондсыз тюбаждарды** - етеккір келер алдында үнемі жасаған тиімді.

- **Седативті дәрмектер** – психовегетативтік бұзылыстарда транквили заторлы жеңіл дозада беріп көреді.
- **Физиотерапия** – электрлік ұйқы; Щербак әдісімен гальваникалық жаға; мойынның симпатикалық түйіндеріне натрий оксибутиратымен электрофарез т.б.

- **Өттің бактериялық егісімен дуоденалды зонттау жүргізіледі.**
- **Бауыр ауруларын ерте диагностикалау мақсатында бауырдың тамырларын ультрадыбыстық доплерлік зерттеу болып табылады. Физиоёмшаралар кеңінен қолданылады: лазеротерапия, электрофарездер, озокеритті және балшық аппликациялар, қабынуға қарсы және тыныштандырғыш ванналар, массаж және емдік дене шынықтыру.**