

ОБЕРЕЖНО – СКАЗ!



Сказ (Інші назви: рабієс (лат. rabies), застаріле - гідрофобія, водобоязнь) - **гостре інфекційне захворювання, що виникає після укусу зараженої тварини, що протікає з важким ураженням нервової системи і закінчується, як правило, смертельним результатом.**

3



Сказ було відомо людям задовго до нашої ери і описано в різних найдавніших книгах

До 80-х років XIX століття людина не мала надійний засіб захиститися від цієї страшної хвороби.



Що провокує

Сказ:

Відноситься до групи

МИКСОВИРУСОВ

Вірус патогенних для більшості теплокровних тварин і птахів. азлічають вуличний (циркулює в природі) та фіксований вірус сказу, підтримуваний в лабораторіях. Проникнення вірусу в клітини відбувається шляхом адсорбційного ендоцитозу - віріони виявляються у вигляді включень, оточених мембраною, адсорбованих на мікротубулах і в складі лізосом.



60%

24%

10%

3%



HW

Показання до вакцинації проти сказу


Загальну вторинну профілактику (вакцинопрофілактику) починають негайно при:

- Всіх укусах, подряпинах, ослинення*
- шкірних покривів слизових оболонок,*
- нанесених явно скаженими, підозрілими*
- на сказ або невідомими тваринами;*
- При пораненні предметами, забрудненими слиною або мозком скажених або підозрілих на сказ тварин;*
- При укусах через одяг, якщо вона пошкоджена зубами;*
- При укусах через тонку або в'язаний одяг;*
- При укусах, ослинення і нанесенні подряпин здоровим в момент контакту твариною, якщо вона протягом 10-денного спостереження захворіло, загинуло або зникло;*
- При укусах дикими гризунами;*
- При явному ослинення або пошкодженні шкірних покривів хворим на сказ людиною.*

Коли щеплення проти сказу робити не треба

Щеплення не проводять:

- При укусах через неушкоджену щільну або багатошаровий одяг;
- При пораненні не хижими птахами
- При укусах домашніми мишами або щурами в місцевостях, де сказ не реєструвалося останні 2 роки;
- При випадковому вживанні термічно обробленого м'яса і молока скажених тварин;
- Якщо протягом 10 днів після укусу тварина залишилося здоровим.
- При укусі тваринам за 10 днів і більше до їх захворювання;
- При ослинненні і укусах легкої та середньої тяжкості, нанесеними здоровими в момент укусу тваринами, при сприятливих даних (у даній місцевості не зустрічається сказ, ізольоване утримання тварини, укус спровокований самим постраждалим, собака вакцинована проти сказу). Проте, в цьому випадку за твариною встановлюють 10-денний ветеринарне спостереження з тим, щоб почати щеплення в разі прояву у нього ознак сказу, а також загибелі або зникнення;
- При спровокованому ослинненні непошкоджених шкірних покривів невідомим домашнім тваринам в благополучних щодо сказу областях;
- У випадках контакту з хворим на сказ людиною, якщо не було явного ослиннення слизових оболонок або пошкодження шкірних покривів.



Порядок вакцинації проти бешентсва
Активну імунізацію починають негайно.
Вакцину вводять внутрішньом'язово по
1 мл 5 разів: у день інфікування, потім
на 3 7 14 і 28-й день). При такій схемі
завжди створюється задовільний
імунітет. Тому рутинне епідеміологічне
дослідження не рекомендується.
ВООЗ рекомендує ще і 6-ю ін'єкцію
через 90 днів після першої.

Дякую за

увагу!!!

