




СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК
КАФЕДРИ АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ



24.10.2017

16:00



КИЇВСЬКИЙ
МІСЬКИЙ
ПОЛОГОВИЙ
БУДИНОК №6

ВУЛ. ПЕТРА
ЗАПОРОЖЦЯ 26А

ВІРУС ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ

*Методи діагностики та лікування.
Роль ВПЛ у розвитку
передракових захворюваннях
шийки матки.*



- НЕОБХІДНО МАТИ:
- 1.Хірургічний костюм
 - 2.Змінне взуття
 - 3.Шапочка
 - 4.Маска



Староста гуртка
Євтушок Вікторія

0975073928
0734513857

<https://vk.com/victoriayevtushok>
<https://www.facebook.com/victoria.yevtushok>

 [facebook.com/groups/nmu.obstetrics.and.gynecology.2](https://www.facebook.com/groups/nmu.obstetrics.and.gynecology.2)
 vk.com/nmu.obstetrics_and_gynecology_



Рак шийки матки 

99,8% ДНК ВПЛ



Рак шийки матки 


99,8% ДНК ВПЛ

AstraZeneca 

200



40



HPVs



Low-risk HPVs



high-risk HPVs

6

11

16


18



**long-term infect with
high-risk human
papillomaviruses**

90%

10%



75-57%

25-33%


ФАКТОРИ РИЗИКУ

- Ранній початок статевого життя і часта зміна статевих партнерів.
- Хронічні запальні захворювання шийки матки.
- Велика кількість пологів




травматизац

ія



- Довготривале використання КОК (проліферативний вплив естрогеного компоненту).
- Імунодефіцитні стани.
- Генетична схильність.
- Жінки, у партнерів яких було діагностовано рак головки статевого члена.
- Низький соціальний рівень.
- Перший статевий акт до 16 років.




L1




E6



E7






3-4 РОКИ ВАКЦИНИ

HPV4	Гардасил 	6 11 16 18	9-26 РОКІВ	
HPV2	Церварікс 	16 18	10-25 РОКІВ	

Papillomavirus



 = Antibodies


No DNA strands
can escape the capsid

HPV DNA Test

**10*5 вірусних копій в 1 мл
зразку**

ВПЧ Digene-Тест®

Pap Test



Цитологічне дослідження	ВПЛ	ПОВТОРНЕ ЦИТОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
N	-	Через 3 роки
N	+	Через 1-2 роки
Атипові клітини	-	+Мікробіологічне дослідження. Через 6-12 місяців.
Атипові клітини	+	+мікробіологічне дослідження. Через 3-6 місяців.
Легка дисплазія	-	Через 6-12 місяців.
Легка дисплазія	+	Через 3-6 місяців.
Помірна дисплазія	+/-	+Кольпоскопія,біопсія(?) Через 3-6 місяців.
Тяжка дисплазія	+/-	Кольпоскопія,біопсія.