

Эклампсия у собак



Работа выполнена студентом
Вологодской государственной
молочнохозяйственной академии
имени Н.В.Верещагина
Максимовой Елизаветой 711гр.
10.12.18

Что такое эклампсия?

- Эклампсия – это дефицит кальция в организме. Другие названия – послеродовая или лактационная тетания, гипокальцемия, в народе ее прозвали «молочной лихорадкой». Заболевание очень опасно, а без лечения животное может погибнуть.

- Эклампсии подвержены собаки средних и мелких пород. Животные, которые принесли многочисленное потомство, также находятся в группе риска. Проявляется болезнь в первые 1,5-2 недели после



Основные причины развития болезни:

- 1) Неполюноценное питание. Избыток белка является частой причиной развития гипокальцеии.
- 2) Заболевания почек. Так как кальций быстро выводится из организма, вследствие развивается его нехватка.
- 3) Интенсивная лактация. Данная причина относится к многоплодным собакам, у которых вырабатывается большое количество молока, но из-за избыточной нагрузки на организм уровень кальция не успевает восстанавливаться.

Симптомы эклампсии у собак и течение заболевания.

- Эклампсия у собак развивается поэтапно. Сначала животное становится раздражительным, его дыхание учащается. После этого к симптомам добавляется повышенное слюноотделение и нарушение координации, у собаки поднимается температура тела, зрачки сужаются. На последней и самой опасной стадии болезни животное очень тяжело дышит. Температура тела становится критично высокой, что приводит к развитию отека мозга. На этой стадии риск гибели животного очень велик.



Лечение эклампсии у собак.

- Если у собаки проявились признаки эклампсии, то нужно немедленно оказать ей первую помощь. Для этого нужно выпаивать животного Валокордином (5 капель на $\frac{1}{2}$ стакана воды) и Кальция глюконатом 10% (дозировка – на 1 кг веса 2 мл). Не стоит вводить этот препарат внутримышечно, так как это может привести к некрозу тканей. Эти меры облегчат состояние животного . После оказания первой помощи нужно немедленно показать животное ветеринару.

- Очень важно соблюдать профилактические меры, которые позволят избежать развития эклампсии у собак:
 - 1) За 2 недели до предполагаемых родов нужно подкорректировать рацион животного: уменьшить объем скармливаемого мяса и увеличить количество кисломолочной продукции (творог, кефир, простокваша)
 - 2) Если собака после родов отказывается от пищи, то нужно кормить её насильно
 - 3) Нужно давать питомцу препараты и витамины, содержащие кальций, но перед этим обязательно проконсультироваться с ветеринаром.



Спасибо за внимание!

