

НАСЕКОМЫЕ УШАКОВОЙ БАЛКИ



Список насекомых

1. Адмирал
2. Американская белая бабочка + гусеница
3. Богомол обыкновенный
4. Жужелица крымская - Эндемик (встречается только в Крыму)
5. Жук-навозник
6. Жук-олень - Красная книга
7. Капустница
8. Красотел пахучий
9. Кузнечик
10. Махаон
11. Мертвая голова
12. Непарный шелкопряд + гусеница
13. Подалирий
14. Репейница
15. Саранча
16. Усач дубовый –Красная книга
17. Цикада обыкновенная –Красная книга

Адмирал



Красные полосы на крыльях (как лампасу у адмирала). Размах крыльев достигает 5 - 6,5 см. Широко распространённый многочисленный вид. Может зимовать, совершает перелёты, является активным мигрантом.


Махаон



Дневная бабочка из семейства парусников или кавалеров. Задние крылья имеют «хвостики» до 10 мм. Окраска задних крыльев с синими пятнами, красно-бурый глазок, окружённый чёрным, располагается в углу крыла. Махаон назван шведским натуралистом Карлом Линнеем в честь персонажа греческой мифологии врача Махаона, по преданиям являвшегося сыном Асклепия и Эпионы и принимавшего участие в походе греков на Трoю во время Троянской войны (на рубеж XIII—XII веков до н. э.)





Подалирий



Бабочка семейства парусников. Вид назван в честь Подалирия, в древнегреческой мифологии - знаменитого врача, сына Асклепия и Эпионы. Основной цветовой фон крыльев светло-жёлтый, передняя пара с чёрным рисунком из 7 вертикальных клиновидных полос, задняя — с чёрно-голубым окаймлением.



Репейница



Бабочки чертополоховки имеют весьма обширное распространение. Их нельзя встретить только в Антарктиде и в странах Южной Америки. Ее северная граница распространения достигает тундры. Одна из самых известных среди бабочек-путешественниц, перелетающих на большие расстояния для зимовки


Мертвая голова



Мертвая голова – ночная бабочка. Она отдыхает днем, а когда спускаются сумерки выходит на охоту. Крупная массивная бабочка с размахом крыльев до 13 см, принадлежащая к семейству бражников). Самый крупный представитель семейства в фауне Европы и России, является второй по величине бабочк, поэтому её называют волком. Кормовое растение – олеандр. Самая тяжёлая бабочка в Европе.



Непарный шелкопряд



Опасный вредитель, повреждает деревья лесных и плодовых пород. Среди плодовых предпочитает яблоню, грушу, сливу и абрикос. Из лесных пород — дуб, граб и тополь, ест листья так усердно- даже хруст слышен.

Гусеница и кладка яиц непарного шелкопряда



Американская белая бабочка



Американская белая бабочка откладывает яйца, из которых потом появляются прожорливые гусеницы, уничтожающие листья садовых деревьев.

Гусеницы американской белой бабочки



ХОЗЯЙСТВО

Капустница



Кроме капусты бабочка портит редьку, рапс, редис, хрен, репу, иногда от нее страдают также настурция, каперсы и чеснок

Богомол обыкновенный



Крупное хищное насекомое с приспособленными для хватания пищи передними конечностями. Достигает в длину 42-52 мм или 48-75 мм, может съесть до 30 кг. за лето

Усач дубовый



Большие усы.

Красная
книга

Крымская жужелица



Один из самых крупных и красивых жуков хищников, обитающих на просторах полуострова Крым. Является **ЭНДЕМИКОМ** Крыма. Длина тела до 52 мм. Защищаясь может брызнуть фиолетовой жидкостью. Питается малюсками (улитками)

Жук-навозник



- Относится к семейству жуков-землекопов, другое название насекомого – бурильщик. Учёными признан тот факт, что жук является большим трудоголиком, выполняет массу полезных дел в саду и огороде, является санитаром. Из навоза делает шарики, этим запасает еду для личинки. Дерутся между собой за шарик, нахалы забирают еду у другого. Если летают – будет хорошая погода.

Жук-навозник



Красотел пахучий



Крупный жук из семейства жужелиц. Отличается золотисто-сине-зелёными надкрыльями и резким запахом, который жук издаёт в случае опасности. Питается гусеницами шелкопряда.

Жук-олень



- Является самым крупным жуком, обитающим на территории Европы: отдельные особи самцов номинативного подвида могут достигать длины до 86-91 мм . Также является вторым по величине жуком (после реликтового дровосека), обитающим на территории России.. Рога нужны для того, чтобы заваевать самку. **Красная книга.**

Кузнечик



Длина кузнечика зависит от вида и находится в диапазоне от 1 до 5 см, но есть некоторые особи размер которых достигает 15 см.

Отличительная черта- длинные усы, глазки маленькие, мордочка заострённая.

Саранча



Усы маленькие, меньше тела. Глаза –большие. Мордочка - добродушная. Способна образовывать крупные стаи (численностью до сотен миллионов особей), мигрирует на значительные расстояния. Может лететь непрерывно несколько суток съедая всё на своем пути. Порой после её набега наступал голод и люди приспособились есть саранчу (сушили, солили и т.д.).

Цикада обыкновенная

Красна книга.



Тело коренастое, чёрного цвета, со слабо развитым пятнистым рисунком охристо-оранжеватого цвета. Голова заметно уже переднеспинки, передний край теменной поверхности головы выступает. Крылья стекляннстые, прозрачные, с темными жилками без какого-либо рисунка. Звук издают только самцы, этим привлекают самку.

