


Your Company slogan in here

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ

Клиника рассеянного склероза

Симптомы поражения пирамидного тракта.





Симптомы поражения проводников мозжечка.

Статическая и динамическая атаксия

Дисметрия, гиперметрия, асинергия

Интенционное дрожание и мимопопадание при выполнении координаторных проб.

Скадированная речь

Макрография

Гиперкинетические варианты РС (в тяжелых случаях проявляется дрожанием рук головы и туловища, возникающие в покое)



Симптомы поражения черепных нервов

II

**Снижение остроты зрения,
побледнения
височных половин ДЗН**

III

**Глазодвига
тельные
нарушения**

V

**Односторон
ние
нарушения
чувствитель
ности в
лице, на
языке**

VI

**Межъядерная
офтальмо-
плегия
Горизонталь-
ный нистагм**

VII

**Невропатия
лицевого
нерва**

Изменения глубокой и поверхностной чувствительности

На ранних стадиях - асимметрия вибрационной чувствительности и расстройства болевой чувствительности без четкой локализации.

На поздних стадиях – нарушение чувствительности по проводниковому типу



Нарушение функции тазовых органов

1 Императивные позывы

2 Учащение мочеиспускания

3 Задержка мочеиспускания

4 Недержание мочи



Нарушение половой функции



Психические изменения

Включают как снижение интеллекта так и нарушение поведения

Депрессия (умеренная и тяжелая), снижение интереса и мотиваций

Эйфория

Синдром постоянной усталости, сонливость

•

Частой жалобой больных РС является боль:

- массивный очаг демиелинизации в области таламуса
- симптом Лермитта – ощущение прохождения «электрического тока» при наклоне головы вперед вдоль позвоночника, в руках и ногах
- Боль, как следствие спастики и инфекционных осложнений


Пароксизмальные феномены (тонические спазмы, гиперкинезы, дизартрия, атаксия, зуд, двоение, нарушение дыхания и др.) и эпилептиформные приступы

Большое значение имеет приходящее нарастание выраженности двигательных и зрительных симптомов после интенсивной физической нагрузки и при повышении температуры (симптом «горячей ванны»)

Подозрение на РС вызывают:

- Невралгия тройничного нерва в молодом возрасте;
- Повторяющиеся эпизоды невропатии лицевого нерва, особенно двухсторонней;
- Лицевая миокимия (тонкие волнообразные подергивания мимических мышц);
- Немотивированная астения;
- Приходящие нарушения зрения, двоение;
- Вестибулярное головокружение, сопровождающееся признаками поражения ствола (вертикальным нистагмом, дисфункцией тройничного или лицевого нерва и т.д.)

Варианты течения РС:



1. **Прогрессирующее течение с обострениями** – прогрессирование с самого начала болезни, на фоне которого в дальнейшем возникают обострения (6%)
2. **Вторично-прогрессирующее** – первоначально ремиттирующее течение сменяется прогрессированием с развитием обострений и без них и *in remission*
3. **Первично-прогрессирующее** – прогрессирование заболевания с самого начала с временной стабилизацией или временным незначительным улучшением (10%)
4. **Ремиттирующее течение** – полное или неполное восстановление функций в периоды между обострениями и отсутствием нарастания симптомов в ремиссию (75-85%)

Формы рассеянного склероза

Оптикомиелит
Девика

Злокачественное неуклонно прогрессирующее течение + симптомы поражения спинного мозга и зрительных нервов.

Концентрический
склероз Бало

Процесс неуклонно прогрессирует с образованием больших очагов демиелинизации в белом веществе головного мозга иногда с вовлечением серого вещества.

Your Business Company slogan in here

Спасибо за внимание!

www.themegallery.com