

Тема. Ранний возраст

Мы в ответе за будущего ребенка




1. Осложнения во время беременности




- Не каждая беременность, к сожалению, проходит без осложнений

1.1.Внематочная беременность




10-11 недель, около 3,5см в сидячем положении



- Развитие оплодотворенной яйцеклетки вне полости матки.
- Внематочная беременность прерывается на 4 – 8 неделе

1.3. Отслойка плаценты



- Отделение плаценты от стенки матки. Случается прежде всего у:

- пьющих;
- курящих;
- употребляющих наркотики

1.4. ТОКСИКОЗЫ



Заболевания беременных, связанные с развивающимся плодным яйцом; как правило, исчезают в послеродовом периоде, а иногда еще во время беременности

Различают:

- ранние токсикозы (в 1 половине беременности)
- поздние (во 2 половине беременности)

1.5. Лекарства во время беременности



Почти все лекарства могут накапливаться в тканях плода, поэтому многие «безобидные» препараты во время беременности могут стать опасными

1.6. Инфекционные заболевания во время беременности

Ангина



Опасна возможностью переноса током крови возбудителя и развития тяжелого заболевания.

Нередко ведет к внутриутробной смерти плода или прерыванию беременности

Гепатит



Характеризуется поражением печени и развитием желтухи.

Отрицательно влияет на течение и исход беременности: преждевременные роды, внутриутробная смерть плода.

Не исключается внутриутробное заражение плода

Грипп



- Сочетание болезни с беременностью неблагоприятно. Возможен переход вируса через плаценту, что ведет к заболеванию плода
- Опасен во все сроки беременности, т.к. ведет к уродствам плода, выкидышам, внутриутробной смерти, преждевременным родам

Дизентерия



Характеризуется болями в животе, высокой температурой тела, тошнотой.

Оказывает неблагоприятное влияние на течение и исход беременности: часто заканчивается выкидышем, преждевременными родами

Краснуха



Характеризуется повышением температуры тела, появлением сыпи. Передается воздушно-капельным путем.

Неблагоприятно для плода. Ведет к развитию врожденных пороков сердца, развивается глухонемота, аномалии развития зубов.

Нередко наблюдается самопроизвольный аборт.

1.7. Курение во время беременности



Последствия женского курения



Пассивное курение



- в семьях, где курят один или оба родителя, дети в два раза чаще болеют воспалением легких, бронхитом и астмой;
- табак сужает кровеносные сосуды и нарушает насыщение крови кислородом. Дети курящих родителей в 6 раз чаще страдают желудочно-кишечными заболеваниями;
- у девочек, которые с рождения являлись пассивными курильщиками, в дальнейшем чаще наблюдается бесплодие;
- если у ребенка есть аденоиды, они начинают более интенсивно развиваться за счет раздражающего влияния дыма;

1.8. Алкоголь во время беременности



- «В больнице мальчика помыли и обследовали. Он был бледен, холоден, сердце билось 200-210 раз в минуту. В моче нашли ацетон, а изо рта два дня попахивало перегаром.».

Последствия женского алкоголизма



1.9. Наркотики во время беременности



1.10. Кофеин



- Употребление кофеина повышает риск выкидыша у беременных женщин


2. Асфиксия новорожденного



Тяжелое состояние, возникающее в результате резкого недостатка кислорода и накопления углекислого газа в организме


3. Родовая травма

- Патологическое состояние, развившееся во время родов и характеризующееся повреждениями тканей и органов ребенка, сопровождающимися, как правило, расстройством их функций


Болезни новорожденных. Родовая травма _____ Педиатрия 

Родовая травма

← Симптом "заходящего солнца"




Родовая травма центральной нервной системы. Высокий мышечный тонус: голова запрокинута, нижние конечности разогнуты, кисти в виде "тюленьей лапки"



ИИО Екатеринбург, 650083, Челябинск, пр. Ленина, 78. Юрид. лиц. [021] 342-9929. Internet: www.izdatel.ru

Т

КОСТНОЙ СИСТЕМЫ



- Относятся трещины и переломы, из которых наиболее часто наблюдаются повреждения ключицы, плечевых и бедренных костей.
- Прогноз при этих переломах благоприятный

внутренних органов



Является следствием механических воздействий на плод при неправильном ведении родов.

Наиболее часто повреждаются печень, селезенка и надпочечники.

Иногда появляются опухоли.

4. Кесарево сечение



- **Кесарево сечение** - акушерская операция, посредством которой плод извлекается из матки после предварительного разреза брюшных стенок и самой матки

5. Вес ребенка более 4 кг



- «Крупный малыш – крупные проблемы»

6. Кормление грудью и...



Период от рождения до 3 месяцев



- Ведущие реакции в этот период:
- зрительные;
- слуховые;
- эмоциональные

Ребенок рождается с готовой системой безусловных рефлексов, которые частично обеспечивают приспособление к внешней среде:



- сосательный;
- рефлексы зрительного аппарата (зажмуривает глазки);
- рефлексы слухового аппарата (вздрагивает от резкого звука);
- рефлексы вестибулярного аппарата (успокаивается при укачивании)

Комплекс оживления



В состав комплекса оживления входит ряд реакций:

- эмоциональная (улыбка);
- голосовая (звуки);
- двигательная (движения рук и ног)

игрушки



- Яркую крупную игрушку держат на расстоянии 40-60 см от глаз ребенка
- Иногда приводят ее в движение, чтобы ребенок за ней следил взглядом



- Хорошо лежит на животе, опираясь на предплечья, высоко поднимая голову

Период от 3-6 месяцев



- Различает интонацию речи взрослого. По-разному реагирует на ласковый и строгий голос.



- В этот период дети используют свое умение произносить звуки для привлечения внимания взрослого



- Ребенок переворачивается со спины на живот, с живота на спину.

Период 6-9 месяцев



- Ползание – первый вид активного передвижения ребенка.
- Научившись ползать, малыш сам садиться и вскоре устойчиво сидит.
- Обучать ребенка сидеть раньше этого периода вредно, т.к. это может привести к искривлению позвоночника



- В этом возрасте на вопрос «где?» поворачивают голову в сторону называемого предмета

Период 9-12 месяцев



- Умение самостоятельно ходить

питание

