

Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық
Қазақ-Түрік университеті
Шымкент медицина институты

Тақырып: Ангионевротикалық
ісіну. Квинке ісігі

Қабылдаған: Жаңабаев Н.С
Орындаған: Сиргебаева К.Б
ЖМК-502

Ангионеврозды ісік

- *Ангионевроздың ісік* деп жергілікті иннервация бұзылғандықтан капилляр қабырғасының өткізгіштігі артқаннан пайда болатын ісікті айтады Бұл ісік тез пайда болып, тез жойылып кетеді. Көбіне бетте, кеудеде және қол-аяқта болады.

Ісіктің түрлері:

- 1. Жалпы ісік
- 2. Дененің белгілі бір жеріндегі ісік
- 3. Ангioneвроздық ісік.

Жалпы ісіктің негізгі себептері.

- Жүрек әлсіздігі (шамасыздығы)
Бүйрек аурулары
- Ашықтық (дистрофия, какехсия)
Микседема
- Жергілікті ісік вена тамырының қабынуынан не қысылып қалғаннан болады (тромбофлебит, венаның варикозды кеңеюі т.б.)

Клиникалық белгілері

- Науқас аяқ астынан тері, тері асты маймен қатайып, қалындап іскенін байқайды. Бұл өзгеріс көбінесе науқастың ернінде, қабағында, бетінде, тіпті жыныс мүшелерінде пайда болады. Іскен жерді басқанда із қалмайды, себебі қалындап қатты болды. Бұл науқастың ең қиыны сол, ол тамақта, жұтқыншақта, кеңірдекке жақын жерде пайда болса. Бұл кезде ауа жетпеей, адам көп жөтеледі. Уейін бетінің бозарып көгеруі байқалады. Бұл жағдайда науқастың өліп кетуі мүмкін. Кейде тіпті ішкі ағзаларға да таралуы мүмкін, бұл өте ауыр жағдай.

Квинке ісігі

- **Квинке ісінуі** кәрі жастағы адамдарда сирек кездеседі. 60 жастан асқан адамдардағы өршімелі Квинке ісінуі қатерлі жаңа түзіліс болуы мүмкіндігін айқындайды. Шектелген (сульфаниламидті) эритема жиі сульфаниламидті, дапсонды дәрілерді, тетрациклиндерді, анальгетиктерді қабылдаумен байланысты дамиды. Қою күлгін немесе бұрыл түсті дөңгеленген ошақтар көрінеді, үдеріс соңында дақ қалады.

- Қарттардағы тері қышымасы, немесе кәрілік қышымасының этиологиясы мен патогенезі жеткіліксіз зерттелген. Пайда болу механизмі күрделі, бірақ оның теріге химиялық және физикалық, ферментативті, иммундық, аллергиялық әсер етуімен байланысты нейрогуморалды табиғаты күмән келтіре қоймас. Қарттардағы тері қышымасының себебінде тіндердің қоректенуінің бұзылысын тудыратын жүрек–тамыр жүйелерінің аурулары, асқорыту жолы мен эндокринді жүйе аурулары жатуы мүмкін. Тері қышымасы жиі лимфогранулематозбен, қант диабетімен, гипертиреозбен, қатерлі ісіктермен қосарланады.



- **Квинке ісігі** – бұл ауыр аллергиялық реакцияның бір түрі. Бұл жағдайда теріасты клетчаткасының ісігі өте тез дамиды.
- Көбіне көмей ісінеді, ерін, қабақ, жақ, ауыз клетчаткалары жиі зақымданады.
- Аса қауіптісі – көмейдің ісінуі, өйткені мұның тұншығып өлу себебіне айналуы мүмкін.
- Квинке ісігінің дамуына түрлі дәрі-дәрмектер, өсімдік гүлдерінің иісі, араның шағуы, цитрусты және басқа тағамдар, жалпы аллергия шақыратын кез келген зат ықпал етеді.
- Кесел дамуының алғашқы белгісі дауыстың қарлығы мен қырылдап шығуы. Одан соң азапқа салатын күшті “үргендей” жөтел пайда болады, кейін тыныс алу қиындайды, ентігу үдейді. Науқастың беті көгереді, одан соң бозарады.
- Сәйкес көмек берілмесе, адам есінен танып, қайтыс болады.



- Бұл сол есекжем аурулардың бірі. Есекжемде науқастың терісі өзгеріске ұшыраса, бұнда тері және тері асты майы мен қоса өзгерістерге ұшырайды. Себептеріне жататындар әр түрлі тітіркендіргіш заттар, көбінесе солардың қосарлана әсер етуінен болады. Оларға жататындар: тағамдық заттар, дәрі-дәрмектер, бактериялар, кір жуатын ұлпалар, әртүрлі бояулар және т.б



Шұғыл көмек:

-
- Квинке ісігінде мүмкіндігінше аллергенді аластау, одан кейін тез арада дәрі-дәрмектік емге көшу керек.
- Тері астына - адреналин, бұлшық етке – супрастин немесе димедрол, сондай-ақ преднизолон енгізіледі.
- Бронх түйілуінің (спазмының) алдын алу үшін салбутамол ингаляциясы жүргізіледі.

Емдеу

- Науқас міндетті түрде ауруханаға жатқызылып жедел дәрдем берілуі тиіс. Тынысы тарылып, ауа жетпеген жағдайда кеңірдекке трубка салу керек. Басқа емдеулер жоспарлы түрде жүргізіледі. Оларға жататындар: 0,1% 0,3-0,5 мл адреналин ерітіндісі тері астына жіберіледі. 2 мл 2% супрастин немесе 1 мл 1% димедрол ерітінділері бұлшық етке жіберіледі. Науқастың беті қайтпаған жағдайда 60-90 мг преднизолонды қанға құяды. Бұл кезде 2-4 мл Лазекс дәрісін қанға құйған орынды болады.