

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Сибирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России)

Половое воспитание



Работа выполнена:
Студентами гр.2401 ПФ
Работу проверил:
Доцент Басарева Н.И.

Г.Томск, 2016 г.

МИФЫ!

ОТ ГОРМОНОВ
НАБИРАЮТ
ЛИШНИЙ ВЕС



ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ ТАБЛЕТКИ
ЗАЩИЩАЮТ МЕНЯ ОТ БЕРЕМЕННОСТИ
И ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ



ВО ВРЕМЯ МЕНСТРУАЦИИ
ШАНСЫ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ
РАВНЫ НУЛЮ



МИФЫ

МИФ №1.

При первом
сексуальном
контакте
предохраняться не
обязательно


НИКТО
НЕ БЕРЕМЕНЕЕТ
ПОСЛЕ ПЕРВОГО РАЗА



МИФЫ

МИФ №2.

Невозможно
забеременеть во
время критических
дней



МИФЫ


МИФ №3.

**Презервативы
защищают от всех
интимных болезней**

МИФЫ

МИФ №4.


От «гормонов»
толстеют и усиливают
оволосение кожи.



МИФЫ

МИФ №5.


Лучшая защита от беременности – прерванный половой акт.



МИФЫ

МИФ №6.


Во время
кормления грудью
нельзя
забеременеть



МИФЫ

МИФ №7.

Контрацепция «на утро» — не вредна



МИФЫ

МИФ №8.

**«Бабушкины»
методы — тоже
выход**

ПОСЛЕ СЕКСА Я ПРИНИМАЮ
ВЛАГАЛИЩНЫЙ ДУШ,
КОТОРЫЙ ЗАЩИЩАЕТ ОТ
БЕРЕМЕННОСТИ



МИФЫ

МИФ №9.

Календарный
способ
контрацепции —
надёжен





Что такое депривация? Причины депривации




Важно!

- абсолютно безопасный секс — это отсутствие секса вообще или самоудовлетворение;
- безопасный — с постоянным, надежным половым партнером;
- относительно безопасный — с использованием презерватива;
- опасный — со случайным партнером без всякой защиты.

ИППП сегодня!

- ежедневно более 1 млн человек приобретают ИППП



ИППП
являются
основной
причиной
бесплодия
как у
мужчин, так
и у женщин



При отсутствии
лечения ИППП
могут иметь
серьезные
последствия
для здоровья
матери и
ребенка

Пути передачи ИППП

- инфицирование через половой КОНТАКТ
- КОНТАКТНО-БЫТОВОЙ СПОСОБ
- парентеральный путь передачи (через кровь)
- внутриутробное заражение

Первые симптомы после незащищенного полового акта проявляются не так скоро!

ВИЧ/СПИД

Спустя месяцы или даже многие годы.

Неизлечим



СИФИЛИС

1-12 недель - Поражает сердце, мозг, вызывает слепоту и невынашивание беременности.



ГЕПАТИТЫ В и С

1-9 месяцев

Причина рака печени



ГОНОРЕЯ

2-21 день или бессимптомно - Поражает кожу, сердце, суставы, вызывает слепоту.



ТРИХОМОНИАЗ

5-28 дней или бессимптомно. Преждевременные роды.



ХЛАМИДИОЗ

2-7 дней или бессимптомно. Поражает суставы, одна из главных причин женского бесплодия.



ВПЧ/ГЕНИТАЛЬНЫЕ БОРОДАВКИ

Недели и месяцы или бессимптомно. Причина рака шейки матки.



ВИРУС ГЕРПЕСА

1-30 дней или бессимптомно. Неизлечим, но может контролироваться медикаментозно.



ГАРДНЕРЕЛЛЕЗ. МИКОПЛАЗМОЗ. УРЕПЛАЗМОЗ

Чаще бессимптомно. Относятся к условно-патогенным возбудителям.



Важно отметить!

- При инфекциях, передаваемых половым путем не происходит самоизлечения организма.
- Если через некоторое время симптомы исчезают, то это является переходом в скрытую форму
- При обнаружении первых симптомов необходимо обратиться к врачу!

ВИЧ в России

200

случаев
заражения
ежедневно

Число смертельных
случаев возросло в

13 раз

Все возрастные
группы

подвержены
заражению

40%

Случаев
заражения
происходит
половым путем

Томская область занимает

1 место в СФО по темпам
распространения ВИЧ-

инфекции (6,1 тыс. ВИЧ-
инфицированных)

Основные способы передачи ВИЧ

- Незащищенный половой акт
- Инъекции
- Переливание крови
- Ребенку от ВИЧ-инфицированной мамы



На сегодняшний день вакцина или прививка, которые защищали бы от ВИЧ инфекции не созданы! Чтобы защитить себя от заражения, важно соблюдать простые правила:

- Использовать презерватив при каждом половом контакте
- Никогда не употреблять инъекционные наркотики