

Периферический скелет домашних животных

1. Строение периферического скелета
2. Характеристика скелета конечностей у животных с разным типом хождения
3. Развитие конечностей

Вопрос 1


Строение периферического скелета

Особенности скелета конечностей млекопитающих

❖ лучше всех позвоночных приспособлены к быстрым, сильным и длительным наземным движениям:

- 1) плечевой пояс отделен от головы
- 2) тазовый пояс прикреплен к позвоночнику
- 3) пятипалая конечность (у быстро бегающих животных пальцев меньше)
- 4) конечности не отставлены в стороны (амфибии, рептилии), а прижаты к бокам туловища (за счёт поворота дистального конца плечевой кости назад, а бедренной - вперед)
- 5) конечности напоминают пружинящие рессоры, смягчающие толчки при беге и прыжках
- 6) спереди конечности в виде вертикальных столбов,

скелет собаки



Периферический скелет

представлен

пояса конечностей

плечевой пояс:

лопатка,
ключица,
коракоид

тазовый пояс:

кости таза
(подвздошная,
лонная,
седалищная)

скелет свободных
конечностей:

грудной и тазовой

стилоподий

(плечо, бедро)

зейгоподий

(предплечье,
голень)

автоподий

(кисть, стопа)

плечевой пояс (cingulum membra thoracici)



Плечатка, ключица и коракоидная кость есть у примитивных животных (ящерицы, птицы).

Ключица развита у обезьян, их грудные конечности способны к хватательным и вращательным движениям.

Рудименты ключицы – у кошки и баки /небольшое вращение грудными конечностями/.

У лошади, крс и свиньи - грудные конечности только органы движения, в плечевом пояссе развита **только плечатка**.

Тазовый пояс (пингвиноподобный pelvini)

- ❖ представлен парными подвздошной, лонной и седалищной костями
- ❖ кости срастаются между собой, формируя левую и правую **тазовые кости**
- ❖ место сращения левой и правой тазовых костей – **тазовый симфиз**
- ❖ тазовые кости соединяются неподвижным суставом с крестцом, образуя вместе с ним **таз**
- ✓ тела подвздошной, лонной и седалищной костей, срастаясь, образуют **вертлужную впадину** (входит головка бедренной кости)

таз (pelvis)

крестцово-

подвздошный
сустав

подвздошн
ая кость

тазова
я кость


крестец
лонная
кость

головка
бедренно
й кости


вертлужна
я впадина

хвостов
ые
позвонки

седалищн
ая кость




скелет свободных конечностей



1 звено - стилоподий
(stylos - столб, podos - нога) включает 1 кость /1
луч/, которая
соединяется с поясом
конечностей


скелет свободных конечностей




2 звено - зейгоподий

(*zeygos* - пара) – состоит из 2 лежащих рядом длинных костей (2 луча):

- на грудной конечности – предплечье /локтевая и лучевая кости/
- на тазовой – голень /большая и малая берцовые кости/
- ✓ у животных с подвижным соединением между костями зейгоподия возможны вращательные движения конечностями (обезьяна, кошка, собака)




скелет свободных конечностей



3 звено - автоподий
(autos - собственно) – лапа.
Количество костей /лучей/ в
ней зависит от типа
ходьбы

- ❑ на передней конечности –
кисть /передняя лапа/
- ❑ на задней конечности -
стопа /задняя лапа/




автоподий (лапа) имеет 3 участка

1. **верхний /базиподий/- основание лапы -** несколько рядов коротких костей: на кисти - **запястье** (2 ряда костей), на стопе - **заплюсна** (3 ряда костей)
2. **средний /метаподий/ - из удлиненных** костей: на кисти - **пясть**, на стопе – **плюсна**
3. **нижний /акроподий/ (acros - край, вершина)** - представлен **пальцами**. Каждый палец состоит из **трех фаланг**: проксимальной, средней и дистальной
кости автоподия содержат больше органических веществ, чем кости стопы и гейгоподия, они более

строительство автоподия

ки
ст
ь



базиподи
й

запясть
е

заплюсн
а

метаподи
й

пяст
ь


плюсн
а

акроподи
й

1
фа
ланга
2
фа
ланга
3
фа
ланга

па
льц
ы

ст
оп
а



Функции конечностей

1. обеспечивают поступательное движение
 2. опора для туловища
 3. амортизация при движении
 4. защита и нападение
 5. хватательная
- **грудные конечности** - опорные, при движении пассивные - **тянущие**
 - **тазовые конечности** - двигательная функция, активные при движении - **толкальные**
- кости *грудных* конечностей короткие, грубы, в головешном синевине скрученные

на строение костей конечностей влияют:

тип содержания:

содержание в неволе ведет к **увеличению** **массивности** костей за счёт **роста компакты кости** с уменьшением числа остеонов на единицу площади (из-за статической нагрузки), **разрежению губчатого вещества** с развитием остеопороза и дезориентацией балок

двигательная активность:

гиподинамия в условиях промышленных комплексов ведет к **уменьшению** ширины диафизов, **компакты** и **буристостей** для прикрепления мышц, **остеопорозу** **губчатого вещества**, **патологическим изменениям** в сосудах внутренних органов и мозга (опосредованное влияние)

надежность скелета конечностей

условный запас прочности кости =

максимальная разрушающая нагрузка / масса тела животного

запас прочности:

- 1) **уменьшается** с увеличением **массы тела** (и возраста) - у слона -18, у крысы – 221
- 2) **увеличивается** с ростом **двигательной активности** (предшествуя ей по времени) – теленок через несколько дней после рождения способен к активному передвижению
- 3) **у взрослых меньше, чем у растущих** и тем ниже, чем ниже уровень двигательной активности (бег помогает сохранить прочность костей с годами)

Вопрос 2

**характеристика скелета
конечностей**

**у животных с разным типом
ходьения**



различают 3 вида хождения:

- 1. стопоходение**
- 2. пальцехождение**
- 3. фалангоходение**

сторохождение


- примитивный и медленный способ движения (ящерица, медведь, слон, человек)
- опирание о землю на весь автоподий (кисть и стопу) для повышения площади опоры и устойчивости
- автоподий содержит 5 лучей (5 костей в пясти и плюсне, по 5 пальцев)
- плечевой пояс представлен лопаткой, ключицей иrudиментарным коракоидом
- ❖ стилоподий (плечо и бедро) лежит во фронтальной плоскости параллельно туловищу
- ❖ плечо образует с лопаткой угол с вершиной вперед, а бедро с тазом - угол с вершиной назад
- ❖ кости скелета покрываются панцирем

стопохождение у рептилий



- углы во всех суставах 90°
- стилоподий лежит во фронтальной плоскости
перпендикулярно туловищу
- кисти и стопы повернуты наружу

стопоходжение у млекопитающих




углы суставов более 90° . Стилоподий лежит во фронтальной плоскости параллельно туловищу. Кисти и стопы повернуты к голове (косолапость)

пальцеходжение

- опирание на нижний участок автоподия (кисти, стопы) - акроподий (пальцы)
- в плечевом поясе исчезают коракоид и ключица
- углы суставов еще больше увеличиваются
- уменьшается количество лучей в автоподии до 4 поскольку первый палец у собак и кошекrudиментарный (висячий) и земли не касается
- сохранена частичная подвижность между костями зейгоподия (предплечья) - возможны вращательные и хватательные движения

пальцеходение



- углы суставов увеличиваются
- животное опирается о землю на пальцы

фалангохождение

- конечности предназначены только для движения
- углы суставов тупые либо прямые (в верхней части конечностей)
- кости зейгоподия срастаются, локтевая и малоберцевая кости редуцируются (лошадь)
- удлиняются кости метаподия (пясть, плюсна)
- 1 и 2 фаланги не опираются на землю,
опорная - 3 фаланга
- появляются сесамовидные кости на уровне 1 и 3 фаланг
- крс и свинья опираются на третьи фаланги 3 и 4 пальцев, лошадь на третью фалангу 3

фалангоходжение



- углы суставов тупые или прямые
- опора о землю на 3 фалангу пальца

приспособление конечностей к полету

- передние конечности – **крылья** (у летучих мышей)
- летательная перепонка натянута между 2-5 сильно удлиненными пальцами
- на коротком 1 пальце – сильный коготь для лазания
- задние конечности – для подвешивания при отдыхе
- из-за разной функции кости передних конечностей крупнее и крепче задних
- крылья эволюционировали из летательных перепонок между передней и задней конечностями (как у летяг)

приспособление конечностей к рытью

- у крота в передних конечностях укорачиваются проксимальные отделы
- усиливаются все отделы и формируется мощная кисть – «лопата» для рытья
- на костях множество бугров для крепления мышц

крот



приспособление конечностей к плаванию

- укорочение конечностей и превращение их в ласты
 - **китообразные:**
 - a) конечности превратились в плавники:proxимальные кости короткие, в виде широких пластин для прикрепления мощных мышц
 - b) все отделы конечностей неподвижно соединены между собой, формируя **весло**
 - c) число фаланг увеличено, пальцы снаружи не видны, а обтянуты общей кожей
 - d) задние конечности редуцированы, главный орган движения – **хвостовой плавник**
 - **ластоногие:**
- менее приспособлены к водной среде, хвост короткий – **плавают с помощью конечностей**

бег лошади



SCIENCE PHOTO LIBRARY

приспособление конечностей к прыжкам

- большое различие в длине передних и задних конечностей
- при медленном движении – опора на 4 конечности, при прыжках (рикошетировании) – на 2 задние конечности
- задние конечности удлинены, число пальцев уменьшено (кенгуру - 2, тушканчика - 3) – монолитное строение конечности, концентрированная опора и эффективнее прыжок
- в филогенетическом образовании длинных задних конечностей главный фактор - **упражнения** (опыт со щенками, которым отрезали передние лапы по локоть, задние лапы удлинялись, из-за передвижения прыжками)


приспособление конечностей к бегу по твердому грунту

- общее удлинение костей
- приподнятие над землей дистальных отделов
- уменьшение числа пальцев
- изменение формы диафизов и суставов

В филогенезе:

- a) удлинение костей обусловлено усиленным упражнением при беге (медленно двигающиеся животные - стопоходящие)
- b) вначале приподнимается пясть и плюсна, а пальцы – для опоры (хищники)
- c) затем приподнимаются фаланги пальцев – опора на третьи фаланги (копытные)

бег лошади



Вопрос 3

Развитие конечностей

Филогенез конечностей

- происходят из продольных кожно-мышечных складок /функция рулей у низших рыб/
- средние части этих складок исчезают, а остаются передние и задние участки, в которых появляются хрящевые лучи, формируя плавники
- хрящевые лучи плавников срастаются своими туловищными концами, образуя зачатки поясов грудных и тазовых конечностей (кистеперые рыбы)
- с выходом на сушу из лучей плавников появляются ногообразные конечности
- количество лучей в процессе эволюции сокращается

Филогенез конечностей

3 стадии:


- 1. перепончатая**
- 2. хрящевая (хрящевые рыбы)**
- 3. костная (плавники костистых рыб и ногообразные конечности)**

Онтогенез конечностей

3 стадии:

1. **перепончатый скелет** закладывается **на 3-4 неделе** эмбриогенеза в виде 2-х пар выпячиваний мезодермы вблизи переднего (грудные конечности) и заднего (тазовые конечности) концов тела эмбриона - **почки конечностей**. Каждая почка делится на 2 части:
 - ✓ из проксимальных частей почек - пояса конечностей
 - ✓ из дистальных частей почек - 3 звена свободных конечностей
2. **на 7-й неделе** начинается **хрящевая стадия**
3. **на 8-9 неделе** - появляются **точки окостенения** в диафизе и эпифизах. Окостенение проходит медленно и завершается после рождения у


почки конечностей эмбриона



конечности 3-месячного плода круп. рог. скота



фокомелия (отсутствие) конечности у щенка бульдога



недоразвитие грудных конечностей



шестиногий теленок



пятый (лишний) палец на кисти свиньи



недоразвитие пальцев на стопах поросенка



Интенсивный рост скелета конечностей

- 1. у крс – в первые 3 месяца после рождения, а рост прочности - до 6 месяцев**
- 2. у овец и коз – до 3 месячного возраста, а к 5 месяцам снижается**
- 3. у кошек – до 2 месячного возраста**