Программа коррекции депресивных состояний при инволюционной меланхолии



Подготовила: студентка 5 курса 3 группы Яким К.В.

Организационные условия реализации программы

- Место проведения гериатрическое отделение психиатрической больницы
- На кого направлена программа люди пожилого возраста с инволюционной меланхолией
- продолжительность: от 2 месяцев до 3 лет
- проведение психотерапевтических интервенций 2 раза в неделю по 50 минут (по необходимости увеличить количество встреч и их продолжительность)



Диагностические критерии:

- наличие плохого настроения более двух недель подряд;
- потеря интереса к прежним занятиям;
- неспособность чувствовать удовольствие;
- уменьшение энергетичности, за которым следует снижение активности;
- высокая утомляемость.



1. Диагностический блок

- 1.Данные полученные из беседы с пациентом, его семьей, лечащим врачом, социальным работником.
- 2.Гериатрическая шкала депрессии (GDS)(выявление уровня самооценки)
- 3. Шкала Бека.
- 4. Самооценочная шкала депрессии Цунга (депрессивные переживания, депрессивный аффект, соматические симптомы).
- 5.ОДС (опросник депрессивных состояний).
- 6.ЭШПД. Эдинбургская шкала постнатальной депрессии.



2.Коррекционный блок

Психиатр:

- 1.Медикоментозная терапия (антидепрессанты, нейролептики)
- 2. Электросудорожная терапияФизиотерапевт :
- 1. Поддержание физической активности



Психологическая коррекция:

- Беседа.
- Наблюдение.
- Бихевиаральная психотерапия.
- Аутогенная тренировка.
- □ КБТ.
- Интерперсональная психотерапия.
- Арт-терапия.
- Семейная психотерапия.
- Групповая психотерапия.

