

Плазуни

Презентацію підготувала:
Голубєва Аміна 7-В клас

Плазуні, або Рептілії (Reptilia) — традиційний клас хребетних тварин, частина клади зауропсидів. Представники класу не утворюють клади, і тому сучасні кладистичні класифікації не розглядають плазунів як таксон^[1], хоча згідно з іншими класифікаціями він не скасований.



Хамелеон

Хамелеони - сімейство ящірок, пристосованих до деревного способу життя, здатних змінювати забарвлення тіла.



Більшість видів мають довжину тіла 30 см, найбільш великі досягають 50-60 см, найдрібніші - 3-5 см. Голова шлемообразной, з помітно піднятою потиличної областю. Часто прикрашена більш-менш опуклими гребенями, буграми або витягнутими, загостреними рогами. У більшості випадків всі ці освіти розвинені у самців, а у самок носять зародкові форми.



Хамелеони насамперед зустрічаються в материковій частині Африки південніше Сахари і на острові Мадагаскар, хоча деякі види зустрічаються також у Північній Африці, Південній Європі, на Близькому Сході, в Південній Індії, Шрі-Ланці та ряді дрібних островів у західній частині Індійського океану. Є представники диких популяцій на Гаваях і були зареєстровані в Каліфорнії і Флориді. Хамелеони мешкають у всіх видах тропічних лісів, саванах, а іноді і пустелях і степах.



Широку популярність має властива всім хамелеонам здатність змінювати забарвлення і малюнок тіла. Зміна забарвлення пов'язано з особливостями будови шкірного покриву. У зовнішньому волокнистому і глибшому шарі шкіри знаходяться особливі розгалужені клітини - хроматофори, що містять зерна різних пігментів чорного, темно-коричневого, червонуватого і жовтого кольорів.



Дякую за увагу!!!