

Птицы Беларуси

Белый и Чёрный Бусел , Лебедь, Синица, Утка, Ласточка, Снегирь , Скворец, Сова.



Белый Бусел



самый известный представитель аистов. Белая птица с черными концами крыльев, длинной шея, длинные тонкие красной клювом и длинными красноватыми ногами. Белые перья головы, шеи и тела контрастирует с черными перьями крыльев, которые в солнечном свете отливали зеленым и пурпурным. Небольшой кусок голой кожи черного цвета на голове находится вокруг коричневого глаз. Если крылья аиста сложены, создается впечатление, что вся задняя часть тела аиста черная. Отсюда его украинская название - черногуз. По окраске самки не отличаются от самцов, но немного меньше по размеру. Рост белого аиста



Чорный Бусел


- самый известный представитель аистов. Белая птица с черными концами крыльев, длинной шеей, длинной тонкой красной клювом и длинными красноватыми ногами. Белые перья головы, шеи и тела контрастирует с черными перьями крыльев, которые в солнечном свете отливали зеленым и пурпурным. Небольшой кусок голой кожи черного цвета на голове находится вокруг коричневого глаз. Если крылья аиста сложены, создается впечатление, что вся задняя часть тела аиста черная. Отсюда его украинская название - черногуз. По окраске самки не отличаются от самцов, но немного меньше по размеру. Рост белого аиста



Лебедь



- Оперение лебедей по своей окраске бывает либо чисто белого, либо серого или чёрного цвета. Самок и самцов внешне весьма трудно различить. Лебедей от гусей отличает более длинная шея, позволяющая в более глубоких водах обыскивать дно в поисках пищи, а также их величина, по которой они являются самыми крупными водными птицами. Размах их крыльев достигает двух метров, а вес может превышать 15 кг. Лапы довольно короткие, из-за чего лебеди, передвигаясь по земле, производят несколько неуклюжее впечатление. Зато у них очень развитая летательная мускулатура, позволяющая им преодолевать тысячи километров при ежегодных перелётах на юг и обратно. Потомство выращивается обоими родителями, опекающими детёнышей в течение 1—2 лет после рождения.




Синица



- Синица выделяется чёрной головой и шеей, бросающимися в глаза белыми щеками, оливковым верхом и жёлтым низом, с некоторыми вариациями среди многочисленных подвидов. Летом питается преимущественно мелкими насекомыми и другими беспозвоночными. Зимой употребляет в пищу более широкий спектр, в том числе впавших в зимнюю спячку летучих мышей. Как и все синицы, гнездится в дуплах и пустотах деревьев, а также в разнообразных нишах как природного, так и антропогенного происхождения. Самка откладывает около 12 яиц и высидивает их в одиночку, хотя оба родителя кормят птенцов. За небольшим исключением, размножается с конца января по сентябрь, делая две кладки в год. Гнёзда могут разоряться [дятлами](#), [белками](#) и [ласками](#), в них могут завестись [блохи](#), и взрослые птицы могут преследоваться [ястребами-перепелятниками](#). Синицы хорошо приспособиваются к человеческому вмешательству в среду, часто встречаются в крупных городах и других населённых пунктах, в пригородах, в садах и парках. На больших синицах также проводят важные исследования видов в [орнитологии](#).

Утка



- Утки — это птицы средних и небольших размеров с относительно короткой шеей и цевкой, покрытой спереди поперечными щитками. Окраска оперения разнообразна, у многих видов на крыле имеется особое «зеркальце». Для ряда видов характерен резко выраженный в период размножения половой диморфизм, проявляющийся чаще всего в разной окраске оперения самца и самки. У большинства видов линька происходит дважды в году; летняя — полная, осенняя — частичная.



Ласточка



- мелкая птица семейства [ласточковых](#), широко распространённая в Европе, Северной Африке и умеренных широтах Азии. Как и [сизый голубь](#), изначально обитательница скал, легко адаптировалась к жизни в городских условиях. [Перелётный](#) вид, зимует в Африке южнее [Сахары](#) и в тропической Азии. Держится стаями по берегам рек, на склонах гор, лугах, городах с каменными строениями — часто стайки этих птиц можно увидеть сидящими на проводах. Питается летающими насекомыми, которых ловит в воздухе. Имеет внешнее сходство с двумя другими видами рода [городских ласточек](#) — восточным и непальским воронками, обитающими в [Южной](#) и [Юго-Восточной Азии](#). Обычный вид.

Скворец



- певчая птица семейства [скворцовых](#), широко распространённая на значительной территории [Евразии](#), а также успешно [интродуцированная](#) в [Южную Африку](#), [Северную Америку](#), [Австралию](#) и [Новую Зеландию](#). На юге и западе [Европы](#) ведёт оседлый образ жизни, а в северной и восточной её части является перелётной, в зимние месяцы мигрируя на юг. Внешне (размерами, желтым клювом и темным оперением) слегка напоминает [чёрных дроздов](#), но в отличие от

Сова



- отряд хищных птиц, включающий более 420 крупных и средней величины видов, в основном ночных птиц, распространённых во всех странах света. В отряде два семейства: [совиные](#), или настоящие совы, и [сипуховые](#), однако в [таксономии Сибли-Алквиста](#) в отряд помещаются все семейства отряда [козодоеобразных](#) (*Caprimulgiformes*).
- Краткая характеристика: крупная голова, большие круглые глаза спереди головы, клюв короткий, хищный. Охотится ночью, оперение мягкое, полёт бесшумный, когти длинные и острые, окрас маскирующий.
-

Конец