

# Интерпретация партограммы

- \* **Партограмма** – может быть единственным документом наблюдения за течением нормальных родов.
- \* Цель партограммы-точное отражение динамики родового процесса с обязательной характеристикой состояния матери и плода.
- \* Заводится при поступлении в стационар пациентки с установленным диагнозом :  
Роды

\* **Информация о пациентке:** полное имя, количество беременностей и родов, номер истории родов, дата и время поступления в родовой блок, время излития околоплодных вод.

\* **Частота сердечных сокращений плода:** фиксируется каждые полчаса (выслушивается каждые 15 минут) отмечается - .

\* **Околоплодные воды:** цвет амниотической жидкости отмечается при каждом вагинальном обследовании:

- \* I – плодный пузырь цель
- \* C – околоплодные воды светлые, чистые
- \* M- воды с меконием (любая интенсивность с окраски)
- \* B-примесь крови в водах
- \* A-отсутствие вод/выделений
- \*

## \* Конфигурация головки:

- \* 0- конфигурация нет
- \* + - швы легко разъединяются
- \* ++- швы находят друг на друга, но разъединяются при надавливании
- \* +++ - швы находят друг на друга и не разделяются

\* **Раскрытие шейки матки:** оценивается при каждом влагалищном исследовании и отмечается крестиком (?)

\* **Линия бдительности:** линия должна начинаться от точки раскрытия шейки на 3см и продолжаться до точки полного раскрытия с шагом 1 см в час.

\* **Линия действия:** проходит параллельно линии бдительности, отступя на 4 часа вправо.

\* **Опускание головки:** оценку прохождения головки следует проводить путем сначала абдоминального обследования и лишь затем вагинального:

- \* 5/5- головка на пять пальцев выше лона- над входом в малый таз
- \* 4/5- на 4 пальца выше лона- прижата ко входу в малый таз
- \* 3/5- на 3 пальца выше лона- прощупывается
- \* 2/5- на 2 пальца выше лона- над лоном прощупывается меньшая часть головки
- \* 1/5- головка в полости малого таза

\* **сокращения матки:** наряду с раскрытием шейки матки и продвижением головки плода сокращения матки (схватки) служат четким показателем родовой деятельности. Периодичность схваток откладывается по оси времени. Каждая клеточка означает одно сокращение. Различная интенсивность штриховки отражает интенсивность схваток. На партограмме принято использовать следующие три вида штриховки:

\* -точки- слабые схватки продолжительностью до 20 секунд

\* -косая штриховка- умеренные схватки продолжительностью 20-40 секунд

\* - сплошная штриховка – сильные схватки продолжительностью более 40 секунд

- \* **Окситоцин:** при назначении записывается его количество/концентрация и вводимая доза в минуту (в каплях или ЕД) каждые 30 минут.
- \* **Назначения лекарств:** фиксируются любые дополнительные назначения лекарств.
- \* **Пульс:** каждые 30 минут отмечается точкой - .
- \* **Артериальное давление:** фиксируется каждые 4 часа и отмечается линией посередине соответствующей клеточки.
- \* **Температура тела:** фиксируется каждые 4 часа.
- \* **Протеин, ацетон и количества мочи:** записывается при каждом мочеиспускании.