

**Материк на якому я
хочу побувати**

Австралія

Поширена помилкова думка, що столицею Австралії є Сідней, але це не так. Насправді це Канберра, і все тому, що тривала суперечка Сіднея і Мельбурна про те, кому ж бути столицею, так і не знайшла свого рішення. Винахідливими австралійцями було прийнято воістину соломонево рішення: побудувати нове місто, і зробити його столицею. Побудувавши місто на місці поселення Канберра, і, мабуть, бажаючи уникнути нових суперечок з приводу найменування столиці, вирішено було назва не міняти.

Дикий собака Австралії динго, як гадають, здичавілий свійський собака. Він попав на материк до появи там європейців. Динго заподіює шкоди вівчарству й свійській птиці.



До другого сімейства загону однопрохідних ставляться єхидні, покриті голками, як дикобрази, але за типом харчування нагадують мурахоїдів. Розміри цих тварин зазвичай не перевищують 40 см. Тіло вкрите голками, довжина яких може досягати 6 см. Колір голок варіює від білого до чорного. Під голками тіло покрите короткою шерстю бурого кольору. У його вб'є! Тонка, загострена морда довжиною 5 см, що закінчується вузьким ротом. Навколо вух зазвичай розвинені довші пучки вовни. Хвіст майже не виражений, є лише щось на кшталт виступу ззаду, покритого голками.



Так, а що ми вже читали про кенгуру? Ось наприклад про те, що Велетенський кенгуру - співавтор автомобільного кенгурятника або ось вам Гудфеллоу - кенгуру на дереві. Але ви напевно не знали, що найменший представник сімейства кенгурових - це сумчастий кенгуровий щур, що відноситься до роду *Bettongia*.

Дорослі особини цього виду, бурого забарвлення звірята, схожі на великих гризунів або на мініатюрних валлабі, досягають розміру 30 - 40 см, а їх вага становить в середньому 1,2 - 1,6 кг. Ці милі пухнасті звірята - мініатюрна копія кенгуру.

В даний час цей вид кенгурових знаходиться на межі вимирання. Їм загрожують різні хижаки. Нещодавно природоохоронні організації Австралії серйозно зайнялися охороною кенгурових щурів. У Західній Австралії для звірків, а конкретно для одного виду- *Woylie*, створили невеликий заповідник - огорожену зону, де вони знаходяться у відносній безпеці.



У посушливій місцевості Австралії вперше за довгі роки вилупилися щитні - представники ракоподібних, здатні десятиліттями чекати пробудження.



У тропічних лісах Австралії і Нової Гвінеї водяться деревні кенгуру. Вони добре лазять по деревах. Довгі пальці на передніх ногах дають їм змогу триматися за гілки й хапатися за гілки й плоди.



У 1932 році Австралія затіяла війну з ему (якщо хто не знає, це такі великі австралійські птахи, схожі на страусів), яка увійшла в історію під назвою "Велика війна з ему". В ході неабиякої військової операції з'ясувалося, що кулемети в боротьбі з птахами неефективні.



Качконіс або Качкодзьоб (*Ornithorhynchus anatinus*) — водоплавний ссавець, єдиний сучасний представник родини *Ornithorhynchidae* ряду *Monotremata*.
Зоологічне ім'я цій тварині дав у 1799 р. англійський натураліст Джордж Шоу




Також в Австралії живуть птахи, яких не можна зустріти на інших материках. Наприклад, сміється кукабара: це хижий птах довжиною близько 45 сантиметрів, що видає звуки, схожі на людський сміх. Кукабара влаштовує гнізда в дуплах евкаліпта і харчується в основному плазунами і комахами. Молоді птахи, які народилися в минулому році, часто залишаються з батьками і допомагають їм висиджувати яйця наступної кладки.



Кузу- це сумчасті ссавці. Вони ведуть нічний спосіб життя і можуть досить сильно нашкодити місцевим жителям: ночами він сопе і шумить, влаштовує гнізда під дахами будинків. Їх досить легко приманити за допомогою фруктів - вночі кузу можуть злізти з дерев і тоді можна погодувати прямо з рук





Дякую за увагу!

Підготувала учениця

4-А класу

Кравчук Юліана