


Сегодня: _____ 2009 г.


Курс: Общий физический практикум

Склярова Елена Александровна



Сегодня: _____ 2009 г.

Лекция № 7




Тема: Численное моделирование

Содержание лекции:


1. Метод наименьших квадратов

Аппроксимация экспериментальных данных



Метод наименьших квадратов (МНК), идея которого принадлежит А. Лежандру, а теоретическое обоснование К.Гауссу. В соответствии с этим методом, оценки параметров a_i определяют из условия минимума суммы квадратов отклонений измеренных значений y_i от соответствующей ординаты рассмотренной кривой

$$\delta^2 = \sum_{i=1}^n [y_i - f(x_i; a_0, a_1, a_2, \dots, a_m)]^2 = \min.$$



Метод наименьших квадратов



При обработке результатов измерений часто возникает необходимость построить эмпирическую формулу, дающую аналитическое выражение функциональной зависимости, заданной таблицей.

Общепринятым и весьма эффективным при решении подобных задач является так называемый **метод наименьших квадратов**, при котором требование наилучшего согласования искомой кривой $U = f(x)$ и экспериментальных точек сводятся к тому, чтобы «сумма квадратов отклонений» экспериментальных точек от искомой функции $U = f(x, a, b, \dots)$ обращалась в минимум.

Метод наименьших квадратов - статистический прием, с помощью которого неизвестные параметры модели оцениваются путем минимизации суммы квадратов отклонений действительных (эмпирических) значений от теоретических (из Глоссария по естественным наукам).


Метод наименьших квадратов



«Метод наименьших квадратов» имеет перед другими методами приближения существенные преимущества:

- 1. он приводит к сравнительно простому математическому способу определения параметров $a, b, c, \dots$ искомого функционала;**
- 2. он дает довольно веское теоретическое обоснование с вероятностной точки зрения.**

Метод наименьших квадратов



Постановка задачи

Пусть результаты измерений представлены таблицей.

x	x_1	x_2	x_3	...	x_n
U	U_1	U_2	U_3	...	U_n

Если каждое из U_i ($i = 1, 2, \dots, n$) измеряется несколько раз, то в таблице U_i заменяется средним арифметическим значением данной величины

(1)

$$U_i = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m U_{ki}.$$

Метод наименьших квадратов




Далее выбираем общий вид функции $U = f(x)$, зависящей от нескольких числовых параметров a, b, c , именно эти параметры и требуется выбрать согласно методу наименьших квадратов так, чтобы сумма квадратов отклонений U_i от $f(x_i)$ была минимальна. Запишем U как функцию не только аргумента x , но и параметров a, b, c :

$$U = f(x, a, b, c, \dots) \quad (2)$$

Требуется выбрать a, b, c так, чтобы выполнялось условие

$$\sum_{i=1}^n [f(x, a, b, c, \dots) - U_i]^2 = \min. \quad (3)$$

Метод наименьших квадратов



Замечание:

Следует заметить, что на практике не редко встречаются случаи, когда экспериментальные данные при различных значениях аргумента вследствие каких-либо причин обладают различной точностью. Это имеет место тогда, когда дисперсии

$S_{U_1}^2, S_{U_2}^2, \dots, S_{U_n}^2$ неоднородны.

В этом случае необходимо минимизировать взвешенную сумму квадратов отклонений экспериментальных и вычисленных значений функции

$$\sum_{i=1}^n p_i [f(x, a, b, c, \dots) - U_i]^2 = \min. \quad (3')$$

Здесь p_i – веса наблюдений, определяемые в соответствии с (1.37).



Метод наименьших квадратов

Найдем значения a , b , c , обращающие левую часть выражения в минимум.

Для этого продифференцируем ее по a , b , c и приравняем производные к нулю:

$$\left. \begin{aligned} \sum_{i=1}^n [f(x_i, a, b, c, \dots) - U_i] \cdot \frac{\partial f}{\partial a} x_i &= 0 \\ \sum_{i=1}^n [f(x_i, a, b, c, \dots) - U_i] \cdot \frac{\partial f}{\partial b} x_i &= 0 \\ \sum_{i=1}^n [f_i(x, a, b, c, \dots) - U_i] \cdot \frac{\partial f}{\partial c} x_i &= 0 \end{aligned} \right\}, \quad (4)$$

где $\left(\frac{\partial f}{\partial a}\right)_{x_i} = f'_a(x_i, a, b, c)$ — значение частной производной функции f по параметру a в точке x_i ,
— частные производные по параметрам b и c искомого функционала
 $\left(\frac{\partial f}{\partial b}\right)_{x_i}, \left(\frac{\partial f}{\partial c}\right)_{x_i}$

Метод наименьших квадратов



Решить систему (4) в общем виде нельзя, для этого необходимо задаться конкретным видом функции f .


Рассмотрим наиболее часто встречающийся на практике случай, когда f является степенным полиномом, т.е.

$$f(x) = ax^m + bx^{m-1} + cx^{m-2} + \dots . \quad (5)$$

Рассмотрим два часто встречающихся на практике случая:

- 1) когда функция $f(x)$ линейна;
- 2) когда функция $f(x)$ выражается полиномом второй степени (параболой).

Метод наименьших квадратов



Подбор параметров линейной функции методом наименьших квадратов

В опыте зарегистрирована совокупность значений (x_i, U_i) , $i = 1, 2, \dots, n$ (табл.).

Требуется подобрать по методу наименьших квадратов параметры a, b линейной функции

$$U = ax + b, \tag{6}$$

описывающей полученную экспериментальную зависимость $U = f(x)$.

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

Метод наименьших квадратов



Согласно системе (4), необходимые условия экстремума дают

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial F(a,b)}{\partial a} &= 2 \sum_{i=1}^n [(ax_i + b) - U_i] x_i = 0, \\ \frac{\partial F(a,b)}{\partial b} &= 2 \sum_{i=1}^n [(ax_i + b) - U_i] = 0. \end{aligned} \right\} \quad (9)$$


Поскольку

$$\left(\frac{\partial f}{\partial a} \right)_{x_i} = x_i, \quad \left(\frac{\partial f}{\partial b} \right)_{x_i} = 1. \quad (10)$$

Сокращая на 2, получим систему (9) в виде (4). Далее преобразуем уравнения (9) к виду

$$\left. \begin{aligned} a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i &= \sum_{i=1}^n x_i U_i, \\ a \sum_{i=1}^n x_i + bn &= \sum_{i=1}^n U_i. \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

Метод наименьших квадратов



Решая систему (11), получим

$$a = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i U_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n U_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}, \quad (12)$$

$$b = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n U_i - a \sum_{i=1}^n x_i \right). \quad (13)$$

Определив из выражений (12) и (13) искомые a и b , мы найдем тем самым искомую эмпирическую формулу в виде (6).

$$U = ax + b, \quad (6)$$



Метод наименьших квадратов

Теория дает возможность определить также дисперсию уклонения точек от прямой и дисперсию коэффициентов a и b . Если дисперсия точек, σ_0^2 и σ_a^2 – дисперсия коэффициентов a и b , тогда


$$\sigma_0^2 = \frac{\sum_{i=1}^n U_i^2}{n-2} - \frac{\left(\sum_{i=1}^n U_i\right)^2}{n(n-2)} - \frac{\left(n \sum_{i=1}^n x_i U_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n U_i\right)^2}{n(n-2) \left[n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2 \right]}, \quad (14)$$

(15)

$$\sigma_a^2 = \sigma_0^2 \frac{n}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2}, \quad (16)$$

$$\sigma_b^2 = \sigma_0^2 \frac{n \sum_{i=1}^n x_i^2}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2}.$$

Метод наименьших квадратов



Примечание:

Далеко не всякая зависимость описывается уравнением прямой линии. Однако в ряде случаев можно путем несложных преобразований привести к линейной более сложную зависимость.

Так, например, если $U = \frac{k}{x} + l$, то введя новую переменную $q = \frac{1}{x}$, получим линейную связь между U и q .

Метод наименьших квадратов



Пример.

Пусть заданы результаты четырех измерений (рис.): $y = 0$ при $x = 0$; $y = 1$ при $x = 1$; $y = 2$ при $x = 3$; $y = 5$ при $x = 4$.

Задача заключается в том, чтобы провести

через эти точки прямую

$$\tilde{y} = b_0 + b_1 t$$

таким образом,

чтобы сумма квадратов отклонений

была минимальна.

Запишем уравнение, описывающее

проведение прямой

$$\tilde{y} = b_0 + b_1 t$$

по результатам измерений.





Рис. 1. Аппроксимация прямой линией.

Метод наименьших квадратов



Мы получаем переопределенную систему:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix},$$

или $Xb=y$. Нам понадобится матрица $X^T X$ и обратная к ней:

$$X^T X = \begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 8 & 26 \end{pmatrix}, \quad (X^T X)^{-1} = \frac{1}{20} \begin{pmatrix} 13 & -4 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Тогда решение $\mathbf{b}=(X^T X)^{-1}X^T y$ по методу наименьших квадратов будет иметь вид

Метод наименьших квадратов




Тогда решение $\mathbf{b}=(X^T X)^{-1} X^T y$ по методу наименьших квадратов будет иметь вид

$$\tilde{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \end{pmatrix} = \frac{1}{20} \begin{pmatrix} 13 & -4 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.2 \\ 1.1 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, оптимальная прямая задается уравнением

$$\tilde{y} = -0.2 + 1.1t$$

Подбор параметров параболы второго порядка методом наименьших квадратов



В опыте зарегистрированы значения (x_i, U_i) , $i = 1, 2, 3, \dots, n$, сведенные в таблицу. Требуется методом наименьших квадратов подобрать параметры квадратичной функции-параболы второго порядка

$$U = ax^2 + bx + c, \quad (17)$$

соответствующей наблюдаемой экспериментальной зависимости.

Итак, эмпирическую формулу ищем в виде

$$U = f(x, a, b, c). \quad (18)$$

Для отклонений имеем выражения

$$\Delta U_i = (a + bx_i + c) - U_i, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (19)$$


отсюда

$\bar{X}$

$$\sum_{i=1}^n (\Delta U_i)^2 = \sum_{i=1}^n [(ax_i^2 + bx_i + c) - U_i]^2 = F(a, b, c). \quad (20)$$

Здесь $F(a, b, c) \geq 0$ и, следовательно, функция $F(a, b, c)$ имеет минимум.

Подбор параметров параболы второго порядка методом наименьших квадратов



Необходимые условия экстремума дают

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial F(a,b,c)}{\partial a} &= 2 \sum_{i=1}^n x_i^2 [(ax_i^2 + bx_i + c) - U_i] = 0, \\ \frac{\partial F(a,b,c)}{\partial b} &= 2 \sum_{i=1}^n x_i [(ax_i^2 + bx_i + c) - U_i] = 0, \\ \frac{\partial F(a,b,c)}{\partial c} &= 2 \sum_{i=1}^n [(ax_i^2 + bx_i + c) - U_i] = 0. \end{aligned} \right\} \quad (21)$$

Систему (21) можно непосредственно записать, исходя из общей системы (4), с учетом того, что

$$\left(\frac{\partial f}{\partial a} \right)_{x_i} = x_i^2, \quad \left(\frac{\partial f}{\partial b} \right)_{x_i} = x_i, \quad \left(\frac{\partial f}{\partial c} \right)_{x_i} = 1. \quad (22)$$

Подбор параметров параболы второго порядка методом наименьших квадратов



Аналогично тому, как это сделано в предыдущем параграфе, получим систему нормальных уравнений:

$$\left. \begin{aligned} a \sum_{i=1}^n x_i^4 + b \sum_{i=1}^n x_i^3 + c \sum_{i=1}^n x_i^2 &= \sum_{i=1}^n x_i^2 U_i, \\ a \sum_{i=1}^n x_i^3 + b \sum_{i=1}^n x_i^2 + c \sum_{i=1}^n x_i &= \sum_{i=1}^n x_i U_i, \\ a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i + cn &= \sum_{i=1}^n U_i. \end{aligned} \right\} \quad (23)$$

Решая систему (23), находим искомые коэффициенты a , b , c , и тем самым определяем искомую эмпирическую функцию.

Замечания о выборе эмпирической формулы




Способ наименьших квадратов не может дать ответа на вопрос о том, **какого** вида функция лучше всего аппроксимирует данные экспериментальные точки.

Вид функции должен быть задан на основании каких-то физических соображений. Метод наименьших квадратов позволяет нам лишь выбрать, какая из прямых, экспонент или парабол является лучшей прямой, лучшей экспонентой или лучшей параболой.

Можно предложить лишь методику определения степени приближающего полинома вида

$$U = ax^m + bx^{m-1} + cx^{m-2} + \dots \quad (24)$$

Замечания о выборе эмпирической формулы



x	x_1	x_2	x_3	...	x_k	x_{k+1}	...	x_n	...
U	U_1	U_2	U_3	...	U_k	U_{k+1}	...	U_n	...

$$\left. \begin{aligned} \Delta U_k &= U_{k+1} - U_k, \\ \Delta^2 U_k &= \Delta U_{k+1} - \Delta U_k, \\ &\dots\dots\dots \\ \Delta^s U_k &= \Delta^{s-1} U_{k+1} - \Delta^{s-1} U_k \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} \overline{\Delta} U_k &= \frac{\Delta U_k}{x_{k+1} - x_k} = \frac{U_{k+1} - U_k}{x_{k+1} - x_k}, \\ \overline{\Delta}^2 U_k &= \frac{\overline{\Delta} U_{k+1} - \overline{\Delta} U_k}{x_{k+2} - x_k}, \\ &\dots\dots\dots \\ \overline{\Delta}^s U_k &= \frac{\overline{\Delta}^{s-1} U_{k+1} - \overline{\Delta}^{s-1} U_k}{x_{k+s} - x_k}, \quad s > 1 \end{aligned} \right\}$$

Замечания о выборе эмпирической формулы



Можно усмотреть, что если результаты измерения в точности удовлетворяют линейному закону, то первые разделенные либо конечные для таблицы с постоянным шагом разности должны быть постоянны:

$$\frac{U_2 - U_1}{X_2 - X_1} = \frac{U_3 - U_2}{X_3 - X_2} = \dots = \frac{U_{k+1} - U_k}{X_{k+1} - X_k} = \frac{U_n - U_{n-1}}{X_n - X_{n-1}}. \quad (27)$$

Если же линейная формула лишь приближенно отражает фактически имеющую место зависимость, то выписанная цепочка точных равенств заменится цепочкой приближенных равенств.

Таким образом, линейная эмпирическая формула окажется пригодной лишь в том случае, если первые разделенные либо конечные разности мало отличаются друг от друга (колеблются в незначительных пределах).

Пример



Предположим, что функцию f можно с высокой точностью аппроксимировать многочленом $P_m(x)$ некоторой степени m . Если эта степень заранее неизвестна, то возникает проблема выбора оптимальной степени аппроксимирующего многочлена в условиях, когда исходные данные y_i содержат случайные ошибки.

Для решения этой задачи можно принять следующий алгоритм: для каждого $m=0,1,2,\dots$ вычисляется величина

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{1}{n-m} \sum_{i=0}^n (P_m(x_i) - y_i)^2}$$

За оптимально... едует принять то значение m , начиная с которого величина стабилизируется или начинает возрастать.

Метод наименьших квадратов



Пример 1. Приближение функции по методу наименьших квадратов.

Пусть функция задана таблицей своих значений:

x	-3	-1	0	1	3
y	-4	-0.8	1.6	2.3	1.5

Приближим функцию многочленом 2-ой степени. Для этого вычислим коэффициенты нормальной системы уравнений:

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^4 x_i &= 0, & \sum_{i=0}^4 x_i^2 &= 20 & \sum_{i=0}^4 x_i^3 &= 0 & \sum_{i=0}^4 x_i^4 &= 164 \\ \sum_{i=0}^4 y_i &= 0.6 & \sum_{i=0}^4 y_i x_i &= 19.6 & \sum_{i=0}^4 y_i x_i^2 &= -21 \end{aligned}$$

Метод наименьших квадратов



Составим нормальную систему наименьших квадратов, которая имеет вид:


$$\begin{cases} 5a_0 + 0a_1 + 20a_2 = 0.6 \\ 0a_0 + 20a_1 + 0a_2 = 19.6 \\ 20a_0 + 0a_1 + 164a_2 = -21 \end{cases}$$

Решение системы легко находится:

$$a_0 = 1.234 \quad a_1 = 0.98 \quad a_2 = -0.278$$

Таким образом, многочлен 2-ой степени найден:

$$P_2(x) = 1.234 + 0.98x - 0.279x^2$$



ПРИМЕР 2. Нахождение оптимальной степени многочлена.

Определение параметров эмпирической зависимости. Часто из физических соображений следует, что зависимость $y = f(x)$ между величинами хорошо описывается моделью вида $y = g(x, a_0, a_1, \dots, a_m)$, где вид зависимости g известен. Тогда применение критерия наименьших квадратов приводит к задаче определения искомых параметров $a_0, a_1, \dots, a_m$ из условия минимума функции:

$$\Phi(a_0, a_1, \dots, a_m) = \sum_{i=0}^n (g(x_i, a_0, a_1, \dots, a_m) - y_i)^2$$

Метод наименьших квадратов



Функция задана таблицей значений

$x = \{0, 1.13, 1.5, 2.25, 3\}$

$y = \{4.57, 0.68, 0.39, -1.9, -4.4\}$

Найти приближение функции многочленом оптимальной степени методом наименьших квадратов.

Введем векторы исходных данных

```
In[1]:= x = {0, 1.13, 1.5, 2.25, 3};  
        y = {4.57, 0.68, 0.39, -1.9, -4.4};
```


Определим базисные функции. Так как мы приближаем функцию многочленом, базисные функции будут степенными функциями.

```
In[3]:= basis[z_, n_] := Join[{1}, Table[z^i, {i, 1, n}]]
```

```
In[4]:= basis[z, 3]
```

```
Out[4]= {1, z, z^2, z^3}
```

Метод наименьших квадратов



Определим аппроксимационный полином степени

```
In[5]:= polynom[z_, n_] := Fit[Transpose[{x, y}], basis[z, n], z]
```

Например, многочлен степени 2

```
In[6]:= polynom[z, 2]
```


```
Out[6]= 4.47046 - 2.93066 z + 0.00462204 z^2
```

Функция среднеквадратического отклонения многочлена степени n

```
In[7]:= 
$$\sigma[n_] := \sqrt{\frac{1}{4-n} \sum_{k=1}^{\text{Length}[x]} (\text{polynom}[x[[k]], n] - y[[k]])^2}$$

```


Метод наименьших квадратов



Вычислим среднеквадратическое отклонение для многочленов степени 0,1,2 и 3

```
In[8]:= {σ[0], σ[1], σ[2], σ[3]}
Out[8]= {3.331, 0.361727, 0.443023, 0.62653}
```

Нарисуем графики многочленов и исходных данных






ПРИМЕР 3. Вывод нормальной системы уравнений для нахождения параметров эмпирической зависимости.

Если зависимость от параметров $a_0, a_1, \dots, a_m$ нелинейна, то экстремум функции

$$\Phi(a_0, a_1, \dots, a_m) = \sum_{i=0}^n (g(x_i, a_0, a_1, \dots, a_m) - y_i)^2$$

ищут методами минимизации функции нескольких переменных.

Метод наименьших квадратов



Выведем систему уравнений для определения

коэффициентов функции $g(x) = a \cos(x) + bx^3$

осуществляющей среднеквадратичную аппроксимацию


заданной функции $y = f(x)$ по $n+1$ точкам. Составим функцию

$$\Phi(a, b) = \sum_{i=0}^n \left(a \cos(x_i) + bx_i^3 - y_i \right)^2$$

и запишем для нее необходимое условие экстремума:

$$\begin{cases} \frac{\partial \Phi}{\partial a} = \sum_{i=0}^n 2(a \cos(x_i) + bx_i^3 - y_i) \cos(x_i) = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial b} = \sum_{i=0}^n 2(a \cos(x_i) + bx_i^3 - y_i) x_i^3 = 0 \end{cases}$$

Метод наименьших квадратов




Тогда нормальная система примет вид:

$$\begin{cases} \left(\sum_{i=0}^n (\cos(x_i))^2 \right) a + \left(\sum_{i=0}^n (\cos(x_i)) x_i^3 \right) b = \sum_{i=0}^n y_i \cos(x_i) \\ \left(\sum_{i=0}^n (\cos(x_i)) x_i^3 \right) a + \left(\sum_{i=0}^n x_i^6 \right) b = \sum_{i=0}^n y_i x_i^3 \end{cases}$$

Получили линейную систему уравнений относительно неизвестных параметров a и b , которая легко решается.

Примеры




Пусть дано решить систему уравнений

$$\begin{aligned} a_1x + b_1y + c_1z + \dots + n_1 &= 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z + \dots + n_2 &= 0 \\ a_3x + b_3y + c_3z + \dots + n_3 &= 0 \\ \dots \end{aligned} \tag{1}$$

число которых более числа неизвестных $x, y, z, \dots$.
Чтобы решить их по способу Н. квадратов, составляют новую систему уравнений, число которых равно числу неизвестных и которые затем решаются по обыкновенным правилам алгебры.

Примеры



Эти новые, или так называемые *нормальные*, уравнения составляются по следующему правилу: умножают сперва все данные уравнения на коэффициенты у первой неизвестной x и, сложив почленно, получают первое нормальное уравнение, умножают все данные уравнения на коэффициенты у второй неизвестной y , сложив почленно, получают второе нормальное уравнение и т. д.

$$[aa] = a_1a_1 + a_2a_2 + \dots$$

$$[ab] = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots$$

$$[ac] = a_1c_1 + a_2c_2 + \dots$$

...


$$[ba] = b_1a_1 + b_2a_2 + \dots$$

$$[bb] = b_1b_1 + b_2b_2 + \dots$$

$$[bc] = b_1c_1 + b_2c_2 + \dots$$

...

Примеры



то нормальные уравнения представятся в следующем простом виде:

$$[aa]x + [ab]y + [ac]z + \dots + [an] = 0$$

$$[ba]x + [bb]y + [bc]z + \dots + [bn] = 0 \quad (2)$$

$$[ca]x + [cb]y + [cc]z + \dots + [cn] = 0$$

...

Легко заметить, что коэффициенты нормальных уравнений весьма легко составляются из коэффициентов данных, и притом коэффициент у первой неизвестной во втором уравнении равен коэффициенту у второй неизвестной в первом, коэффициент у первой неизвестной в третьем уравнении равен коэффициенту у третьей неизвестной в первом и т. д.

Примеры



Для пояснения сказанного ниже приведено решение пяти уравнений с двумя неизвестными:

$$5x - 8y - 16 = 0$$

$$8x - y - 32 = 0$$

$$16x + 8y - 55 = 0$$

$$9x + 7y - 32 = 0$$

$$9x + 20y - 29 = 0$$


Составив значения $[aa]$, $[ab]...$, получаем следующие нормальные уравнения:

$$507x + 323y - 1765 = 0$$

$$323x + 578y - 1084 = 0,$$

откуда $x = +3,55$; $y = -0,109$.


Примеры



Уравнения (1) представляют систему линейных уравнений, то есть уравнений, в которых все неизвестные входят в первой степени. В большинстве случаев уравнения, связывающие наблюдаемые и искомые величины, бывают высших степеней и даже трансцендентные, но это не изменяет сущности дела: предварительными изысканиями всегда можно найти величины искомых с таким приближением, что затем, разложив соответствующие функции в ряды и пренебрегая высшими степенями искомых поправок, можно привести любое уравнение к линейному.

Метод наименьших квадратов.

Пример.



Пусть на вход некоторого устройства подается сигнал x , а на выходе измеряется сигнал y . Известно, что величины x и y связаны функциональной зависимостью, но какой именно – неизвестно. Требуется приблизительно определить эту функциональную зависимость $y = \varphi(x)$ по опытными данными. Пусть в результате измерений получен ряд экспериментальных точек (x_i, y_i) .

Известно, что через n точек можно всегда провести кривую, аналитически выражаемую многочленом $(n-1)$ -й степени. Этот многочлен называют **интерполяционным**.

И вообще, замену функции $\varphi(x)$ на функцию $\psi(x)$ так, что их значения совпадают в заданных точках

$$\varphi(x_i) = \psi(x_i), \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (25)$$

называют **интерполяцией**.

Метод наименьших квадратов



Однако такое решение проблемы не является удовлетворительным, поскольку $y_i \neq \phi(x_i)$ из-за случайных ошибок измерения и влияния на измерения значений y_i помех и шумов в устройстве.

Так что

$$y_i = \phi(x_i) + \delta_i \quad (8.6)$$

Где δ_i – некоторая случайная ошибка. Поэтому требуется провести кривую так, чтобы она в наименьшей степени зависела от случайных ошибок.

Эта задача называется **сглаживанием** (**аппроксимацией**) экспериментальной зависимости и часто решается **методом наименьших квадратов**. Сглаживающую кривую называют **аппроксимирующей**.

Метод наименьших квадратов



Задача аппроксимации решается следующим образом.

В декартовой прямоугольной системе координат наносят точки (x_i, y_i) . По расположению этих точек высказывается предположение о принадлежности искомой функции к определенному классу функций. Например, линейная функция

$\varphi(x)=a_0+a_1x$, квадратичная $\varphi(x)=a_0+a_1x+a_2x^2$ и т.д. В общем случае

$\varphi(x)=\varphi(x, a_0, a_1, \dots, a_n)$. Неизвестные параметры функции $a_1, a_2, \dots, a_n$ определяются из требования минимума суммы квадратов случайных ошибок, т.е. минимума величины

$$\delta = \sum_{i=1}^n \delta_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \phi(x_i, a_0, a_1, \dots, a_n))^2 \quad (27)$$

Величина δ называется также суммарной *невязкой*.

Метод наименьших квадратов



Необходимым условием минимума функции нескольких переменных является обращение в нуль частных производных невязки:

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \phi(x_i, a_0, a_1, \dots, a_n)) \frac{\partial \phi}{\partial a_j} = 0 \quad , j=0, 1, \dots, r. \quad (28)$$

Решая систему уравнений, находим неизвестные параметры a_j и тем самым полностью определяем функцию, которая наилучшим образом (в смысле наименьших квадратов отклонений от исходных точек или наименьшей суммарной невязки) аппроксимирует (приближает) искомую функцию $\phi(x)$.

Метод наименьших квадратов



Остановимся подробнее на линейной зависимости
 $\varphi(x) = a_0 + a_1 x$.

Дифференцируя, получим следующую систему уравнений


$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 - a_1 x_i) = 0 \\ \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 - a_1 x_i) x_i = 0 \end{cases} \quad (1.5)$$

Из первого уравнения находим $a_0 = My - a_1 Mx$,

где

$$Mx = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad My = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

Метод наименьших квадратов



Подставляя выражение для a_0 во второе уравнение, найдем

$$a_1 = \frac{Kxy}{S^2} \quad (30)$$

где

$$Kxy = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - Mx)(y_i - My), \quad S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - Mx)^2 \quad (31)$$

Таким образом, $\phi(x) = \left(My - \frac{Kxy}{S^2} Mx \right) + \frac{Kxy}{S^2} x \quad (32)$

есть искомая линейная функция.

Метод наименьших квадратов



Ввиду простоты расчетов аппроксимация линейной зависимости используется довольно часто. Кроме того, многие функции, зависящие от двух параметров, можно *линеаризовать* путем замены переменных.

Для этого необходимо подобрать такое преобразование исходной зависимости $y(x) = \varphi(x, a_0, a_1, \dots, a_n)$, в результате которого она приобретает линейный вид $v = b_0 + b_1 \cdot u$. Далее решается задача линейной аппроксимации для новой зависимости и вычисленные коэффициенты b_0 и b_1 пересчитываются в коэффициенты a_0 и a_1 .

Для ряда часто встречающихся двухпараметрических зависимостей возможные замены переменных (а также, обратные замены для пересчета b_0 и b_1 в a_0 и a_1) приведены в табл. 1.1.

Примеры



Вид зависимости	Замена переменных		Ограничения	Обратная замена переменных	
	v	u		$a_0 = b_0$	$a_1 = b_1$
Гиперболическая $y = a_0 + \frac{a_1}{x}$	$v = y$	$u = \frac{1}{x}$	$x \neq 0$	$a_0 = b_0$	$a_1 = b_1$
Логарифмическая $y = a_0 + a_1 \ln x$	$v = y$	$u = \ln x$	$x > 0$	$a_0 = b_0$	$a_1 = b_1$
Показательная $y = a_0 e^{a_1 x}$	$v = \ln y$	$u = x$	$y > 0$ $a_0 > 0$	$a_0 = e^A$	$a_1 = b_1$
Степенная $y = a_0 x^{a_1}$	$v = \ln y$	$u = \ln x$	$x > 0 \ y > 0 \ a_0 > 0$	$a_0 = e^A$	$a_1 = b_1$
Комбинированная $y = \frac{1}{a_0 + a_1 e^{-x}}$	$v = \frac{1}{y}$	$u = e^{-x}$	$y \neq 0$	$a_0 = b_0$	$a_1 = b_1$




Примеры






```
(*Подготовка к работе, подключение статистических библиотек*)
<<Graphics`Colors`
<<Statistics`ContinuousDistributions`
(*Размерность списков с экспериментальными точками*)
n=10;
(*Список с точками прообраза экспериментальной зависимости*)
X=N[Table[i,{i,n}]]
{1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.}
(*Вид исходной зависимости*)
y[x_]:=a[0]+a[1]/x;\
(*Параметры зависимости и шума*)
a[0]=2; a[1]=-1; mu=0; sigma=0.1;
(*Список с точками исходной зависимости*)
Z=Map[y,X];
(*Список с точками нормального шума*)
W=RandomArray[NormalDistribution[mu,sigma],n];
(*Список с точками образа экспериментальной зависимости *)
Y=Z+W;
(*Графики исходной и экспериментальной зависимости *)
pXY=Transpose[{X,Y}];
p1=ListPlot[pXY,PlotStyle->{Blue,PointSize[.03]}];
p2=Plot[y[x],{x,X[[1]],X[[n]]},PlotStyle->{Red}];
pic1=Show[{p1,p2}];
```

Примеры



`{1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.}`

`{1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.}`



Примеры



*(*Линеаризация экспериментальной зависимости*)*

```
f1u[x_] := 1/x; f1v[y_] := y;
```

```
U = Map[f1u, X]; V = Map[f1v, Y];
```

*(*График линеаризованной зависимости*)*


```
pUV = Transpose[{U, V}]; pUZ = Transpose[{U, Z}];
```

```
p1 = ListPlot[pUV, PlotStyle -> {Blue, PointSize[.03]}];
```

```
p2 = ListPlot[pUZ, PlotStyle -> {Red},
```

```
PlotJoined -> True];
```

```
Show[{p1, p2}];
```



Примеры



```
(*Применяем метод линейной аппроксимации к зависимости U(V)*)
```

```
(*Вычисление вспомогательных величин*)
```

```
Mu = 1/n * Apply[Plus, U]
```

```
0.292897
```

```
Mv = 1/n * Apply[Plus, V]
```

```
1.67254
```

```
Kuv = 1/n * Apply[Plus, (U - Mu) * (V - Mv)]
```

```
-0.0674933
```

```
S2 = 1/n * Apply[Plus, (U - Mu) ^ 2]
```

```
0.0691882
```

```
(*Вычисление параметров линейризованной зависимости *)
```

```
b[1] = Kuv / S2; b[0] = Mv - b[1] * Mu;
```

```
(*Вычисление невязки для линейризованной зависимости*)
```

```
delta = Apply[Plus, (V - (b[0] + b[1] * U)) ^ 2]
```

```
0.175364
```

```
(*Обратный переход к экспериментальной зависимости*)
```

```
ae[0] = b[0]; ae[1] = b[1];
```

```
(*Оценка исходной зависимости *)
```

```
phi[x_] := ae[0] + ae[1] / x; y2 = phi[x]
```

```
(*Вычисление невязки для оценки исходной зависимости *)
```

```
delta1 = Apply[Plus, (Y - phi[X]) ^ 2]
```

```
0.175364
```


```
(*Проверка решения*)
```

```
Fit[pXY, {1, 1/x}, x]
```

```
(*Графики зависимостей , и *)
```

```
p2 = Plot[y2, {x, X[[1]], X[[n]]}];
```

```
Show[{pic1, p2}];
```



Примеры



Решение для другой предполагаемой нелинейности

f2u[x_]:=Exp[-x]; f2v[y_]:=1/y;

U=Map[f2u,X]; V=Map[f2v,Y];

pUV=Transpose[{U,V}];

Оценка исходной зависимости

psi=Fit[pUV,{1,x},x]

$0.554161 + 1.14032 x$

Параметры оценки исходной зависимости $\varphi_2(x)$

c=CoefficientList[psi,x]

$\{0.554161, 1.14032\}$

phi2[x_]:=1/(c[[1]]+c[[2]]*Exp[-x]); y3=phi2[x]

1

$0.554161181910092093 + 1.14032098627562872 E^{-x}$

Вычисление невязки для оценки исходной зависимости $\varphi_2(x)$


delta2=Apply[Plus,(Y-phi2[X])^2]

0.177793

Графики зависимостей $Y(X)$, $y(x)$ и $\varphi_2(x)$

p2=Plot[y3,{x,X[[1]],X[[n]]}];

Show[{pic1,p2}];





Лекция окончена

Нажмите клавишу <ESC> для выхода