**ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕХАНИЗМЫ СЛУХОВОЙ И
ВЕСТИБУЛЯРНОЙ
СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ**

ПЛАН ЛЕКЦИИ

- 1. Физиология слухового анализатора**
- 2. Физиология вестибулярного анализатора**

СЛУХОВОЙ АНАЛИЗАТОР

- **совокупность механических, рецепторных и нервных структур, воспринимающих и анализирующих звуковые колебания**

ЗВУК

- колебательные движения упругих тел, распространяющиеся в различных средах в виде волн.

ТОНЫ

ШУМЫ

ПАРАМЕТРЫ ЗВУКА

ФИЗИЧЕСКИЕ

ИНТЕНСИВНОСТЬ (I)

Единица - **дБ**

ЧАСТОТА

Единица - **Гц**

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, сек

ФОРМА ВОЛНЫ

- СИНУСОИДАЛЬНАЯ
- МНОГО ГАРМОНИК

ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ

ГРОМКОСТЬ (J) $J = k I^{0,3}$ 2:10

Единица – **сон** – громкость при частоте 1000Гц и интенсивности 40дБ

ВЫСОТА

Единица – **мел** . Тон частотой 1000Гц при 60 дБ имеет высоту 1000 мелов.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, сек

ТЕМБР

- СЛАБОУКРАШЕННЫЙ ЧИСТЫЙ ТОН
- ОКРАШЕННЫЙ ТОН

ФУНКЦИИ СЛУХА

1. **Диапазон слышимых частот:** 16 – 20000 Гц, 300 000 разных по силе и частоте звуков. После 40 лет на 80Гц ↓ каждые полгода.
2. **Абсолютная чувствительность:** 1-4 кГц. Малая чувствительность к низким частотам предохраняет от шумов собственного тела.
3. **Дифференциальная чувствительность:** по частоте 1%, интенсивности 0,5-1,0 дБ, длительности < 1%, локализация источника звука –1-3°
4. **Пространственная разрешающая способность** за счет бинаурального слуха: низкие частоты (до 1300Гц) различаются по времени попадания звука в правое и левое уши (< 30 мкс), а высокие по интенсивности (1дБ)
5. **Временная разрешающая способность** за счет временной суммации (150мс) и минимального порогового интервала 2-5 мс.

ОРГАН СЛУХА

НАРУЖНОЕ УХО

1. Ушная раковина – эластический хрящ, жировая ткань

2. Наружный слуховой проход – 30-35 мм, хрящевой, костный отделы, многослойный плоский эпителий, сальные железы.

3. Барабанная перепонка – $d=75\text{мм}^2$ слаборастяжимая мембрана, $t=0,1\text{мм}$, собственный размах колебаний при низких частотах от 10^{-2} до 10^{-9} см. При резонансе амплитуда гасится за счет соединения со слуховыми косточками.

ФУНКЦИИ НАРУЖНОГО УХА:

- **резонатор**, с собственной частотой колебаний 3000Гц.
- **↓ величину давления** на барабанную перепонку (только +10дБ)
- **постоянство T**
- **постоянство влажности**

СРЕДНЕЕ УХО

1. **Косточки:** **молоточек** (к перепонке), **наковальня**, **стремечко** (к овальному окну)
2. **Мышцы и связки:** **m.tensor tympani** (к молоточку), **m.stapedius** (к стремечку)
3. **Евстахиева труба** – от носоглотки к среднему уху

ФУНКЦИИ:

- **Эффективная передача звуковых колебаний**
- **Косточки $\uparrow P$ на овальное окно в 20 раз по сравнению с P на перепонку**
- **Мышцы $\downarrow A$ и P сверхсильных раздражителей на овальное окно**
- **Евстахиева труба уравнивает P с атмосферным**

ВНУТРЕННЕЕ УХО

1. **Вестибулярный аппарат** (преддверие и полукружные каналы)
2. **Слуховой** (улитка и кортиев орган).

УЛИТКА

35 мм, 2,5 завитка, 3 канала
(лестницы):

верхний - *scala vestibuli*, нижний -
scala tympani, средний - *scala media*

Геликотрема – s.vestibuli с s.tympani

Овальное окно – s.vestibuli, **круглое** –
s.tympani

Перилимфа – ↑Na, s.vestibuli, s.tympani,

Эндолимфа – ↑K, средний канал,

2 мембраны: вестибулярная и
базиллярная (рейснерова):

кортиев орган (на основной мембране)

звукоспринимающие рецепторы :

- **4 ряда волосковых клеток**, покрытых
тенториальной мембраной и
эндолимфой.

МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПД

Звуковая волна → система слуховых **косточек** → колебание мембраны **овального окна** → волнообразные перемещения **перилимфы** (-заряд) → колебания **вестибулярной мембраны** → колебания **эндолимфы** (+ заряд) → колебания **базилярной мембраны** → смещение **волосков** **волосковых клеток** относительно

текториальной мембраны
→ изменение **МП** → ↓ **КУД**
→ возникновение **электрического разряда**
(**эндокохлеарного потенциала**)

ВИДЫ ПОТЕНЦИАЛОВ В УЛИТКЕ

1. **Микрофонный потенциал** – возникает в области корешков волосков волосковых клеток при смещении текториальной мембраны. Колебания накладываются на эндокохлеарный потенциал модулируя его *по форме и частоте*, в соответствии с параметрами нанесенного звукового раздражителя. Некоторое время сохраняется после смерти.
2. **Суммационный потенциал** отражает не форму звуковой волны, а ее *оггибающую* и возникает при действии на ухо высокочастотных звуков.
3. **ПД слухового нерва** при возбуждении в волосковых клетках, передается на волокна слухового нерва через химические синапсы.

РАЗЛИЧИЕ ВЫСОТЫ ТОНА

Effect of Sound Frequency on the Basilar Membrane

Начальная (жесткая) часть мембраны - высокочастотный фильтр:
При действии звуков **низкой частоты** (до 1000Гц) базилярная мембрана смещается *на всем протяжении* улитки.
При **увеличении частоты** звукового сигнала происходит перемещение укороченного по длине колеблющегося столба жидкости *ближе к овальному окну* и наиболее жесткому и упругому участку базилярной мембраны.

ТЕОРИИ ВОСПРИЯТИЯ ЗВУКА

1. **Гельмгольца** (XIX) – **теория резонанса**. **Волокна** основной мембраны **разные по длине** и настроены на восприятие разных длин волн.
2. **Бекеши** (XX) – при воздействии звуков невысокой частоты реагирует весь **столб жидкости**, при воздействии **высоких звуков** – **только основание**.
3. **Резерфорда** – **телефонная теория**. Если звук низкий – до 1000Гц, то передается столько же ПД, если высокий – **кодирование**.
4. **Теория «места»** : **волосковые клетки**, расположенные на базилярной мембране в различных участках улитки, обладают **разной лабильностью**, что оказывает влияние на восприятие звуков высокой и низкой частоты (настройку волосковых клеток на звуки различной частоты)

ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ

Дендриты от кортиевого органа → тела **I нейронов** в *спиральном ганглии* улитки → их аксоны (слуховой (кохлеарный) нерв (VIII) в *продолговатый мозг* к комплексу трех кохлеарных ядер (**II нейроны**) → ипси и контрлатеральный восходящие слуховые пути → *к верхним оливам* → их аксоны образуют латеральную петлю. Одна часть волокон латеральной петли к ядрам *нижних бугров четверохолмия* (тела **III, IV, V нейронов**). Другая часть латеральной петли в *медиальное коленчатое тело* зрительного бугра данной стороны → слуховая кора - верхняя часть *височной доли* мозга (поля 41,42 по Бродману)

АНАЛИЗ ЗВУКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Кортиев орган – кодирование

2. Нижние бугры четверохолмия – воспроизведение *ориентировочного рефлекса на звук* 2 путями:

1- определение местоположения предмета (*первичная локализация*),
2 – восприятие *отраженных* от различных объектов звуковых волн. (чаще в темноте или при потере зрения).

3. **Слуховая кора** – анализ коротких звуковых сигналов, дифференцировка звуков, фиксация начального момента звука, создание комплексного представления о звуке, поступающем в оба уха отдельно, пространственная локализация звуков.

Нейроны - детекторы: 1. вычленяют информацию о чистых звуках; 2. анализируют последовательность звуков; 3. амплитуду звуков; 4. локализуют источник и направление звука.

Ассоциативные нейроны: представление о мелодии, адаптация.

ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ АНАЛИЗАТОР

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Локализация – височная
кость

Представлен
вестибулярным
органом:

- отолитовый аппарат –
маточка и мешочек

- ампульный аппарат в
полукружных
каналах:

сагитальном,
горизонтальном,
фронтальном.

ОТОЛИТОВЫЙ АППАРАТ

Рецепторные клетки – волосковые, *вторичночувствующие* в макулах **маточки** и **мешочка**.

- Волоски в желеобразной массе из кристаллов соли (**отолитов**).
- **При наклоне** головы влево изменяется положение **маточки** (в N условиях положения головы она лежит горизонтально) → **смещение отолитов** → **смещение волосков** клеток → **деполяризация волосковой клетки (РП)** → выделение ею медиатора (**АХ**) → **деполяризация (ГП) окончаний дендрита афферентного нейрона**

Линейное ускорение, вибрация, качка и т.д.

АМПУЛЬНЫЙ АППАРАТ

Рецепторные клетки -

ресничные, в ампулах полукружных каналов *вторичночувствующие.*

Волоски в желатинозной массе – **купуле**, омываемой **эндолимфой**.

При **угловом ускорении** **эндолимфа** в силу инерции в начале движения **остается неподвижной**, а каналы вместе с **рецепторами** уже **движутся**. → **купула** отклоняется в сторону, **противоположную движению**, реснички

МЕХАНИЗМ ВОЗБУЖДЕНИЯ ВЕСТИБУЛОРЕЦЕПТОРОВ

Рецепторная клетка содержит 1 длинный волосок – **киноцилий** и 50-60 коротких – **стереоцилий**.

При сгибании пучка стереоцилий **в сторону киноцилия** в мембране клетки $\uparrow$ проницаемость для Na^+ $\rightarrow$ **деполяризация волосковой клетки (РП)** $\rightarrow$ выделение ею медиатора (**АХ**) $\rightarrow$ **деполяризация (ГП) окончаний дендрита афферентного нейрона (Г)**

(a)

(b)

At rest

(c)

Stimulated

(d)

Inhibited

ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ

- Афферентный нейрон в **вестибулярном ганглии** → **продолговатый мозг** 4 вестибулярных ядра: верхнее ядро – **Бехтерева**, нижнее ядро – **Роллера**, медиальное ядро – **Швальбе** и латеральное ядро – **Дейтерса**. От них:
1. **Вестибулоспинальный** путь – к мотонейронам спинного мозга (равновесие при движении).
 2. **Вестибулоокулярный** путь – регуляция активности мышц глаза во время движения (на сетчатке сохраняется объект наблюдения).
 3. **Вестибуломозжечковый** – регуляция мышечного тонуса во время перемещения. Часть нейронов идут к мозжечку напрямую, не прерываясь в продолговатом мозге.
 4. **Лемнисковый** – к *специфическим* ядрам таламуса, а от них в кору – сенсорные зоны в постцентральной извилине (область проекции лица).
 5. От вестибулярных ядер идут коллатерали к **ретикулярной формации**, а от нее к *неспецифическим* ядрам таламуса, откуда диффузно ко многим участкам коры,

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Первичная сенсорная зона коры - **постцентральная извилина** (область проекции лица).

Вторичные и третичные зоны – **диффузно** во многих участках коры

**БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ**