Решение уравнения $\cos x = a$.

Понятие арккосинуса числа.

Преподаватель математики С-Пб СВУ
Лошак В.С.

Уравнение cosx=a



$$\cos x = a; |a| \le 1.$$

$$x = \alpha + 2\pi k;$$

$$x = -\alpha + 2\pi k;$$

$$k \in Z.$$

$$\alpha = \arccos a$$

АРККОСИНУС ЧИСЛА

Определение. **Арккосинусом числа** $a \in [-1;1]$ **называется такое число** $\alpha \in [0;\pi]$, **косинус которого равен** a.

$$\cos(\arccos a) = a,$$

$$0 \le \arccos a \le \pi,$$

$$-1 \le a \le 1$$

АРККОСИНУС ЧИСЛА

- **Например**

$$\arccos\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\pi}{4};$$ т. к. $$0\le\frac{\pi}{4}\le\pi;\cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\arccos 0=\frac{\pi}{2}$$ т. к. $$0\le\frac{\pi}{2}\le\pi;\cos\frac{\pi}{2}=0.$$

$$\arccos\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\pi}{6};$$ т. к. $$0\le\frac{\pi}{6}\le\pi;\cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

АРККОСИНУС ЧИСЛА
ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

$$\arccos(-a) = \pi - \arccos a$$



АРККОСИНУС ЧИСЛА
ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

- **Например**

1. $$3\arccos\frac{\sqrt{2}}{2}-2\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)=$$

$$3\arccos\frac{\sqrt{2}}{2}-2\left(\pi-\arccos\frac{1}{2}\right)=3\cdot\frac{\pi}{4}-2\cdot\left(\pi-\frac{\pi}{3}\right)=$$

$$\frac{3\pi}{4}-\frac{4\pi}{3}=-\frac{7}{12}\pi$$

2. $$\frac{1}{2}\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)-2\arccos(-1)+\frac{1}{3}\arccos 0=$$

$$\frac{1}{2}\left(\pi-\arccos\frac{\sqrt{3}}{2}\right)-2\cdot\pi+\frac{1}{3}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{5\pi}{6}-2\pi+\frac{\pi}{6}=-\frac{17}{12}\pi$$

АРККОСИНУС ЧИСЛА
ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

$$\sin\alpha = \pm\sqrt{1-\cos^2\alpha}$$

$$\alpha = \arccos a$$

$$\arccos a \in [0;\pi]$$

$$\sin(\arccos a) = \sqrt{1-\cos^2(\arccos a)} = \sqrt{1-a^2}$$

$$tg(\arccos a) = \frac{\sin(\arccos a)}{\cos(\arccos a)} = \frac{\sqrt{1-a^2}}{a}$$

АРККОСИНУС ЧИСЛА
ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

$$\cos(\arccos a) = a, \arccos a \in [0;\pi], a \in [-1;1]$$

$$\arccos(-a) = \pi - \arccos a$$

$$\arccos(\cos\alpha) = \alpha, \alpha \in [0;\pi]$$

$$\sin(\arccos a) = \sqrt{1-a^2}$$

$$tg(\arccos a) = \frac{\sqrt{1-a^2}}{a}$$

АРККОСИНУС ЧИСЛА
ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

$$\cos(\arccos a) = a$$

- **Например**

1. $\cos\left(\arccos\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

2. $\cos\left(\arccos\frac{5}{9}\right) = \frac{5}{9}$

3. $\sin\left(\arccos\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$

4. $\sin\left(\arccos\left(-\frac{3}{7}\right)\right) = \sqrt{1-\left(-\frac{3}{7}\right)^2} = \sqrt{1-\frac{9}{49}} =$

$$\sqrt{\frac{40}{49}} = \frac{2\sqrt{10}}{7}$$

$$\sin(\arccos a) = \sqrt{1-a^2}$$

АРККОСИНУС ЧИСЛА
ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

- **Например**

5. $$ctg\left(7\cdot\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right)=\ ctg\left(7\cdot\left(\pi-\frac{\pi}{4}\right)\right)=ctg\frac{21}{4}\pi=$$
$$ctg5\frac{1}{4}\pi=ctg\frac{\pi}{4}=1$$

6. $$tg\left(\arccos\frac{1}{4}\right)=\frac{\sin\left(\arccos\frac{1}{4}\right)}{\cos\left(\arccos\frac{1}{4}\right)}=\frac{\sqrt{1-\frac{1}{16}}}{\frac{1}{4}}=\sqrt{\frac{15}{16}}\cdot 4=\sqrt{15}$$

АРККОСИНУС ЧИСЛА
ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

$$\arccos(\cos\alpha)=\alpha,\alpha\in[0;\pi]$$

- **Например**

7. $$\arccos\left(\cos\frac{2\pi}{5}\right)=\frac{2\pi}{5}$$

8. $$\arccos\left(\cos\frac{8}{5}\pi\right)=\arccos\left(\cos\left(\pi+\frac{3}{5}\pi\right)\right)=$$

$$\arccos\left(-\cos\frac{3}{5}\pi\right)=\pi-\arccos\left(\cos\frac{3}{5}\pi\right)=\pi-\frac{3}{5}\pi=$$

$$=\frac{2}{5}\pi$$

Уравнение cosx=a



$$\cos x = a, |a| \le 1$$

$$x = \pm \arccos a + 2\pi n, n \in Z$$

$$\cos x = 0$$

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z$$

$$\cos x = 1$$

$$x = 2\pi k, k \in Z$$

$$\cos x = -1$$

$$x = \pi + 2\pi k, k \in Z$$

Уравнение cosx=a

- **Пример 1.**

$$\cos 3x = \frac{1}{2};$$

$$3x = \pm \arccos \frac{1}{2} + 2\pi k;$$

$$3x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k;$$

$$x = \pm \frac{\pi}{9} + \frac{2\pi k}{3}, k \in Z.$$

Уравнение cosx=a

Пример 2.

$$\cos\frac{x}{4}=-\frac{\sqrt{3}}{2};$$

$$\frac{x}{4}=\pm\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)+2\pi k;$$

$$\frac{x}{4}=\pm\left(\pi-\arccos\frac{\sqrt{3}}{2}\right)+2\pi k;$$

$$\frac{x}{4}=\pm\left(\pi-\frac{\pi}{6}\right)+2\pi k;$$

$$\frac{x}{4}=\pm\frac{5}{6}\pi+2\pi k;$$

$$x=\pm\frac{10}{3}\pi+8\pi k, k\in Z.$$

Уравнение cosx=a

- **Пример 3.**

$$\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=-\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$x-\frac{\pi}{4}=\pm\arccos\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)+2\pi k;$$

$$x-\frac{\pi}{4}=\pm\left(\pi-\arccos\frac{1}{\sqrt{2}}\right)+2\pi k;$$

$$x=\pm\left(\pi-\frac{\pi}{4}\right)+\frac{\pi}{4}+2\pi k;$$

$$x=\pm\frac{3}{4}\pi+\frac{\pi}{4}+2\pi k;$$

$$\left[\begin{array}{l} x=\pi+2\pi k \\ x=-\frac{\pi}{2}+2\pi k \end{array}\right., k\in Z.$$

Уравнение cosx=a

- **Пример 4.** $(3\sin 2x-3)\cdot(2\cos x+1)=0$

$3\sin 2x-3=0;$

$\sin 2x=1;$

$2x=\frac{\pi}{2}+2\pi k;$

$x=\frac{\pi}{4}+\pi k, k\in Z.$



$2\cos x+1=0;$

$\cos x=-\frac{1}{2};$

$x=\pm\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)+2\pi n;$

$x=\pm\left(\pi-\frac{\pi}{3}\right)+2\pi n;$

$x=\pm\frac{2}{3}\pi+2\pi n, n\in Z.$

Уравнение cosx=a

- **Пример 5.** $\cos 5x + \cos 7x = \cos(\pi + 6x)$

$$\cos 5x + \cos 7x = -\cos 6x$$

$$2\cos 6x \cdot \cos x + \cos 6x = 0$$

$$\cos 6x \cdot (2\cos x + 1) = 0$$

$$\cos 6x = 0 \qquad 2\cos x + 1 = 0$$

$$\cos x = -\frac{1}{2}$$

Уравнение cosx=a

- **Пример 4.** $\cos 5x + \cos 7x = \cos(\pi + 6x)$

$$\cos 6x = 0$$



$$\cos x = -\frac{1}{2}$$

$$6x = \frac{\pi}{2} + \pi k$$

$$x = \pm\left(\pi - \arccos\frac{1}{2}\right) + 2\pi n$$

$$x = \frac{\pi}{12} + \frac{\pi k}{6}, k \in Z.$$

$$x = \pm\frac{2}{3}\pi + 2\pi n, n \in Z.$$