ФУНКЦИИ

3. Основные характеристики функции
Чётность функции

- *Функция f(x)* ***четная****, если* $\forall x \in X$ *справедливо равенство* $f(-x) = f(x)$

- *График четной функции симметричен относительно оси ОУ.*

$$f(x) = x^2$$

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$$



- *Функция f(x)* ***нечетная****, если* $\forall x \in X$ *справедливо равенство* $f(-x) = -f(x)$
- *График нечетной функции симметричен относительно начало координат (0;0)*

$$f(x) = x^3$$

$$f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$$



- *Функция, которая не является четной или нечетной называется функцией* ***общего вида.***



$$f(x) = x - x^2$$

$$f(-x) = -x - (-x)^2 = -x - x^2$$

14. Определить четность функции:

$f(x)=\frac{1}{x}$ - нечетная, т.к.

$f(-x)=\frac{1}{-x}=-\frac{1}{x}=-f(x)$



$f(x)=x^2+2$ - четная, т.к.

$f(-x)=(-x)^2+2=x^2+2=f(x)$



$f(x) = \sin x$ - нечетная, т.к.

$f(-x) = \sin(-x) = -\sin x = -f(x)$



$f(x) = \cos x$ - четная, т.к.

$f(-x) = \cos(-x) = \cos x = f(x)$



На каком из рисунков изображён график нечётной функции?



a)



b)



c) +



d)



e)

На каком из рисунков изображён график чётной функции?



a)



b)



c)



d)



e) +

Монотонность

- Функция $f(x)$ называется **возрастающей** на $(a;b)$, если $\forall x_1, x_2 \in (a;b)$ из области определения функции $f(x)$ таких, что $x_1 < x_2$ выполняется неравенство $f(x_1) < f(x_2)$

  (меньшему значению аргумента соответствует меньшее значение функции).



- Функция $f(x)$ называется **убывающей** на $(a;b)$, если $\forall x_1, x_2 \in (a;b)$ функции $f(x)$ таких, что $x_1<x_2$ выполняется неравенство $f(x_1)>f(x_2)$ (меньшему значению аргумента соответствует большее значение функции).



- Только возрастающие или только убывающие функции называются **монотонными**.



На каком из рисунков изображён график убывающей функции?



a) +



b)



c) +



d)



e)

На каком из рисунков изображён график возрастающей функции?



a) +



b)



c)



d)



e) +

По графику функции, изображённому на рисунке, укажите:

a) область её определения; $X = [-2;-1) \cup (-1;2]$

b) множество её значений; $Y = (-1;1)$

c) точки, в которых функция обращается в ноль;

$x = \pm 2;\ 0;\ 1$

d) промежутки возрастания и убывания функции.



$f(x) \uparrow \quad x \in (-1;1)$

$f(x) \downarrow \quad x \in [-2;-1) \cup (1;2]$

По графику функции, изображённому на рисунке, укажите:

a) область её определения; $X = (-1;0) \cup (0;+\infty)$

b) множество её значений; $Y = (-1;+\infty)$

c) точки, в которых функция обращается в ноль; $x = -1$

d) промежутки возрастания и убывания функции.

$f(x) \uparrow \quad x \in (0;+\infty)$

$f(x) \downarrow \quad x \in [-1;0)$



По графику функции, изображённому на рисунке, укажите:

a) область её определения; $X = [-1{,}5;1{,}5]$

b) множество её значений; $X = [-1;-0{,}5] \cup (0{,}5;1]$

c) точки, в которых функция обращается в ноль; (нет)

d) промежутки возрастания и убывания функции.

$f(x) \uparrow \quad x \in [-0{,}5;0{,}5]$



По графику функции, изображённому на рисунке, укажите:

a) область её определения; $X = [-1{,}5;1{,}5]$

b) множество её значений; $Y = [0;2]$

c) точки, в которых функция обращается в ноль;

(нет)

d) промежутки возрастания и убывания функции.



$f(x)\uparrow \quad x \in (0;1{,}5]$

$f(x)\downarrow \quad x \in [-1{,}5;0)$

Периодические функции.

- Функция $f(x)$ называется периодической, если существует такое число $T \neq 0$ (называемое периодом), что в каждой точке области определения функции $f(x)$ выполняется условие $f(x+T)=f(x)$

Например: $y=sinx$ и $y=tanx$ - периодические

$$T_{\sin x} = 2\pi \qquad \sin(x+2\pi) = \sin x$$

$$T_{\tan x} = \pi \qquad \tan(x+\pi) = \tan x$$

$y = \sin x$

- *График функции –* ***синусоида***
- $\sin(-x) = -\sin(x)$
- $\sin(x+2\pi k) = \sin x$



$y = tan\ x$

- *График функции –* ***тангенсоида***
- $tan\ (-x) = -\ tan\ x$
- $tan\ (x+\pi k) = tan\ x$



4.Обратные функции

- Функция называется **обратимой**, если каждое значение y поставлено в соответствие единственному x.



обратима



необратима

- Пусть функция $f : X \to Y$ обратима. Тогда на множестве Y определена функция $f^{-1} : Y \to X$, которая каждому $y \in Y$ ставит в соответствие единственный $x \in X$



- Функция $f^{-1}: Y \to X$ называется обратной функцией к функции $f: X \to Y$.

- $f^{-1}: Y \to X$ и $f: X \to Y$ взаимнообратные.

Графики взаимообратных функций симметричны относительно прямой $y = x$.



На каком из рисунков изображён график обратимой функции?



a)



b)



c) +



d)



e)

На каком из рисунков изображён график обратимой функции?



a)



b)



c)



d) +



e)

Какая из функций необратима?

a) $y = \frac{2}{x}$ b) $y = \sqrt{x}$ c) $y = -2x+1$







Какая из функций необратима?

d) $y = x^3$ *e)* $y = (x-1)^2$ *f)* $y = x^2$







+ +

Какая из функций необратима?

g) $y = -\frac{1}{x}$

i) $y = \sqrt[3]{x} - 5$







15. Найти обратную функцию для функции:

$$f(x) = 2x - 1$$

$$y = 2x - 1$$

$$2x = y + 1$$

$$x = \frac{y+1}{2}$$

или

$$y = \frac{x+1}{2}$$



16. Найти обратную функцию для функции:

$$f(x) = x^2, \quad x \in [0; +\infty)$$

$$y = x^2$$

$$x = \pm\sqrt{y}$$

$$x = \sqrt{y} \qquad (mak\ kak \quad x \geq 0)$$

или

$$y = \sqrt{x}, \quad x \in [0; +\infty)$$



5. Основные элементарные функции

- Степенная функция.
- Показательная функция
- Логарифмическая функция
- Тригонометрические функции
- Обратные тригонометрические функции

1. Степенная функция

- $y = x^{\alpha}, \alpha \in R$





$\alpha > 1$



$y = x^{3/2}$



$y = x^3$



$y = x^2$

$0<\alpha<1$



$$y = x^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{x}$$



$$y = x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$$



$$y = x^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{x^2}$$

$\alpha < 0$



$$y = x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$



$$y = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$$



$$y = x^{-1} = \frac{1}{x}$$

2). Показательная функция

- $y = a^x$, $a>0$, $a\neq 1$






y
x
y = (1/3)^x
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-3
-2
-1
0
1
2
3


y
x
y = 3^x
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-3
-2
-1
0
1
2
3


y
x
4
3
2
1
0
-3
-2
-1
0
1
2
3
y = (1/2)^x
y = 3^x
y = 2^x

3). Логарифмическая функция

- $y=\log_a x,\ a>0,\ a\neq 1$






y
x
3
2
1
0
-1
-1
1
3
5
7
9
11
$y = \log_3 x$


y
x
1
0
-1
-2
-3
-1
1
3
5
7
9
11
$y = \log_{1/3} x$

Какие из следующих графиков и по какой причине не могут быть графиками функции $y=log_a x$, если $0<a<1$?



a) +



b) +



c)



d) +



e) +

Какие из следующих графиков и по какой причине не могут быть графиками функции $y=\log_a x$, если $a>1$?



a) +



b)



c) +



d) +



e) +


9
y
7
5
3
1
x
-5
-3
-1
1
3
5
7
-3
-5
y = a^x, a<1
y=a^x, a>1
y=log_a x, a>1
y=log_a x, 0<a<1
y = x

4). Тригонометрические функции

$$y = \sin x$$

$$y = \cos x$$

$$y = \tan x$$

$$y = \cot x$$

$y = \sin x$

- *График функции –* ***синусоида***
- $\sin(-x) = -\sin(x)$
- $\sin(x+2\pi k) = \sin x$



$y = \cos x$

- *График функции -* ***косинусоида***
- $\cos(-x) = \cos x$
- $\cos(x+2\pi k) = \cos x$



$y = tan\ x$

- *График функции –* ***тангенсоида***
- $tan\ (-x) = -\ tan\ x$
- $tan\ (x+\pi k) = tan\ x$



$y = \cot x$

- *График функции –* ***котангенсоида***
- $\cot(-x) = -\cot x$
- $\cot(x+\pi k) = \cot x$



5). Обратные тригонометрические функции

$$y = \arcsin x$$

$$y = \arccos x$$

$$y = \operatorname{arctan} x$$

$$y = \operatorname{arccot} x$$

$y = arcsin\ x$

- *arcsin (-x) = - arcsin x*



$y = arccos\ x$

- $arccos\ (-x) = \pi - arccos\ x$



$y = arctan\ x$

- *arctan (-x) = - arctan x*



$y = arccot\ x$

- $arccot\ (-x) = \pi - arccot\ x$



- Функция, задаваемая одной формулой, составленной из основных элементарных функций и постоянных с помощью конечного числа арифметических операций (+, -, ·,÷) и операций взятия функции от функции, называется элементарной функцией.

$$y = \arcsin\frac{1}{x} - \frac{\tan x}{8x^2 + 3} \qquad y = |x| = \sqrt{x^2} \qquad y = \log\left(2 + x^3\right)$$

примеры элементарных функций

Примеры неэлементарных функций:

$$y = signx = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

$$y = 1 - \frac{x^3}{3! \cdot 3} + \frac{x^5}{5! \cdot 5} - \frac{x^7}{7! \cdot 7} + \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)! \cdot (2n+1)} + \ldots$$

(Количество операций, которое нужно произвести для получения y, не является ограниченным)

5. Сложение графиков функций

- *Чтобы сложить графики функций нужно сложить их ординаты.*
- $y = y_1 + y_2$

Сложите графики двух функций

$$y = 2^x + \left(\frac{1}{2}\right)^x$$

$$y_1 = 2^x$$

$$y_2 = \left(\frac{1}{2}\right)^x$$



Сложите графики двух функций

- $y = x + \sin x$

  $y_1 = x$

  $y_2 = \sin x$



Повторение: ещё некоторые функции

Постоянная функция



$$y = c, c \in R$$

Линейная функция

- $y = kx+b\ (k\neq 0),\quad k,b \in R$
- График – прямая



$k>0$



$k<0$




y
x
8
6
4
2
0
-2
-6
-4
-2
0
2
4
6
y = -2x+1
y = 2x+1
y = -x + 1
y = x+1
y = -1/2x+1
y = 1/2x+1

На каком из рисунков изображён график функции $y= -2x+1$?



a)



b)



c)



d)



e) +

График какой функции изображён на рисунке?



a) $y = 2x - 1$

b) $y = 2x + 1$

c) $y = \frac{1}{2}x - 1$ +

d) $y = \frac{1}{2}x + 1$

e) $y = \frac{1}{2}x$

Квадратичная функция

- $y = ax^2+bx+c,\ a,b,c \in R, a \neq 0$
- График – парабола
-

$$D = b^2 - 4ac$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

$$x_в = \frac{-b}{2a}$$

Квадратичная функция

	a>0	a<0
D>0		
D=0		
D<0		

$y = |x|$

$$y = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$