


Основы социальной медицины

Тема: «Репродуктивное здоровье»
Болезни, передаваемые половым путем.
Меры профилактики

Лекция 5.4.



Преподаватель Пак С.Н.
Выборг
2018

ИППП – это...

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), – это инфекции, распространяющиеся, главным образом, в результате сексуальных контактов от человека человеку.

Входят в перечень социально-значимых заболеваний.



Пути передачи:


1. **Половой путь передачи:** любые виды секса;
2. **Контактно-бытовой путь:** поцелуи, тесные объятия, общее пользование зубной щеткой, бритвой, полотенцем, купание в бассейне, нестерилизованный медицинский инструмент;
3. **Внутриутробный путь:** при родах, через плаценту во время беременности;
4. **Парентеральный путь:** попадание инфекции в кровь и на слизистые (внутривенное введение наркотиков, нестерильное переливание крови);
5. **Другие пути:** через слюну, мочу, выделения из половых органов, грудное молоко.

Классификация ИППП

1. Венерические заболевания, или классические – **сифилис, гонорея**
2. «Новые» венерические болезни (инфекции мочеполовых органов с преимущественным поражением половых органов) – **генитальный герпес, трихомоноз, хламидиоз, уреаплазмоз**
3. Болезни кожи, передающиеся половым путём – **чесотка, педикулёз, лобковые вши**
4. Болезни, передаваемые половым путем, с преимущественным поражением других органов – **ВИЧ, вирусные гепатиты В и С**




Излечимые ИППП: хламидиоз, гонорея, сифилис, трихомоноз



Источник: Newman LM, Rowley J, Vander Hoorn S et al. Global estimates of the prevalence and incidence of four curable sexually transmitted infections, PLoSOne 2015.

Рисунок 3(а). Оценочное число случаев четырех излечимых инфекций, передаваемых половым путем, в разбивке по регионам и полу, 2012 г.




Группы населения повышенного риска:

- **секс-работники и их клиенты;**
- **мобильные группы населения (водители-дальнобойщики, моряки, рабочие-мигранты...);**
- **мужчины, вступающие в сексуальные отношения с мужчинами, имеющими несколько половых партнеров и практикующими анальные половые сношения без презерватива;**
- **мужчины бисексуальной ориентации;**
- **потребители наркотиков;**
- **заключенные, особенно малолетние;**
- **беженцы внутренние и из других стран, и перемещенные лица;**
- **служащие военных, полицейских и других формирований;**
- **туристы;**
- **жертвы изнасилования или гендерного насилия;**
- **беспризорные дети и молодежь, а также эксплуатируемые дети или сироты.**


Сифилис

- **Сифилис** — хроническое системное венерическое инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий болезни, вызываемое бактериями вида бледная трепонема (*Treponema pallidum*).
- **Симптомы:** I стадия - появление на месте инфицирования твердого шанкра; II стадия – сыпь, папулы, пигментация, выпадение волос. III стадия – воспалительные процессы в тканях и органах, образование узлов.




Хламидиоз

- **Хламидиоз** — инфекционное заболевание, передающееся половым путём, вызываемое хламидиями (*Chlamydia trachomatis*).
- **Симптомы:** Белые или желтые выделения из уретры, болезненное мочеиспускание, зуд в области отверстия мочеиспускательного канала, периодические боли в промежности, яичках.




Гонорея

- **Гонорея** — инфекционное заболевание, вызываемое грамотрицательным диплококком — гонококком (*Neisseria gonorrhoeae*), передаваемое половым путём и характеризующееся поражением слизистых оболочек половых органов и органов мочеиспускания.
- **Симптомы:** гнойные желтовато-коричневые выделения с неприятным запахом; боль и жжение при мочеиспускании; воспаление мочеиспускательного канала.



Трихомониаз


- **Трихомониаз** — инфекционное заболевание органов мочеполовой системы человека, возбудителем которого является влагалищная трихомонада.
- **Симптомы:** пенистые выделения; зуд и боль в мочеиспускательном канале; зуд и жжение при мочеиспускании (у мужчин); покраснение и зуд наружных половых органов (у женщин).



Генитальный герпес

Генитальный герпес – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом простого герпеса.

Симптомы: язвенные образования на внутренних и наружных половых органах; покраснение участка кожи вокруг очага; зуд, жжение; нарушения мочеиспускания; выделения различной интенсивности и характера наблюдается общее ухудшение самочувствия: повышение температуры, утомляемость, лихорадочные проявления.



Последствия

- Мужское и женское бесплодие;
- Простатит;
- Воспалительные заболевания матки и придатков; эпидидимит;
- Новообразования половых органов.

Уголовная ответственность

**Ст. 121 УК РФ «Заражение венерической болезнью»
наказывается:**

- штрафом в размере до 200 тыс. рублей;
- в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев;
- обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов;
- исправительными работами на срок до 2 лет;
- арестом на срок до 6 месяцев.

**Заражение двух и более лиц или заведомо
несовершеннолетнего:**

- штраф в размере 200-300 тыс. рублей;
- штраф в размере заработной платы или другого дохода виновного период до 2 лет;
- лишение свободы на срок до 2 лет.



Профилактика

- Правильное и систематическое использование мужских и женских презервативов
- Правильное применение местных бактерицидных средств
- Периодическое обследование с помощью синдромной или лабораторной диагностики
- В случае диагностирования инфекции (или подозрения на её наличие) специализированное лечение
- Половое воздержание
- Уведомление половых партнеров
- Вакцинопрофилактика против онкогенных вирусов гепатита В и папилломавируса человека