#### Маточные средства

- Лекарственные средства, вызывающие тонические сокращения миометрия матки (длительные спазмы)
- Применение:

при маточных кровотечениях:

в *послеродовом периоде,* после искусственного прерывания беременности, *аборта,* при дисфункции яичников,

миома матки, обильных менструациях, после кесарева сечения

Гормональные препараты задней доли гипофиза:

**Окситоцин** Oxytocinum

**Питуитрин**Pituitrinum

внутримышечно по

1 мл 1-2 раза в

В больших дозах – повышает тонические сокращения, т.е. длительные сокращения миометрия

• Препараты алкалоидов спорыньи

**эргометрин** – Ergometrini maleas табл.,

амп. 0,02 % (в/м, в/в, сп.Б)

- -эрготамин
- -метилэргометрин
- -эрготал

вызывают длительный спазм и механическое сдавливание сосудов миометрия, кровотечение прекращается

• Синтетические препараты:

котарнина хлорид (стиптицин) табл. сп.Б

назначают по 1 таблетке 3 раза в день • вызывает длительный спазм и механическое сдавливание СОСУДОВ миометрия

• Кровоостанавливаю

щие средства:

коагулянты:


- викасол
- кальция хлорид

лек. растения:

спорыш



• пастушья сумка



- калина
- водяной перец
- крапива



#### **Лекарственные средства, понижающие** тонус миометрия матки

**Токолитические средства** или *токолитики* 

Действие:расслабляют мускулатуру матки – действие спазмолитическое,

улучшают маточно-плацентарное крово- обращение

Применение: для предупреждения родов (выкидыша), при спазмах матки

# **Токолитики** - β адреномиметики:

партусистен фенотерол в/в, капельно и табл. сальбупарт в/в, капельно и табл.

- ритодрин, тербутамин



### **Токолитики** - спазмолитики миотропного действия:

- Спазмолитики миотропного действия: но-шпа, папаверин;
- м-холиноблокаторы: **атропин**;
- гестагены: прогестерон (гормон желтого тела), туринал;
- витамин E (токоферола ацетат);
- закись азота



#### маточные средства

• ПОМНИТЕ, что маточные средства, во избежание осложнений и нанесения урона жизни женщины, без назначения врача применять НЕЛЬЗЯ!