

А.А. Қозбағаров атындағы “Перинатология”
кафедрасы

Тақырыбы: Жүктілік кезіндегі гипертониялық
жағдайлар

Лектор: к.м.н. Манабаева Г.К.

2020г

Дәріс мақсаты

- Клиникалық жағдайды зерттеу арқылы
- патогенезі, клиникалық ерекшелікт
- гипертониямен патоморфология,
- жүктілікке байланысты, іштей қабы
- жіктеу, акушерлік тактика,
- терапия принциптері
- Дамытыңыз және бекітіңіз
- клиникалық дағдылар
- 3,4 курс студенттері арасында ойла
- OMF, SD, SF
- Артықшылықтарын көрсетіңіз
- интеграцияланған пәндік оқыту
- патологиялық бөліммен бірге
- Ю. атындағы анатомия және сот медицинасы. Пругло



ДӘРІС ЖОСПАРЫ

- **ЖҮКТІЛІК КЕЗІНДЕГІ**
- **ГИПЕРТЕНЗИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДЫ АНЫҚТАУ**
- **КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙДЫ ТАНЫСТЫРУ**
- **ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРДЕГІ СОЗЫЛМАЛЫ
ГИПЕРТЕНЗИЯНЫҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ
АСПЕКТІЛЕРІ ЖҮКТІЛІКТЕН ТУЫНДАҒАН
ГИПЕРТЕНЗИЯНЫҢ ҚАУІП ФАКТОРЛАРЫ ЖӘНЕ
ЖІКТЕЛУ ЖҮКТІЛІККЕ БАЙЛАНЫСТЫ
ГИПЕРТЕНЗИЯНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**
- **ЖҮКТІЛІКТЕН ТУЫНДАҒАН ГИПЕРТЕНЗИЯНЫҢ
ПАТОГЕНЕЗІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ**
- **ДӘЛЕЛДІ МЕДИЦИНА ТҰРҒЫСЫНАН АКУШЕРЛІК
ТАКТИКА**

Ажырату қажет:

Созылмалы артериялық гипертензия

Жүктілікке байланысты гипертензия

Созылмалы артериялық гипертензия



Бұл жүктілікке дейін анықталған немесе жүктіліктің 20 аптасына дейін диагноз қойылған және босанғаннан кейін 6-12 аптадан кейін сақталатын гипертензиямен көрінетін ауру

Морфологиялық аспектілері




- жүктілік кезіндегі созылмалы артериялық гипертензияның себептері, ең алдымен, (1) гипертония, (2) бүйректің созылмалы қабыну аурулары және (3) нейроэндокринді бұзылулар.



Основные морфологические изменения при хронической артериальной гипертензии



Основные морфологические изменения при хронической артериальной гипертензии



Жүктілікке байланысты гипертензиялар

- Бұл жүктіліктің 20 аптасынан кейін пайда болатын гипертензия және босанғаннан кейін 6-8 апта ішінде қан қысымы қалыпқа келеді**

Жүктілікке байланысты
гипертензия (бұрын гестоз,
жүкті әйелдердің кеш
токсикозы деп аталған) ауру
емес, жүктіліктің асқынуы

Әлемде жүктілікке байланысты гипертензияның жиілігі 8-ге дейін

Даму қауіп факторлары

- 18 жасқа дейінгі және 40 жастан асқан
бірінші жүкті әйелдер
Экстрагенитальды
аурулар: жүрек - қан тамырлары
аурулары
қант диабеті
семіздік ($BMI > 35$)
антифосфолипид синдромы
Алдыңғы
жүктілік кезіндегі эклампсия/эклампсия

- **Отбасы тарихындағы
Презеклампсия Бірнеше
жүктілік Босану
арасындағы Интервал 10
жылдан асады**

Жүктілікке байланысты гипертензиялар

Жіктелуі

1. Гестациялық гипертензия2.

**Презклампсия:жеңіл (орташа, ауыр
емес)ауыр3. Эклампсия**

Жүктілікке байланысты гипертензиялар

- Тән клиникалық белгілері: жүктіліктің II жартысында пайда болған артериялық гипертензия жүктілік кезінде пайда болған протеинурия балтырдан жоғары қарай таралатын ісінулер

**Орташа ісіну физиологиялық
жүктілік бар жүкті әйелдердің
50% -80% - ында байқалады**

Протеинурия

**Тәуліктік зәр анализінде $>0,3$
г/тәул немесе $>0,3$ г/л**

Артериялық гипертензия

- Систолалық қысым ≥ 140 мм рт ст-
Диастолалық қысым ≥ 90 мм рт ст 30 минуттан
кем емес аралықпен екі рет өлшеу кезінде