

Особенности страхов у старших дошкольников с патологией в развитии

Выпускная квалификационная работа

Выполнила:

Никулина Полина Сергеевна

Научный руководитель:

к.психол.н.,

Панфилова Марина Александровна

Актуальность:

- Согласно статистике к 2016 году в России насчитывается 12,7 миллионов детей с патологиями в развитии, при этом, их число с 2000 года возросло на 5%. Относящиеся к ним дети с ЗПР и ОНР не воспринимаются окружающими людьми как дети, имеющие яркие специфические характеристики. Но, в силу особенностей эмоциональной и личностной сфер, они, в большей степени, чем дети без патологии в развитии, предрасположены к формированию и закреплению разного рода страхов.

Цель: выявление особенностей страхов у детей старшего дошкольного возраста с патологией в развитии (ЗПР и ОНР)

Объект: эмоциональная сфера детей с патологией в развитии (ЗПР и ОНР).

Предмет: страхи у старших дошкольников с патологией в развитии (ЗПР и ОНР).

Задачи:

1. Провести теоретический анализ литературы по понятиям страх, эмоциональной и личностной сферам детей без патологии и с патологией в развитии (ЗПР и ОНР) и исследованиям особенностей страхов у этих групп.
2. Выявить особенности (число и темы) страхов у старших дошкольников с патологией (ЗПР и ОНР) и без патологии в развитии.
3. Определить интенсивность страхов у старших дошкольников с патологией (ЗПР и ОНР) и без патологии в развитии.
4. Изучить особенности (темы, число, интенсивность) оценки страхов родителями детей с патологией в развитии (ЗПР и ОНР) и без патологии в развитии.

Гипотеза:

Старшие дошкольники с патологией в развитии имеют большее число и интенсивность страхов, а их темы являются социально- опосредованными(людей, родителей, наказания, опоздания, одиночества, ошибиться, не успеть).

Для проверки данной гипотезы предполагается применять следующие методы исследования:

- 1.Библиографический:* анализ имеющихся в научной литературе данных по проблеме изучения эмоциональной сферы.

2. *Психодиагностический:*

- Анкетирование родителей по опроснику А.И. Захарова.
- Тест «Страхи в домиках» (опросник А.И.Захарова в модификации М. А. Панфиловой).
- Сказка «Страх» из проективной методики «Расскажи историю» (Г.Х.Махортова).
- Методика исследования самооценки «Лесенка» (В. Г.Щур).

3. *Статистический:* статистическая обработка результатов, полученным по данным методикам, проводилась при помощи пакета статистических программ Statistica, version 8.0 (StatSoft Inc.).

Характеристика выборки:

- Число обследованных детей составило 100 человек: 50 детей с патологией (ЗПР и ОНР) – 25 девочек и 25 мальчиков, и 50 без патологии в развитии – 25 девочек и 25 мальчиков. Количество взрослых – 48 человек. Исследование было проведено на воспитанниках старших и подготовительных групп детских садов ГБОУ «Детский сад № 1029», ГОУ «Детский сад № 572», ГБОУ «Детский сад № 1016» в возрасте от 5 до 7 лет и их родителях.

Результаты исследования. Количество страхов




Рис. 1. Сравнительный анализ числа страхов детей с патологией (ЗПР и ОНР) и без патологии в развитии .

Темы страхов.

Таблица № 1. Сравнительный анализ основных тем страхов старших дошкольников с патологией (ЗПР и ОНР) и без патологии в развитии .

тема	Дети с ПР (ЗПР и ОНР)(%)	Дети БПР(%)
нападения	82(83;81)	88
заболеть	56(54;58)	72
умереть	78(88;69)	88
смерти родителей	50(46;54)	74
незнакомцев	52(54;50)	72
наказания	64(63;65)	74
сказочных персонажей	76(83;69)	84
страшных снов	74(83;65)	84
темноты	54(67;42)	56

животных	64(58;69)	76
стихии	80(88;73)	90
высоты	52(50; 54)	68
глубины	68(58;77)	70
огня	72(79;65)	82
пожара	76(79;73)	96
войны	70(71;69)	90
крови	70(75;65)	54
уколов	68(71;65)	54
боли	76(71;81)	78
ошибиться	84(96;73)	88
не успеть	48(54;42)	80

Интенсивность переживания страхов (%)




Рис. 2. Сравнительный анализ интенсивности страхов старших дошкольников с патологией (ЗПР и ОНР) и без патологии в развитии.

Количество страхов по мнению родителей.




Рис. № 3. Сравнительный анализ количества страхов детей старшего дошкольного возраста без патологии и с патологией в развитии (ЗПР и ОНР) по результатам анкетирования родителей по опроснику А.И.Захарова

Темы страхов по мнению родителей

Таблица № 2. Сравнительный анализ основных тем страхов детей без патологии и с патологией в развитии по результатам анкетирования их родителей по опроснику А.И.Захарова

	Родители детей с ПР (ЗПР и ОНР) (%)	Родители детей с БПР (%)
смерти родителей	63	67
наказания	67	42
страшных снов	63	71
кошмаров	83	71
крови	75	46
уколов	83	75
боли	88	88
резких звуков	71	75

Интенсивность переживания страхов по мнению родителей (%)




Рис. 4. Сравнительный анализ частоты распространения (%) интенсивности страхов детей старшего дошкольного возраста с патологией и без патологии в развитии.

Самооценка (%)




Рис. 5. Показатели самооценки по результатам методики «Лесенка» у старших дошкольников с патологией (ЗПР и ОНР) и без патологии в развитии.

Таблица № 3 Корреляционный анализ количества страхов у старших дошкольников с патологией (ЗПР и ОНР) и без патологии в развитии

Сравнение группы нормы с патологией (Количество страхов)			
	БПР Среднее значение (SD) n=50	ПР Среднее значение (SD) n=50	Mann-Whitney U Test
Количество страхов	19,40 (3,40)	17,52 (4,83)	p=0,03
Группы внутри аномалии (количество страхов)			
	ЗПР	ОНР	
Количество страхов	18,45 (4,12)	17,00 (5,30)	p=0,37

Выводы

1. Количество страхов у старших дошкольников с патологией и без патологии в развитии превышает возрастную норму. Однако, у старших дошкольников с патологией в развитии, как в общем, так и отдельно у групп детей ЗПР и ОНР страхов чуть меньше, чем у старших дошкольников без патологии в развитии. Данное соотношение также характерно для мальчиков, а число страхов во всех группах девочек одинаковое.
2. Темы страхов у детей с патологией в развитии менее выражены, чем у детей с без патологии в развитии. У детей с патологией в развитии реже наблюдаются страхи стихии, огня, пожара, войны, социально—опосредованные (не успеть, наказания, незнакомцев), смерти себя и родителей, животных, страшных снов, заболеть, высоты. Однако, они чаще боятся крови и уколов (медицинские страхи)

3. В экспериментальной и контрольной группе выражены примерно в равной степени страхи сказочных персонажей, темноты, боли, нападения, ошибиться (социально-опосредованный) и глубины.
4. В темах страхов у девочек с патологией в развитии имеются те же особенности, что у всей экспериментальной группы, но меньше проявляется страх одиночества.
5. В темах страхов у мальчиков с патологией в развитии значительно меньше проявляется страх огня, пожара и темноты, чем в контрольной группе.
6. В экспериментальной и контрольной группе родители считают, что их дети имеют меньшее количество страхов. Ответы родителей в экспериментальной группе совпадают по темам с ответами их детей.

7. Старшие дошкольники в экспериментальной и контрольной группе переживают страхи со средней степенью интенсивности и имеют высокую самооценку, что соответствует возрастной норме.

Спасибо!