

Формы и виды декоративно-растущих кустарников.

- Сегодня Вашему вниманию мы предлагаем рассмотреть формы и виды декоративных кустарников произрастающих на территории Алтайского края .По другому сказать местного произрастания.

1. Лимонник китайский

Лиановидное растение, имеющее темные листья, используется при вертикальном озеленении, не выносит засухи. Высаживают лимонник на солнечном месте, защищенном от ветров. Цветет растение весной, а плоды украшают его до конца сезона. Советуют высаживать хотя бы три саженца. В начале июля срезаются верхние молодые побеги. Далее нужно соблюсти такую процедуру:

- ⦿ На сутки саженец помещается в емкость с раствором гетероауксина.
- ⦿ Затем подготавливается емкость с речным песком.
- ⦿ В эту смесь нужно прикопать побег и закрыть полиэтиленом.



2. Самшит

- ⦿ Вечнозеленое кустарниковое растения до 2,5 м высотой, очень неприхотливое, не боится ветра и сквозняков. Самшит любит в летнее время регулярный полив и подкормку, размножается черенками. Растение применяют для создания живых изгородей. Очень оригинально смотрятся любые формы и фигуры, которые можно сформировать при обрезке.



3.Форзиция

- Этот кустарник семейства маслиновых ценится именно за раннее (еще до появления листьев) и красочное цветение. В конце апреля и начале мая куст покрывается небольшими желтыми цветами. В условиях Сибири высаживают форзицию гибридного сорта (среднюю или промежуточную), овальную, Линвуд. Кусты лучше укрывать на зиму. Для хорошего зимования в августе-сентябре делают укорачивание или прищипывание кончиков побегов. Растение предпочитает плодородные почвы, солнечное и защищенное от холодного ветра место, не любит засуху, неприхотливо. Размножается форзиция корневыми отпрысками или отводками, а также зелеными черенками. Применяется в ландшафтном дизайне как раннецветущее весеннее растение.



4.Кариоптерис

- ◎ цветущий листопадный кустарник из семейства яснотковые. Это неприхотливое растение оживит любую лужайку или свободное место в саду. По декоративности кариоптерис не уступает [вереску](#) с [лавандой](#): аккуратная форма, яркие соцветия на высоких стеблях, резная листва. В средней полосе РФ посаженные кусты отлично себя чувствуют в открытом грунте, просты в уходе и хорошо переносят зимы.



5. Ладанник

- представляет собой невысокий кустарник с ветвистыми опушенными побегами. Могут быть вечнозелеными или полувечнозелеными, растут до 150-200 см. Листья расположены супротивно, плотные, овальной формы, темно-зеленого окраса. Форма кроны часто компактная округлая, одинаковая в ширину и в высоту, реже неправильная. Плоский крупный цветок. Семенное размножение начинают в феврале с выращивания рассады. Высевают на небольшом расстоянии друг от друга, присыпают тонким слоем компоста, слегка придавливают почву и поливают.



6. Маральник

- ◉ В Алтайском крае цветение маральника связывают с открытием летнего туристического сезона.

Листья яйцевидно-эллиптические, на верхушке тупые, нередко выемчатые, реже заострённые, сверху оливково-зелёные, блестящие, с рассеянными чешуйками, снизу бледнее, быстро становятся ржаво-бурыми, густо покрыты чешуевидными желёзками. Для культивирования в условиях сада растения высаживают в месте, защищённом от прямых солнечных лучей, желательно рядом с хвойными растениями (например, соснам). Семена хранят в бумажных пакетах или в плотно закупоренных стеклянных сосудах в сухом неотапливаемом помещении. Всхожесть семян сохраняется 3 года. Всхожесть семян: лабораторная — 96 %, грунтовая — 97 %. Семена в стратификации не нуждаются.



7. Сибирский кедр

- Сибирский кедр — вечнозелёное дерево 20—25 (40) м высотой. Отличается густой, часто многовершинной кроной с толстыми сучьями. Ствол прямой, ровный буро-серый, у старых деревьев образует трещиноватую чешуйчатую кору. Ветвление мутовчатое. Побеги последнего года коричневые, покрыты длинными рыжими волоскам.
Хвоя на укороченных побегах тёмно-зелёная с сизым налётом, длиной 6—14 см, мягкая, в разрезе трёхгранная, слегка зазубренная, растёт пучками, по пять хвоинок в пучке. Зрелые шишки крупные, вытянутые, яйцевидной формы, сначала фиолетовые, а затем коричневые, 5—8 см шириной, в длину до 13 см; чешуи их плотные, прижатые, на поверхности покрыты короткими жёсткими волосками. Шишки вызревают в течение 14—15 месяцев и опадают в сентябре следующего года. Шишки опадают целиком, не раскрываясь.



8. Чубушник

- ◎ Самый распространенный вид чубушника. Близкий к чубушнику кавказскому южноевропейский вид. Встречается на Кавказе, в Южной Европе и Малой Азии. Зоны USDA 4a-8a, в суровые зимы обмерзает до высоты снежного покрова. Хорошо растет на солнце и в полутени, мирится с сухими почвами, не переносит засоления и застойного увлажнения. Растет быстро и обильно цветет до 30-летнего возраста. Кустарник до 3 м высотой. Отличается от чубушника обыкновенного красновато-коричневыми или желтоватыми густооблиственными молодыми побегами с трещиноватой корой. Листья супротивные, черешковые, овальные, с редкозубчатым краем, сверху голые, снизу по жилкам опушенные. Душистые, кремово-белые цветки до 4,5 см в диаметре собраны по 5-7 в конечные, кистевидные соцветия. Продолжительность цветения до 22 дней. Хороший медонос.



9. Дерен Сибирский



Ярким украшением сада в любое время года, несомненно, является Дерен. Он широко культивируется как декоративное растение благодаря красивому внешнему облику и листве. Стоит отметить также пышное цветение, красивые яркоокрашенные цветки и листочки обертки и плоды. После листопада эффектно смотрятся яркие красные или желтые побеги, особенно контрастно выглядящие на фоне белого снега.

Дерен широко применяется как в городском озеленении для получения стриженных живых изгородей, так и для одиночных посадок на газоне. Этот кустарник очень ценен для приусадебных участков, особенно с близким стоянием грунтовых вод, он не только украшает сырые места, где могут расти не все растения, но и осушает их.



10. Пузыреплодник

- ◎ Пузыреплодник калинолистный (*Physocarpus opulifolius*) - очень декоративный листопадный кустарник семейства розоцветных высотой до 3 м. Куст имеет раскидистые поникающие ветви, образующие густую шарообразную крону, благодаря чему нестриженный куст закрывает довольно большую площадь. В середине июня, когда многие древесные культуры средней полосы уже отцвели, на ветвях пузыреплодника появляются многочисленные щитковидные соцветия мелких розовато-белых цветков. Цветет растение около 3 недель. Цветки выдают его близкое родство со спиреями и другими розоцветными.



11.Хеномелес японский

- кустарник высотой до 3м с поникшими к земле ветвями буровато-серого окраса. Молодые побеги покрыты острыми колючками. Листья кожистые, овальные или округло-овальные, с тупой верхушкой. Цветки ярко-красного, розового или белого окраса, диаметром до 5 см, цветут 4-5, иногда 6-7 дней. На одном растении может быть несколько сотен цветков. Распускаются они неодновременно, в связи с этим цветения, как и у предыдущего вида, длится 20-25 дней.

Плоды округлые или грушевидные, при созревании желтой окраски, с красноватыми точками. Есть также формы с желто-коричневым, светло-зеленым и зеленым окрасом. Хеномелес японская отличается высокой устойчивой неприхотливостью к условиям ее выращивания. Айва японская перекрестно опыляемая культура и нуждается в опылителях. Кроме того, для формирования урожая ей необходима хорошая освещенность.



12.Скумпия

- ◎ Скумпия (Cotinus) — это невероятной красоты листопадное дерево или кустарник. Она относится к семейству Сумаховые. Родиной скумпии являются Северная Америка и районы Евразии, где климат является умеренным. Известно всего два вида данной культуры. Размножение скумпии возможно несколькими способами: Отводками; Черенками; Семенами. Культура прекрасно смотрится на садовых участках благодаря своим эффектным декоративным качествам. Она прекрасна и в одиночных, и в групповых посадках. Также используется в миксбордерах, каменистых садах. В групповых посадках обычно сажается на заднем плане.



13. Калина бульденеж.

Калина бульденеж- является разновидностью калины обыкновенной и представляет собой широкораскидистое дерево высотой до 4 метров. При хорошем уходе это растение живет до 50 и более лет и каждый год радуется продолжительным цветением. Цветет бульденеж шаровидными соцветиями в начале лета. Цветение продолжительное, от 2 недель до месяца. Распускающиеся цветки сначала имеют зеленоватый оттенок, затем становятся ярко-белыми, в конце цветения розовеют. Характерной особенностью сорта является полное отсутствие запаха у цветков. Растение зимостойкое, но в суровые зимы может частично вымерзать. Корневая система поверхностного типа.

Возможно только вегетативное размножение, поскольку цветки у калины Бульденеж – бесплодные. В конце весны – начале лета калину размножают отводками.



14. Кизильник горизонтальный

- ◎ Кизильник горизонтальный — пышный кустарник из семейства Розовых. Дикие экземпляры этого растения встречаются на территории Китая. Это вечнозеленый многолетний кустарник, который не теряет своей «одежды» на зиму. Горизонтальный кизильник размножается несколькими способами. Размножить кустарник можно при помощи выращивания семян, а также черенками и отводками. При размножении семенами придется кустарник прививать, чаще всего прививают кизильник на боярышник или рябину.



15. Дейция розовая.

- Дейция розовая-представляет собой гибридный красивоцветущий кустарник, в высоту не превышающий одного метра. Относится к семейству Гортензиевых. Это гибрид сорта пурпурной и изящной дейции. Крона растения раскидистая.

Дейцию размножают зелеными и одревесневшими черенками, отводками, корневыми отпрысками, делением куста, а также семенами. Дейция предпочитает свежие плодородные почвы, любит глинистые участки с умеренным увлажнением. Для нее недопустимо близкое стояние грунтовых вод. На малоплодородных почвах не будет пышного цветения.



16. Будлея Давида.

- ◎ Будлея Давида
- ◎ Один из самых красивых цветущих декоративных кустарников , вырастающий без подрезки до 2,5 м. Цветет в июне - сентябре стреловидными соцветиями, состоящими из мелких белых и сиреневых цветочков, пахнущих медом. Любит хорошо дренированные известковые плодородные почвы, освещенные солнцем места. Кустарник необходимо хорошо подрезать: в марте срезают весь прошлогодний прирост до пеньков 5 см высотой. Размножается культура достаточно просто - при помощи семян в весенние месяцы или зелеными черенками осенью.



17. Бересклет.

- Бересклет Достаточно высокий (до 3-5 м) кустарник, имеющий ярко-зеленые крупные листья, которые осенью окрашиваются в красивые оттенки розово-красной гаммы. Цветет во второй половине мая мелкими бело-зелеными цветками. Максимальной декоративности достигает при созревании плодов — ярко-розовых коробочек, которые лопаются и образуют очень нарядный букет висящих семян. Бересклет почти всю осень и зиму выглядит красочно и часто используется как декоративный кустарник). Любит рыхлые и плодородные почвы, высаживать его можно и на освещенных, и на притененных местах. Морозоустойчив и засухоустойчив. Чаще всего кусты используют группами, высаживают для создания бордюра. Размножается бересклет семенами (с предварительной 4-месячной стратификацией), которые высевает во влажную песчаную почву при 3-4 градусах тепла. Культура хорошо переносит обрезку.



18. Барбарис Тунберга .

- ◎ Это колючий кустарник, вырастающий до 2,5 м в высоту, с шаровидной кроной. Его родина — Китай и Япония. Барбарис имеет красивые мелкие круглые листочки, которые осенью окрашиваются в огненно-красные цвета. Цветет одиночными желтыми цветами, плоды — красные ягоды, которые долго не опадают и являются дополнительным украшением куста. Растение не требовательно к грунту, любит свет, относится к морозостойким декоративным кустарникам.. Его можно подстригать, придавая необходимую форму, поэтому барбарис Тунберга часто применяют для создания живых изгородей. При размножении семена его необходимо стратифицировать в течение 3 месяцев. При посадке саженцев рекомендуется вносить 200 г древесной золы на каждый кустик. Высаживают кусты на расстоянии 1,5-2 м



19. Арония черноплодная .

- ◎ Это кустарник до 3 м высотой, принадлежащий семейству розоцветных, пришедший из Северной Америки. У нее очень красивые листья: летом — эллипсоидной формы темно-зеленого цвета, а осенью они становятся алыми или темно-красными. Цветет в мае-июне бело-розоватыми цветами. Плоды созревают к августу-сентябрю, их можно использовать в лечебных целях. Растение засухо- и морозоустойчиво, размножают его весной семенами, предварительно стратифицированными (3 мес.), также можно делать черенкование или прививку. Часто аронию прививают на черноплодную рябину. Аронию черноплодную можно высаживать как поодиночке, так и в группах, хорошо использовать в изгородях.



20. Гортензия метельчатая.

- Растение достигает в высоту 2 м, цветет очень обильно в июле-августе. Цветки собраны в густые соцветия белой, а позднее розовой расцветки. Культура хорошо переносит затенение и морозы зимой, любит влажную плодородную нейтральную почву, размножается черенками (весной). Каждый год весной требуется обрезать слабые и мелкие побеги, сильные оставляют с 4-8 почками. Летом, после появления бутонов, следует повторно удалить слабые ветки, чтобы цветы были крупнее. Кроме того, рекомендуется хорошо пропалывать почву вокруг куста и вносить удобрения. Крупные ветки с бутонами лучше подвязать. Кустарник можно использовать как в одиночной, так и в групповой посадке.

