

Вскармливание детей
первого года жизни.

- Основное требование к рациональному питанию - количество и качество принимаемой пищи должны соответствовать потребностям организма.
- Питание ребенка на первом году жизни называется вскармливанием. Вскармливание обеспечивает адаптацию малыша к внешнему миру и определяет рост и развитие детского организма. Существует 3 основных вида вскармливания:
естественное(натуральное,грудное);
искусственное;
смешанное.

- Естественным называется такое вскармливание, когда ребенок на первом году жизни получает только материнское молоко.
- Однако, если до введения прикорма, молоко составляет не менее $4 / 5$ от общего объема принимаемой пищи или ребенок получает донорское молоко, вскармливание тоже называется естественным.

- Искусственное вскармливание - это такой вид вскармливания ребенка I полугодие, когда она совсем не получает материнское молоко или оно составляет $1 / 5$ и менее суточного объема пищи.
- Смешанным называется вскармливание, когда ребенок в первом полугодии жизни в течение суток получает материнское молоко и искусственную смесь (объем ее составляет более $1 / 5$ суточного рациона).

Состав и отличительные особенности материнского молока

- В конце беременности и в первые дни после рождения ребенка из молочных желез выделяется молозиво - густая жидкость желтоватого цвета, с относительной плотностью 1,040-1,060. Молоко, которое получает ребенок с 4-5 дня жизни, называется переходным, а с 2-3 недели - зрелым (относительная плотность 1,030).

Состав и отличительные особенности материнского молока

- БЕЛОК, в зрелом женском молоке белка 1,1-1,5 г/100 мл. В коровьем молоке протеина 2,8-3,5 г/100 мл. Таким образом, при получении коровьего молока ребенок перекармливается белком.
- Кроме того, белки женского молока отличаются не только количеством, но и качественными особенностями: основным компонентом является сывороточные белки - альбумины и глобулины; так как они аналогичны белкам сыворотки крови ребенка, то могут всасываться в кишечнике в неизмененном виде; важной отличительной особенностью белкового состава грудного молока от коровьего молока является соотношение между альбумино-глобулиновой фракции и казеиноген. Последний появляется в молозиве на 4-5 день лактации, количество его постепенно увеличивается. Соотношение между альбумино-глобулиновой фракции и казеиноген в грудном и коровьем молоке соответственно равна 4:1 и 1:4;

Состав и отличительные особенности материнского молока

- казеиноген в желудке под воздействием желудочного сока превращается в казеин; молекулы казеина женского молока более мелкие, чем коровьего, и поэтому при его розщеплении хлопья становятся еще мельче; это один из факторов лучшего переваривания и усвоения белков женского молока по сравнению с коровьим молоком;
- в молозиве есть лейкоциты, большинство из которых, являясь лимфоцитами, синтезируют иммуноглобулины; особенно много Ig A;
- материнское молоко имеет большое количество таурина - аминокислоты, необходимой для соединения солей желчи (это способствует усвоению жиров), для формирования ткани у новорожденного, в первую очередь сетчатки глаза и головного мозга

Состав и отличительные особенности материнского молока

- **ЖИРЫ** - количество жира в зрелом грудном молоке (3,5-4,5 г/100 мл) не намного больше количества в коровьем молоке (3,2-3,5 г/100 мл).
- Основную часть жиров составляют триглицериды - 98%.
- К главным особенностям жира грудного молока относятся:
в женском молоке есть фермент липаза, способствует всасыванию 90-95% жира грудного молока (жир коровьего молока - менее 60%);
высокая степень дисперсности;
низкое содержание насыщенных жирных кислот, которые раздражают желудочно-кишечный тракт (их небольшое количество в грудном молоке является одним из факторов меньшего числа дисфункций желудочно-кишечного тракта при естественном вскармливании);

Состав и отличительные особенности материнского молока

- высокое содержание ненасыщенных (эссенциальных) жирных кислот, основными из которых являются линоленовая и особенно важна для ребенка раннего возраста арахидоновая: эти кислоты не синтезируются в организме человека.
- считается, что увеличение количества жиров в позднем молоке действует как регулятор насыщения.

Состав и отличительные особенности материнского молока

- УГЛЕВОДЫ - в среднем, в грудном и коровьем молоке углеводы составляют соответственно 7,0 г/100 мл и 4,5-4,8 г/100 мл.
- Углеводы в женском молоке - это в основном молочный сахар в виде бета-лактозы, которая составляет 90% общего его количества.
- Функциональные особенности бета-лактозы грудного молока следующие:
 - она доходит до толстого кишечника, так как медленно всасывается в тонком кишечнике;
 - создает в толстом кишечнике слабокислую среду (рН 5-5,5), что губительно действует на гнилостные бактерии;

Состав и отличительные особенности материнского молока

- часть вызывает интенсивное размножение бифидум-флоры. Эта особенность углеводов грудного молока в значительной степени предопределяет нечастое возникновение дисбактериоза у детей, находящихся на естественном вскармливании;
 - стимулируют синтез витаминов группы В.
- В отличие от женского молока, в коровьем молоке являются главным образом альфа-лактоза. В большей части она усваивается в тонком кишечнике. Отсюда становится понятным, что коровье молоко не выполняет выше описанные функции углеводов на первом году жизни ребенка. Поэтому у детей, находящихся на искусственном вскармливании, часто возникает дисбактериоз, развиваются бактериальные заболевания кишечника.

Состав и отличительные особенности материнского молока

- В женском молоке есть необходимый для развития детского организма состав ВИТАМИНОВ. Их гораздо больше, чем в коровьем молоке. Однако количество витаминов зависит от сезона года и питания матери.
- Основные особенности минерального состава:
 - в материнском молоке постоянно сохраняется идеальное соотношение между кальцием и фосфором - 2:1, что обеспечивает нормальный рост и развитие костной ткани ребенка;
 - в коровьем молоке кальция меньше, а фосфора больше; последний лучше всасывается, а это приводит к гипокальциемии у ребенка, который находится на искусственном вскармливании;
 - железа в молоке менее 1 мг / л, однако резорбция его составляет 50-70%, что значительно выше железа любой другой пищи; в коровьем молоке количество его незначительна и всасывается около 30%;
 - поэтому у ребенка, который находится на естественном вскармливании, до 6-8 месяцев почти никогда не развивается железодефицитная анемия такое заболевание крови могут иметь только те дети, матери которых страдали дефицитом железа еще до беременности;

Состав и отличительные особенности материнского молока

- В материнском молоке также являются:
 - активные ФЕРМЕНТЫ (протеаза, трипсин, диастаза, липаза);
 - Гормоны щитовидной железы, надпочечников, гипофиза, кишечного тракта;
 - Гормоноподобных веществ (эритропоэтин, кальцитонин, простагландины);
 - ФАКТОРЫ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ЗАЩИТЫ (IgA, IgM, IgG, количество их в молоке постепенно уменьшается;
 - Факторы неспецифической защиты (лизоцим, макрофаги);
 - АНТИТЕЛА (до эшерихий, шигелл, кокковой и другой флоры).
 - Для грудного молока характерна полная ОТСУТСТВИЕ антигенные свойства, тогда как белки коровьего молока высокоантигенны.
 - Женское молоко всегда тепло - оптимальное для приема малыша.

Правила естественного вскармливания

- Перед каждым кормлением необходимо помыть молочную железу (по современным правилам при частом по показаниям вскармливании это делается не каждый раз).
- Вскармливания проводится в спокойном, уверенном состоянии матери в удобном, расслабленном сидячем (можно лежа) положении. Тело ребенка необходимо прижать к телу матери, лицо направить к материнской груди. Поддержаны снизу голова и тело малыша должны быть в одной плоскости.
- При каждом вскармливании ребенок прикладывается только к одной молочной железе, чередуя их.

Правила естественного вскармливания

- Сначала нужно сцедить несколько капель молока, затем приложить ребенка к груди. Малыш должен хорошо захватить ртом не только сосок, но и большую часть ареолы, плотно прикоснувшись к груди подбородком. Рот при этом должен быть хорошо открыт, а нижняя губа вывернута наружу.
- После кормления на 1-2 месяца жизни необходимо сцеживать из груди молоко, которое осталось. В дальнейшем, как правило, стабилизируется образования нужного количества грудного молока, и сцеживания не проводится.
- С целью дополнительной профилактики образования на соске трещин необходимо после кормления вытереть молочную железу чистой, тонкой пеленкой.

Правила естественного вскармливания

- Продолжительность кормления ~ 20-30 мин. Однако, по современным взглядам, не существует точного времени разового вскармливания ребенка. Разные дети сосут грудь с несколько разной частотой течение дня и с разной длительностью одного кормления. Так называемые «ленивые смоктуны» долго сосут, «быстрые смоктуны» быстро наедаются. Нельзя отнимать малыша от груди, если он еще сосет. Во-первых, он должен удовлетворить свои "аппетитные" потребности. А во-вторых, молоко значительно отличается по своему составу в начале и конце кормления.
- Положение ребенка после кормления.
- Если по какой причине ребенок не сосет грудь, необходимо сцедить грудное молоко для того, чтобы продолжалась его секреция дальнейшем.

Правила естественного вскармливания

- При необходимости, для выяснения степени лактации, ребенку назначается контрольное взвешивание. С этой целью на весах определяется фактическая масса тела ребенка до кормления и после него. Разница между полученными цифрами указывает на количество молока, принятого ребенком за одно вскармливание. Проводится это 3-4 раза в день. Рассчитав между полученными цифрами средний показатель и умножением на количество кормлений в течение суток, мы узнаем о общий объем молока ребенок высасывает за 24 часа.

Режим кормления ребенка

- После нормальных родов младенец впервые прикладывается к груди еще в родильном зале.
- В течение первых 2 месяцев ребенок обычно получает пищу через 3 часа, то есть кормят 7 раз в сутки: 6.00. 9.00. 12.00. 15.00. 18.00. 21.00 и 24.00. После этого продолжается ночной перерыв - 6 часов.
- На 2-4 месяцах жизни малыш начинает получать грудное молоко через 3,5 часа, т.е. 6 раз в сутки: 6.00, 9.30, 13.00, 16.30, 20.00 и 23.30. Ночной перерыв - 6,5 часов.
- С 4-месячного возраста, когда вводится прикорм и до конца I года жизни интервал между кормлениями увеличивается до 4 часов и ребенок принимает пищу 5 раз в сутки: 6.00, 10.00, 14.00, 18.00 и 22.00. Ночной перерыв - 8 часов.

Расчет необходимого объема пищи, принимаемой в возрасте 7-10 дней

- Формула ТУРА:

$V = n \times 70$ (масса тела новорожденного менее 3 200 г)
или $n \times 80$ (масса тела новорожденного более 3 200 г),

где V - суточный объем пищи, n - возраст ребенка в днях.

- Формула ЗАЙЦЕВ, применяется до 8 дня жизни:

$V = 2\%$ массы тела при рождении $\times n$ (обозначения те же).

- Объем молока на одно вскармливание в среднем $= 10 \times n$ (обозначение то же).

- Расчет объема молока (в мл) на 1 кормление, исходя из функциональной емкости желудка:

$3 \text{ мл} \times n \times \text{массу тела (кг)}$ (обозначение то же)

Расчет необходимого объема пищи, принимаемой в старшем возрасте

- *Объемный метод расчета суточного объема пищи ребенку грудного возраста*
- *7-10 дней-2 месяца - $1 / 5$ от массы тела*
- *2 - 4 месяца - $1 / 6$ от массы тела*
- *4-6 месяцев - $1 / 7$ от массы тела*
- *6 -12 месяцев - $1 / 8$ от массы тела (общий объем пищи не должен превышать 1 литр)*

Расчет необходимого объема пищи, принимаемой в старшем возрасте

■ *калорийный метод МАСЛОВА*

- $$V = A \times B \times 1\,000 / C$$
- где А - возрастные потребности в ккал / кг м.т.;
- В - фактическая масса тела ребенка (кг); С - калорийность 1 л женского молока
- Возрастные потребности ребенка грудного возраста в энергии
- 1-3 месяца -120 (125) ккал / кг
- 4-6 месяцев - 115 ккал / кг
- 7-9 месяцев 110 ккал / кг
- 10 - 12 месяцев 100 (105) ккал / кг

1л (= 1 000 мл) женского молока в среднем составляет 700 ккал

Введение прикорма

- Прикорм - это постепенная замена материнского молока приготовленной пищей.
- Необходимость прикорма обоснована следующим:
 - постепенно количество молока у матери уменьшается; в грудном молоке достаточно для нормального развития ребенка количество белков, жиров, углеводов есть только до 4-5 месяцев малыша;
 - в продуктах растительного происхождения являются минеральные вещества, потребность в которых к концу первого полугодия увеличивается;
 - для правильного функционирования желудочно-кишечного тракта нужна клетчатка, которой нет в материнском молоке;
 - жевания во время прикорма - один из факторов правильного развития аппарата речи;
 - благодаря прикорму ребенок постепенно приучается к приготовленной пище и отвыкает от материнского молока.

Глобальная стратегия ВОЗ / ЮНИСЕФ по кормлению детей грудного и раннего возраста

- Дети грудного возраста особенно уязвимы во время переходного периода, когда начинается прикорм.
- Прикорм должен быть :
 1. Своевременным — когда потребность в энергии и питательных веществах превышает то, что может дать грудное молоко.
 2. Адекватным — с достаточным количеством энергии, белков и микроэлементов .
 3. Безопасным - чтобы готовился и хранился в гигиенических условиях и кормление производилось чистыми руками из чистой посуды.
 4. Правильным — ребенка кормят в соответствии с его запросами и признаками насыщения, а частота и метод приема пищи — при активном поощрении ребенка даже во время болезни к ее потреблению руками, ложкой или самостоятельно — соответствуют данному возрасту.

Согласно приказа МОЗ Украины № 149 от 20.03.2008г. "Про утверждение Клинического протокола медицинского наблюдения за здоровым ребёнком до 3 лет" определена ориентировочная схема введения продуктов и блюд прикорма

у детей первого года жизни:

- - сок (фруктовый, ягодный, овощной) - 6 мес
- фруктовое пюре - 6 мес
- 1й прикорм: овощное пюре - 6 мес
- 2й прикорм: молочно-крупяная каша - 6-7 мес
- молочно-злаковая каша - 7-8 мес
- 3й прикорм: кисло-молочные продукты - 8-9 мес
- сыр - 6,5-7,5 мес
- яичный желток - 7-7,5 мес
- мясное пюре - 6,5-7 мес
- рыбное пюре - 8-10 мес
- растительное масло - 6 мес
- сливочное масло - 6-7 мес
- хлеб пшеничный - 8-9 мес

I прикорм

- вводится обычно **в 6 месяцев.**
- большинство детей первого прикорма получают в виде **овощного пюре.**
- Общие правила введения прикорма
 - С 4-х месяцев ребенок переводится на 5-разовое вскармливания (через 4 часа), и на втором кормлении, т.е. в 10 часов, дается первый прикорм;
 - первый раз приготовленная пища дается перед кормлением грудью, при этом нужно дать небольшое количество смеси - 15-20 мл, после чего докормить малыша материнским молоком, потом в течение суток следует наблюдать за тем, как ребенок отреагировала на новую пищу, какой у нее стул, состояние кожных покровов;
 - при отсутствии нарушений, на второй день можно дать малышу 50 мл прикорма и докормить грудным молоком;
 - на третий день малыш получает 70-80 мл приготовленной пищи и необходим, но еще меньше, объем материнского молока, и т.д. ежедневно увеличивать объем прикорма и уменьшать количество молока;
 - в течение 1-2 недель одно кормление полностью заменяется **Первым прикормом;**

I прикорм

- прикорм нужно давать ложечкой, а не через соску, так как ребенок, легко сосав пищу из бутылочки, может отказаться от материнской груди, сосание которых требует более значительных усилий;
- приготовленная пища должна быть гомогенной;
- по консистенции постепенно пищу жидкую нужно заменить густой, которая приучает ребенка к жеванию;
- в целом, полное введения первого прикорма занимает один месяц.
- При даче первого прикорма в виде овощного пюре первый раз блюдо обычно готовится из картофеля (варится на воде, лучше на овощном отваре, для приготовления гомогенной массы можно добавить немного кипяченого коровьего молока).
- Потом мама постепенно через 3-5 дней добавляет к **картофелю** по одному виду другие овощи - **морковь, капусту**, кабачки, тыква, свекла, шпинат, спаржа, зеленый горошек, томаты.
- Соотношение картофеля, моркови, капусты = 2:1:1. Картофель должен составлять не более $\frac{1}{2}$ общего объема блюда.

II прикорм

- вводится примерно **в 6-7 месяцев**
- в виде **молочной каши**, наиболее рациональными считаются такие злаки: **рис, гречка, кукуруза**
- Манную и овсяную кашу ребенок получает позже, после адаптации к предыдущим кашам
- II прикорм постепенно в течение недели заменяет четвертое кормление, т.е. в 18.00
- правила приготовления и постепенное введение каши:



в течение первой недели ребенок получает 5 % кашу, сваренную на половинном молоке, то есть половина жидкости - это молоко, а вторая половина - это вода, или, еще лучше, овощной отвар;

- потом на второй - четвертой неделе 5% каша постепенно заменяется на 8-10% кашу (на половинном молоке), после чего 10% каша варится на цельном молоке и к ней добавляется 3% сливочного масла и 5% сахара;

- в целом на привыкание ребенка к одному виду злака тоже уходит 1 месяц.



III прикорм

- Вводится в рацион питания *на 8-9 месяцев.*
- Малыш получает III прикорм в 18.00. *в виде кефира.*
- Кроме того, с 8 месяцев в рацион вводятся сухарики, печенье (количество постепенно увеличивается от 3-5 г до 10-15 г в конце 1 года жизни). Далее ребенок получает хлеб пшеничный - соответственно с 5 г до 10 г. Конечно мучные изделия размягчаются в бульоне.



Введение соков и пюре

- Фруктовые и овощные соки, как источники витаминов, минеральных веществ, микроэлементов, показаны ребенку с целью:
 - профилактики гиповитаминоза, рахита и анемии;
 - положительного влияния на секреторную и моторную функции органов пищеварения;
 - благоприятного воздействия на микрофлору кишечника.



Правила применения соков:

- ребенок впервые получает сок в 6 месяцев; прием сока начинается с нескольких капель в день. При нормальной реакции ребенка количество капель постепенно увеличивается, достигая 5 - 10 мл, и к концу 6-го месяца ребенок за день принимает 20 мл сока в дальнейшем объем сока увеличивается ежемесячно, максимальный объем сока до конца 1 года - 100 мл;
- когда суточное количество сока невелика, ребенок может принять его за 1 раз, в дальнейшем - в течение 2-3 раз в день;
- соки лучше готовить в чистом виде перед употреблением (выдавливание из фруктов, овощей);
- на территории Европы начинают с яблочного сока. После этого дают вишневый, черносмородиновый, морковный, сливовый

Правила применения соков:

- соки нужно давать сразу или через 1-1,5 часа после еды - в их составе есть сахар может снизить аппетит;
- не рекомендуется одновременно давать смешанные соки из различных фруктов и овощей;
- введение сока начинается с одного вида фруктов, так как в случае аллергической реакции можно будет установить ее генез, на привыкание уходит не меньше 1, иногда 2-3 месяца;
- затем постепенно вводятся другие фруктовые соки; после привыкания, в течение дня лучше давать разные соки;
- при отсутствии свежих фруктов и овощей можно использовать консервированные соки;
- объем сока не относится к необходимому суточному объему пищи

Фруктовое пюре

- Через 2-4 недели после введения сока ребенку необходимо ввести фруктовое пюре. Обычно начинают с яблочного. Приучив к нему, готовят пюре из других фруктов.
- Постепенно количество пюре увеличивается с 1 / 2 - 1 чайной ложки до 30-50 г и на конец года составляет 100 г.
- Полученное малышом пюре учитывается до необходимого суточного объема пищи



Другие дополнительные пищевые добавки

- Яичный желток впервые дается ребенку в 7-7,5 месяцев вместе с продуктами прикорма, через день. Доза постепенно увеличивается с 1 / 5 до 1 / 2 части
- Яичный желток противопоказан детям с экссудативно-катаральным диатезом, а также в случае аллергической реакции на желток.
- Сыр, как источник белков, ребенок получает с 6,5-7,5 месяцев. Дневная доза постепенно увеличивается с 10 г до 50 г (в конце 1 года жизни).

Яичный желток, шт.

В 7,0 - 7,5 мес. - $1/8$ - $1/4$

в 8 мес. - $1/4$ - $1/2$

в 9 мес. - $1/2$

В 10-12 мес. - $1/2$ -1



News.city.zt.ua

Творог, г

В 6,5 – 7,5 мес. - 5-25

В 7 мес. - 10-30

В 8 мес. - 30

В 9 мес. – 30

В 10-12 мес. - 50



Мясное пюре, г

■ С 6,5-7 месяцев в кормление вводится мясной фарш (из курицы, свинины, говядины). Начиная с небольших порций - 5г, постепенно увеличивается разовый прием фарша до 20 - 30г.

в 6,5 - 7 мес. - 5-30

в 7 мес. - 30

В 8 мес. - 50

В 9 мес. - 50

В 10-12 мес. 50-60



Рыбное пюре, г

С 8-10 месяцев ребенку 1-2
раза в неделю
вместо мяса можно
рекомендовать
рыбный фарш.

В 8 мес. - 10-20

в 9 мес. - 30-50

в 10-12 мес. - 50-60



Растительное масло, г, сливочноемасло, г

в 6 - 7 мес. - $\frac{1}{2}$ ч.л.

в 7 мес. - $\frac{1}{2}$ ч.л.

В 8 мес. - 1 ч.л.

в 9 мес. - 1 ч.л.

в 10-12 мес. — 1 ч.л.




Хлеб пшеничный, г, печенье, г

В 8 мес. - 5

В 9 мес. - 5

в 10 - 12 мес. - 10



Возраст (месяцев)	6	6.5	7	8	9	10-12
Продукты						
Овощное пюре мг.	10-50	60-100	150	170	180	200
Растительное масло мл.	1-3	3	3	5	5	6
Фруктовое пюре мг.	-	5-30	30-50	60-70	70-80	90-100
Фруктовые соки мл.	-	-	5-50	60-70	70-80	90-100
Творог мг.	-	-	10-20	30-40	40	50
Молочная каша мг.	-	-	50-70	100-120	130-160	200
Мясное пюре мг.	-	-	5-30	30-50	50	60-70
Сухари и печенье мг.	-	-	1-3	3-5	7	10-15
Желток мг.	-	-	-	0.25	0.5	0.5
Кисломолочные продукты мл.	-	-	-	100-200	200	400-600
Сливочное масло мг.	-	-	-	1-4	5	6
Пшеничный хлеб мг.	-	-	-	-	5	10

Примерный рацион питания ребенка 9 месяцев

Часы кормлений	Продукты	Объем, г, мл
6.00	Грудное молоко	200
10.00	Каша гречневая 10%	150
	Яичный желток	½ шт.
	Пюре из абрикос	70
14.00	Суп овощной на мясном бульоне	30
	Сухарик	5
	Овощное пюре	130
	Мясные фрикадельки или мясное пюре	40
	Сок томатный	20
18.00	Творог	40
	Кефир	150

Рецепты отдельных блюд

1) Каша манная 5%-ная:

В кипящую слегка подсоленную воду(или овощной отвар) тонкой струйкой всыпать просеянную манную крупу; варить на слабом огне при помешивании 15-20мин., добавить горячее молоко, сахарный сироп и довести до кипения.

Ингредиенты: Манная крупа-5г., молоко-50мл., овощной отвар(вода)-80мл., сахарный сироп-3мл.

2) Каша манная 10%-ная:

Вскипятить воду(или овощной отвар) с половиной порции молока, всыпать просеянную манную крупу; варить на слабом огне при постоянном помешивании 15-20мин., немного посолить, добавить сахарный сироп, оставшееся подогретое молоко, довести до кипения. В готовую кашу добавить сливочное масло.

Ингредиенты: Манная крупа-10г., молоко-100г., овощной отвар(вода)-25мл., сахарный сироп-3г., масло сливочное-3г.

Искусственное вскармливание



Классификация молочных смесей, которые используются для докармливания младенцев при смешанном вскармливании:

1. Адаптированные:


- Сладкие: "Малютка", "Малыш", "Детолакт", "Виталакт", "Симилак", "Енфамил" (США), "Пилти", "Бона", "Тутели" (Финляндия), "НАН", "СМА", "Нутрилон" и др.
- Кислые: ацидофильная "Малютка", ацидофильный "Малыш", "Белбобек", ацидофильный "Виталакт" и др.



Неадаптированные (простые):

- 1) Сладкие: смесь №2 (Б), смесь №3 (В), "Крепыш", "Здоровье" и др.
- 2) Кислые: А-кефир, Б-кефир, В-кефир, "Биолакт", "Мацони", "Нахлынет", "Балдырган" и др.
- Следует помнить, что неадаптированные смеси не могут удовлетворить оптимальное физическое и интеллектуальное развитие ребенка, требуют постоянной коррекции в белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных веществах. Это вынужденный вид докармливания (родители не имеют возможности купить адаптированные смеси, а государство не помогает им в этом).

Базисные (стандартные) формулы:



- это адаптированные по всем пищевым компонентам сухие молочные смеси, максимально приближенные к грудному молоку по пищевой, биологической ценности и осмолярности. Они содержат все необходимые пищевые добавки (таурин, L-карнитин, лецитин и т.д.), которые имеют особенно важное значение для развития ребёнка от 0 до 12 месяцев.

Стартовые (начальные) формулы от 0 до 6 месяцев:

«Начальные» смеси, № «1», по составу максимально приближены к грудному молоку и соответствуют особенностям обмена веществ и процессов пищеварения детей этой возрастной группы. Они содержат большинство сывороточных белков, таурин, нуклеотиды, ДЛПНЖК, L-карнитин. Сахарозу и фруктозу в «начальные» смеси вводить не рекомендуется, учитывая их высокую сладость, нагрузку на инсулярный аппарат поджелудочной железы. Осмолярность продукта (белково-минеральная нагрузка на почки) должна быть в пределах 260-300 мОмл/л, учитывая незрелую выделительную систему малыша.



Последующие формулы:



- - это смеси, которые рекомендуются детям старше 6 мес;
- Это частично адаптированные смеси, которые готовятся без добавления белков и молочной сыворотки. Пищевая и энергетическая ценность этих смесей выше, чем базисных, кроме лактозы они содержат сахарозу и крахмал.

Специальные (лечебные)

Это смеси, не содержащие лактозы, соевого белка, имеют антирефлюксное действие и т.д.)



ЛАКТАЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Основные симптомы:

- *разрежен пенистый стул с кислым запахом*
- *боли в животе*
- *Метеоризм*

При анемии: «Энфамил с железом», «Семилак с железом», «Нутрилон - 2».

При непереносимости белка коровьего молока: «Нутри-соя», «Алсоя», «Детолакт-соя».


При фенилкетонурии: «Лофеналак», «Фенил-Фри».

При рвоте, срыгиваниях: «Нутрилон - антирефлюкс», «Нутрилон - комфорт»



специализированные «нестандартные» смеси

- Которые предназначены для вскармливания детей, которые родились недоношенными или имеют малый вес при рождении. В их названии используется приставка «пре». В них должны преобладать сывороточные белки, часть которых подвержена гидролизу, а в состав жирового компонента входят среднецепочные триглицериды. Углеводный компонент, кроме лактозы, содержит декстринмальтозу. Такие особенности белкового, углеводного та жирового компонентов смесей облегчают их усвоение в условиях сниженной ферментативной активности пищеварительного тракта. Обязательными компонентами смесей для недоношенных детей являются таурин и L-карнитин.



Для недоношенных детей и детей с гипотрофией:

- ***Нутрилон- преждевременный уход***
- ***Нутрилон- сытый малыш***
- ***Пренан***



Основные принципы адаптации состава молочных смесей (рекомендации ВОЗ, CODEX STAN 72-19, директива комиссии ЕС)

- **уменьшение общего количества белка**
- **оптимизация белкового и аминокислотного состава (добавление сывороточных белков и таурина)**
- **повышение уровня жиров и углеводов**
- **оптимизация жирнокислотного и углеводного состава**
- **уменьшение количества кальция, калию, натрию**
- **обогащение комплексом витаминов, минеральных солей и микроэлементов**
- **увеличение количества бифидогенных и защитных факторов**
- **введение холина, карнитину, инозитола и других биологически активных соединений**

- Соотношение $Sa : P$ должно быть 1.2-2.0
- Энергетическая ценность: минимум— 60ккал/100мл; максимум -75ккал/100мл
- Белок: минимум-1.8г/100ккал; максимум — 3.0г/100мл
- Жиры: минимум — 3.3г/100мл; максимум -6.4г/100мл
- линолевая кислота(в форме глицероидов=линолеатов) минимум -300мг/100мл; максимум - 1200мг/100мл
- Углеводы 7.0г-14.0г/100ккал. Могут быть использованы следующие углеводы
 - Лактоза (минимум 3.5г, максимум не указано);
 - Мальтоза;
 - Сахароза (максимум 20% от общего количества углеводов);
 - Мальто-декстрины;
 - Сироп на основе глюкозы или порошковый сироп на основе глюкозы;
- Предварительно приготовлен крохмал (без клейковины) в количестве не больше 2г/100мл и 30% от общего содержания углеводов



Таурин

свободная аминокислота, которая содействует развитию клеток головного мозга и зрительного анализатора, имеет мембраностабилизирующую и антиоксидантную функцию

L-карнитин

обеспечивает высокую усвояемость жирных кислот

Лецитин

способствует эмульгации жиров и их всасыванию в полости кишечника



Биотин

водорастворимый витамин группы В, способствует нормализации метаболизма жиров и белков, уменьшает проявления экземы

Холин

нормальное функционирование мозга

Инозитол

предотвращает жировую дистрофию печени, имеет позитивное влияние на головной мозг

Показания к смешанному вскармливанию

- 1) Недостаток молока у матери;
- 2) Некоторые заболевания матери, когда нет нужды отнимать ребёнка от груди, но желательно уменьшить число кормлений;
- 3) Социальные факторы, когда мать в связи с работой или другими причинами должна отлучаться из дома, а количество сцеженного молока не позволяет полностью удовлетворить потребности ребёнка;
- 4) Значительно реже- при некоторых патологических состояниях, которые требуют ограничения объёма получаемого ребёнком грудного молока(эритродермия, тяжёлые и упорные проявления экссудативного диатеза и т.п.).

Спасибо за внимание!

