


The background of the image is a dense, overlapping field of green, spiky, spherical particles, resembling viruses or bacteria. These particles have various shapes, some with long, thin spikes and others with shorter, thicker ones. They are set against a plain white background. The text is centered over this field.


Инфекционные заболевания передаваемые половым путём

Инфекционные заболевания, передающиеся от человека к человеку преимущественно половым путем - **ЗППГ** или **БППП** (болезни, передаваемые половым путем), встречаются часто, особенно в последние годы. В настоящее время насчитывается более 20 возбудителей болезней, передающихся половым путем, в том числе бактерии, вирусы, простейшие, дрожжевые грибы, членистоногие.



Наиболее частые заболевания

- 1) Сифилис
- 2) СПИД
- 3) Гонорея




- В России за последние 6 лет, к примеру, заболеваемости сифилисом возросла в 40 раз,
- Причём катастрофический рост отмечен среди детей и подростков – в 45 раз увеличилось число случаев врожденного сифилиса.

- Сифилис
Сифилис относят к классическим заболеваниям, передающимся половым путем (венерическим болезням). Возбудитель – бледная трепонема (*Treponema pallidum*). Сифилис характеризуется медленным прогрессирующим течением. На поздних стадиях он может приводить к тяжелым поражениям нервной системы и внутренних органов.

- Заражение сифилисом

В большинстве случаев заражение сифилисом происходит при половых контактах. Наиболее заразны больные первичным сифилисом (с язвами на половых органах, во рту или в прямой кишке). Кроме того, возможна передача инфекции от больной матери плоду во время беременности, а также заражение при попадании крови.



Признаки заболевания

- Проявляются только через 3-4 недели после заражения. На месте внедрившейся инфекции образуется плотная ссадина или язва – твёрдый шанкр.
- Через 1-2 месяца на коже появляется сыпь, которая пропадает и появляется вновь. Затем могут начаться головные боли и боли в костях. В запущенных случаях поражается нервная ткань спинного мозга, теряется чувствительность ног, проваливается нос, поражаются зубы, появляются тяжёлые поражения кожи и внутренних органов. Сифилис передаётся по наследству.

Гонорея

- **Гонорея** – это Инфекция передающаяся при половых контактах, а также через вещи, принадлежащие больному человеку. Поэтому недопустимо пользоваться чужими трусами, колготками, мочалками, так через эти можно заразиться гонореей и другими венерическими заболеваниями.

Признаки заболеваний

- Заболевания являются гнойными выделениями из половых органов и сильная резь при мочеиспускании. Гнойные выделения заметны утром, после сна. Инфекция распространяется и захватывает мочевой пузырь, почки, а также внутренние половые органы. Иммунная память на это заболевание также отсутствует.

СПИД

- Спид – вызывается вирусом, поражающим Т- лимфоциты иммунной системы человека. Вирус попадает в здоровую клетку и встраивается в её генный аппарат. Клетка начинает продуцировать отдельные части вирусов.

- Человек заболевший СПИДом, теряет способность бороться с любой инфекцией и раковыми перерождениями собственных клеток. Организм фактически становится беззащитным и гибнет либо от раковых заболеваний, либо от инфекций, чаще легочных.
- Знай: Инфицирование Вирусом Иммунодефицита Человека возможно только тремя путями – половой путь, кровь – кровь, мать – дитя.

- СПИД передаётся от больного человека здоровому при половых контактах и при попадании его непосредственно в кровь. Например при использовании нестерильного шприца.
- **Знай:** Инфицирование ВИЧ в быту НЕВОЗМОЖНО

Меры предосторожности

- Презервативы являются надежным средством защиты от инфекций, которые передаются половым путем. И хотя контрацептивы полностью не защищают от заражения, они значительно снижают риск попадания инфекции на половые органы. Приобретать презервативы следует в аптеках, чтобы обезопасить себя от использования некачественного продукта.

