

Микробиология с основами вирусологии

1. История и развитие микробиологии
2. Морфология бактерий
3. Строение бактериальной клетки


История и развитие микробиологии

Объекты изучения микробиологии



Описательно- морфологический период

Галилео Галилей




Создал в 1610 г.
первый микроскоп

Антони ван Левенгук




В 1676 г. впервые
увидел бактерии в
капле воды

Физиологический период



Луи Пастер
1822-1895

- 1857 - Брожения
- 1860 - Самопроизвольное зарождение
- 1865 - Болезни вина и пива
- 1868- Болезни шелковичных червей
- 1881- Зараза и вакцина
- 1885 - Предохранение от бешенства



Роберт Кох

1843-1910

- Получение чистых культур.
- Окраска бактерий.
- Открыл возбудителей болезней:
 - 1877 – сибирской язвы
 - 1882 – туберкулеза («палочка Коха»)
 - 1883 – холеры
- 1905 – Нобелевская премия за исследование туберкулеза.


Открытие вирусов



**Ивановский Дмитрий
Иосифович**
1864 – 1920

В 1892 г. обнаружил
вирус табачной мозаики.

В 1898 г. независимо ВТМ был
описан М. Бейеринком.



Экологический период




- Основатель экологической микробиологии.
- Открыл хемолитоавтотрофные бактерии.
- Открыл процесс фиксации азота.

Виноградский С.Н.
1856-1953

Биотехнологический период

Открытие пенициллина



**Александр
Флеминг**
1881-1955



Ховард Флори
1898-1968



Эрнст Чейн
1906-1979





Гриб *Penicillium*
подавляет рост
Staphylococcus

Ермольева Зинаида Виссарионовна
(1898-1974) – микробиолог, академик АМН



- Изучение возбудителей холеры и методов борьбы с ними.
- Получение первых образцов отечественных антибиотиков: пенициллина (1942), стрептомицина (1947), тетрациклина и др.
- Получение интерферона.

Молекулярно-генетический период



Paul Naim Berg (1926)

Почётный профессор
Стэнфордского
университета, лауреат
Нобелевской премии по
химии


- Stanford University, CA
- Впервые создана рекомбинантная молекула ДНК

Отрасли микробиологии

- **Общая микробиология**
- **Водная микробиология**
- **Почвенная микробиология**
- **Медицинская, ветеринарная микробиология**
- **Сельскохозяйственная микробиология**
- **Космическая микробиология**
- **Геологическая микробиология**
- **Промышленная микробиология (биотехнология)**
- **Генетика микроорганизмов**


Морфология бактерий

Размеры микроорганизмов




Нанобактерии

1988 - Роберт Фольк, геолог Техасского университета, обнаружил при исследовании минералов горячих сернистых источников в окрестностях Рима





Клетки бактерий и агрегаты нанобактерий

Нанобактерии в осадочных породах



Кокки





Палочки



Извитые формы







Нитчатые бактерии



Ветвящиеся бактерии



Бактерии необычной формы




МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВКА

Направлена на повышение выживаемости видов.


Функции специализированных клеток:

- переживание в неблагоприятных условиях
- фиксация азота из атмосферы
- размножение



эндоспоры

гетероцисты




Строение бактериальной клетки

Сопоставление прокариотной и эукариотной клеточной организации (по Гусеву, Минеевой, 2001)


Признак	Прокариоты	Эукариоты
Организация генетического материала	• нуклеоид • ДНК не отделена от цитоплазмы • хромосома одна кольцевая	• ядро • ДНК отделена от цитоплазмы • больше одной хромосомы
Митоз и мейоз	-	+
ДНК	в нуклеоиде и плазмидах	в ядре и органеллах
Органеллы	-	+
Рибосомы	70S	80S
Пептидогликан	+ или -	-
Строение жгутиков	белковые субъединицы	набор микротрубочек

Строение бактериальной клетки



- Наружные структуры
- ЦПМ
- Цитоплазма

Капсулы и слизистые слои




Thiocapsa

Чехлы





Leptothrix



Sphaerotilus

Клеточная стенка грамположительных бактерий





Структура пептидогликана

1, 2 - полимеризация гликанового остова молекулы


3 - присоединение тейхоевой кислоты

4, 5 - связывание между цепями с помощью пептидных мостиков

6 - связывание с липопротеином наружной мембраны

7 - место действия лизоцима

Клеточная стенка грамотрицательных бактерий



Прокариоты без клеточной стенки

Протопласты — полностью лишены клеточной стенки.



Сферопласты — частично лишены клеточной стенки.

Отличия сферопластов от протопластов:

- Адсорбируют фаги
- Могут размножаться
- Реверсируют в исходную форму


Общие свойства:

- Большие размеры
- Отсутствие мезосом
- Чувствительность к осмотическим условиям




L-формы бактерий –
полностью или частично
лишены пептидогликана.

Образуются при
антибиотикотерапии.



Стадии образования L-форм
у *Bacillus subtilis*



Колонии L-форм
бактерий (яичница)

Функции клеточной стенки

1. Стабилизирующая:

- поддержание формы клетки

2. Защитная:

- воздействия окружающей среды
- внутреннее осмотическое давление
- проникновение токсических веществ и антибиотиков

3. Транспортная:

- транспорт веществ и ионов внутрь клетки
- выведение метаболитов


4. Ферментативная:

- содержит гидролитические ферменты


5. Рецепторная:

- содержит специфические рецепторы и антигены


Жгутики



Перитрих




Политрих



Монотрих

Фимбрии, пили



- F-пили необходимы клетке-донору для контакта с реципиентом.
- По конъюгационному тоннелю происходит передача ДНК.




Конъюгация бактерий

Мембранные структуры

Цитоплазматическая мембрана (ЦПМ)

Мезосомы (впячивания)

Фотосинтетические мембраны





- **Карбоксисомы** – содержат фермент фиксации CO_2 – рибулзодифосфаткарбоксилазу.
- **Газовые вакуоли** (аэросомы) – являются регуляторами плавучести бактерий.



- **Магнитосомы** – частицы Fe_3O_4 , окруженные мембраной.

Генетический аппарат прокариот

ДНК прокариот –
«нуклеоид» или
«бактериальная
хромосома»




Длина молекулы – 1 мм и более.
Диаметр нитей – около 2 нм.
Молекулярная масса – $1-3 \times 10^9$ Да.

Внехромосомные элементы

- **Плазмиды** — кольцевые молекулы ДНК, способные к независимой репликации.

Содержат дополнительные гены:

- устойчивости к антибиотикам,
- устойчивости к тяжелым металлам,
- разрушения пестицидов,
- фиксация азота (nif-гены)



- **Транспозоны** — мобильные сегменты ДНК, неспособные к автономной репликации. Могут мигрировать из одной части хромосомы в другую, или в плазмиды.