ОДНОАТОМНЫЕ СПИРТЫ

Работу выполнила : Большакова С.Э., ХМб-45

Гидроксисоединения – это органические вещества, молекулы которых содержат, помимо углеводородной цепи, одну или несколько **гидроксильных групп OH**

Спирты – это гидроксисоединения, в которых группа OH соединена с **алифатическим углеводородным радикалом R-OH**

Общая формула: $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}$

КЛАССИФИКАЦИЯ

1. По числу гидроксильных групп

2. По числу углеводородных радикалов у атома углерода при гидроксильной группе

КЛАССИФИКАЦИЯ

3. По строению углеводородного радикала

НОМЕНКЛАТУРА

По систематической номенклатуре к названию углеводорода добавляют суффикс «-Ол» и цифру, указывающую номер атома углерода, к которому присоединена гидроксильная группа

Нумерация ведется от ближайшего к ОН-группе конца цепи

Метанол

Этанол

Пропанол-1

Пропанол-2

По радикально-функциональной номенклатуре названия спиртов составляют от названий углеводородных радикалов, соединенных с группой ОН, с добавлением слова «спирт»

Например: CH_3OH – метиловый спирт, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ – этиловый спирт и т.д

НОМЕНКЛАТУРА

В названиях многоатомных спиртов количество групп OH указывают суффиксами **-диол** в при наличии двух OH-групп, **-триол** при наличии трех OH-групп и т.д. После этого добавляют номера атомов углерода, связанных с гидроксильными группами

Например, пропандиол-1,2

бутен-3-ол-2
пропиленгликоль

ИЗОМЕРИЯ СПИРТОВ

1. Для спиртов характерна **структурная изомерия**

– изомерия углеродного скелета

Бутанол-1

2-Метилпропанол-1

– изомерия положения гидроксильной группы

Пропанол-1

Пропанол-2

ИЗОМЕРИЯ СПИРТОВ

– межклассовая изомерия

Например: межклассовые изомеры с общей формулой C_2H_6O :

Этиловый спирт

Диметиловый эфир

2. Пространственная изомерия – оптическая

L, R бутанол -2

зеркало

D, S бутанол -2

ГОМОЛОГИЧЕСКИЙ РЯД СПИРТОВ

Молекулярная формула	Полуструктурная формула	Название ОЛ (-овый спирт)
CH_3OH	$\text{CH}_3\text{-OH}$	Метанол
$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$	Этанол
$\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$	$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH}$	Пропанол
$\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$	$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH}$	Бутанол
$\text{C}_5\text{H}_{11}\text{OH}$	$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH}$	Пентанол

СТРОЕНИЕ СПИРТОВ

нуклеофильный и
основной центры

$-I(\text{OH})$

β -СН-кислотный
центр

электрофильный
центр

ОН-кислотный
центр

Связи $\text{O}-\text{H}$ и $\text{C}-\text{O}$ являются ковалентными
полярными

ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ

Температуры кипения некоторых спиртов

Название вещества	Температура кипения, °C
Метанол	64
Этанол	78
Пропанол-1	92
Бутанол-1	118
Этиленгликоль	196

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Все алканолаы легче воды, бесцветны

Низшие спирты имеют характерный алкогольный запах и жгучий вкус

CH_3OH – метанол (древесный спирт) - **очень ядовит!**

Сравнение физических свойств спиртов и углеводородов

<i>Спирт Углеводород</i>	<i>Молекулярная масса</i>	<i>$T_{пл}$ °С</i>	<i>$T_{кип}$ °С</i>	<i>Растворимость в 100 мл воды, мл</i>
CH_3OH	32	-98,0	65,0	Неограниченная
CH_3-CH_3	30	-172,0	-89,0	4,7
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$	45	-117,3	78,5	Неограниченная
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$	44	-189,9	-42,2	6,5
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	60	-127,0	97,2	Неограниченная
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	58	-135,0	-0,6	15,0

ПОЛУЧЕНИЕ

1. Гидролиз галогеналканов – под действием водных растворов щелочей

2. Гидратация алкенов в присутствии минеральных кислот

3. Гидрирование карбонильных соединений

4. Восстановление эфиров карбоновых кислот

5. Гидролиз простых и сложных эфиров карбоновых кислот

6. Синтез с помощью реактива Гриньяра

7. Из галогеналканов путем магний-органического синтеза

Иодистый
метил

Метилмагний
иод

8. Окислением алюминийорганических соединений

Триметилалюминий

9. Из первичных аминов

10. Промышленное получение метанола из «синтез-газа»

11. Получение этанола спиртовым брожением глюкозы

КИСЛОТНЫЕ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Теории кислот и оснований:

- теория электролитической диссоциации (Аррениус)
- протолитическая теория (Бренстед-Лоури)
- теория Льюиса

Теория Бренстеда – Лоури (1923 г.)

Й.-Н. Брэнстед
1879—1947

Кислота – нейтральная молекула или ион, способная отдавать протон (H^+), т.е. **донор** протона.

Основание – нейтральная молекула или ион, способная присоединить протон, т.е. **акцептор** протона.

Т. М. Лоури
1874—1936

Сопряженные кислотно-основные пары

Кислота $\rightleftharpoons \text{H}^+$ + Сопряженное основание

Основание + H^+ $\rightleftharpoons$ Сопряженная кислота

кислоты

сопряженные основания

основания

сопряженные кислоты

Теория Льюиса (1925 г.)

кислоты - это вещества, способные принимать электронную пару (акцептор электронной пары), а основания - вещества, способные давать электронную пару (доноры электронной пары)

Джилберт Ньютон Льюис
23 октября 1875 г. – 23 марта 1946 г.

К кислотам Льюиса относятся не только протон H^+ , но и все катионы, а также галогениды металлов 2 и 3 групп таблицы Менделеева: AlX_3 , FeX_3 , BX_3 , SbX_5 , SnX_4 , ZnX_2 ($X=F, Cl, Br, I$).

К основаниям Льюиса - все анионы OH^- , OR^- , CH_3COO^- , NH_2^- и т.д. и нейтральные соединения, имеющие неподеленные электронные пары или π -связи - H_2O , ROH , ROR , $RCH=O$, RSH , NH_3 , R_3N , $RCH=CH_2$, $R-C_6H_5$ и др.

Факторы, определяющие кислотность

Сила кислоты определяется

стабильностью сопряженного этой кислоте основания (аниона)
(чем стабильнее анион, тем сильнее кислота)

Природой и зарядом атома в кислотном центре
(электроотрицательностью и поляризуемостью атома, отдающего протон)

природа атома в кислотном центре

заряд атома в кислотном центре

Возможностью стабилизации аниона (за счет сопряжения или характера органического радикала, связанного с кислотным центром);

Способностью аниона к сольватации
(т.е. взаимодействию с растворителем)

Факторы, определяющие основность

Их влияние, как правило, противоположно, влиянию факторов, определяющих кислотность

Изменение донорноакцепторных свойств органического радикала

Электроноакцепторные (ЭА) заместители понижают основность,
электронодонорные (ЭД) – повышают основность

КОНЦЕПЦИЯ ПИРСОНА

Жесткие кислоты более легко и с образованием более прочных связей реагируют с жесткими основаниями, а мягкие кислоты - с мягкими основаниями

Жесткие и мягкие кислоты и основания

Жесткие	Промежуточные	Мягкие
<i>Кислоты</i>		
H^+ , Li^+ , Na^+ , K^+ , Be^{2+} , Mg^{2+} , Ca^{2+} , Sr^{2+} , Sn^{2+} , Al^{3+} , Cr^{3+} , Co^{3+} , Fe^{3+} , As^{3+} , Ti^{4+} , Zr^{4+} , VO^{2+} , UO_2^{2+}	Fe^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , Cu^{2+} , Zn^{2+} , Pb^{2+}	Cu^+ , Ag^+ , Au^+ , Tl^+ , Cs^+ , Hg_2^{2+} , Pd^{2+} , Cd^{2+} , Pd^{2+} , Hg^{2+} , Tl^{3+}
<i>Основания</i>		
H_2O , OH^- , F^- , CH_3COO^- , PO_4^{3-} , SO_4^{2-} , Cl^- , CO_3^{2-} , ClO_4^- , NO_3^- , NH_3 , RNH_2 , ROH , RO^-	N_3^- , Br^- , NO_2^- , SO_3^{2-} , $C_6H_5NH_2$, C_5H_5N	RSH , RS^- , I^- , SCN^- , $S_2O_3^{2-}$, CN^-

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПИРТОВ

1. Кислотные свойства

- Взаимодействие с металлами

Спирты – неэлектролиты, в водном растворе не диссоциируют на ионы; кислотные свойства у них выражены слабее, чем у воды

Кислотные свойства одноатомных спиртов уменьшаются в ряду:

$\text{CH}_3\text{OH} >$ первичные спирты $>$ вторичные спирты $>$ третичные спирты

- Взаимодействие с ангидридами карбоновых кислот

Реакционная способность спиртов в реакциях **по СВЯЗИ О-Н:**

$\text{CH}_3\text{OH} > \text{первичные} > \text{вторичные} > \text{третичные}$

2. Основные свойства

- Взаимодействие с галогеноводородными кислотами

- Механизм $\text{S}_{\text{N}2}$

- Взаимодействие галогенидами фосфора

Реакционная способность спиртов в реакциях **по связи С-О**:
третичные > вторичные > первичные > CH_3OH

Механизмы нуклеофильного

замещения

S_{N1} – мономолекулярное нуклеофильное замещение
I стадия (лимитирующая)

II стадия

S_{N2} – бимолекулярное нуклеофильное замещение

3. Этерификация

Реакционная способность одноатомных спиртов в этих реакциях убывает от первичных к третичным

4. Реакции отщепления

• Межмолекулярная дегидратация

• Внутримолекулярная дегидратация

• Дегидрирование

а) При дегидрировании первичных спиртов образуются альдегиды

б) При дегидрировании вторичных спиртов образуются кетоны

в) Третичные спирты не подвергаются дегидрированию

5. Реакции окисления

При окислении первичных спиртов они последовательно превращаются сначала в альдегиды, а потом в карбоновые кислоты. Глубина окисления зависит от окислителя

Первичный спирт → альдегид → карбоновая кислота

Метанол окисляется сначала в формальдегид, затем в углекислый газ:

Метанол → формальдегид → углекислый газ

Вторичные спирты окисляются в кетоны:

вторичные спирты → кетоны

Типичные окислители – оксид меди (II), перманганат калия KMnO_4 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, кислород в присутствии катализатора

Легкость окисления спиртов **уменьшается** в ряду:

метанол > первичные > вторичные > третичные

- Горение (полное окисление)

- Неполное окисление

В присутствии окислителей [O]
 $-\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ или KMnO_4 спирты окисляются до
 карбонильных соединений

При окислении вторичных спиртов образуются кетоны

- Мягкое окисление** (качественные реакции)

- Жесткое окисление**

Первичный спирт

R-COOH/ R-CHO

R-COOK/ R-CHO

ПРИМЕНЕНИЕ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЯДОВИТОСТЬ СПИРТОВ

Метиловый спирт – сильный яд! Несколько граммов его, попав в организм человека, вызывает слепоту, а большее количество приводит к смерти. Поэтому метиловый спирт, используемый для технических нужд, обязательно должен носить название **метанол – яд**

Этиловый спирт (этанол) – бесцветная жидкость с характерным запахом

Спирт, содержащий 4-5% воды, называют **ректификатом**, а только доли процента – **абсолютным спиртом**. Этиловый спирт, получаемый брожением сахаристых веществ (в присутствии ферментов, например, дрожжей) называют пищевым или винным спиртом. Спирт, получаемый из глюкозы, которую получают гидролизом целлюлозы, называют **гидролизным**

Этиловый спирт – сильный наркотик

Спирт, применяемый для технических целей, специально загрязняют дурнопахнущими веществами. Такой спирт называют **денатуратом**

МЕТАБОЛИЗМ ЭТАНОЛА В ОРГАНИЗМЕ