



Кафедра: Неонатология

СӨЖ

Тақырыбы: Шала туған балалардың күтімі.

Тексерген: Адильбекова И.М

Орындаған: Алтынбек А.Б

Тобы: 12 025-02

Курс: IV

Жоспар:

I. Кіріспе.

II. Негізгі бөлім.

Шала туылған балалардың жіктелуі.

Шала туылған балалардың күтімі.

III. Қорытынды.

IV. Пайдаланылған әдебиеттер.

Шала туған балалардың халықаралық күні

Жаңа туған нәрестелердің күтімі жөніндегі Еуропалық қор мен америкалық қайырымдылық ұйымының бастамасымен 17 қараша- шала туған балалардың халықаралық күні деп аталады. Бұл мереке 2009 жылы алғаш рет халықаралық деңгейде тойланды.



Анықтамасы

2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) критерийлерін енгізді, яғни 22 аптадан басталатын жүктіліктің (салмағы 500,0г) тірі және өлі тууын тіркеуге алатын болды.



*Дене салмагының мөлшеріне байланысты
шала туған балаларды
4 дәрежеге бөледі:*



- I дәреже 2000гр-2500гр
- II дәреже-1500гр-2000гр
- III дәреже
1000гр-1500гр
- IV дәреже-1000гр төмен

Гестациондық жасына байланысты жіктелуі:

- I дәреже 37-35апта
- II дәреже 34-32
апта
- III дәреже 31-29
апта
- IV дәреже 28-22
апта



Терморегуляция



Температураны сақтау орталығының дұрыс жетілмеуіне байланысты шала туған бала тез тоңғыш және тез қызғыш болады. Шала туған баланың тоңғыш болуына теріасты майының жұқалығы, жалпы жылу бөлінудің төмендігі себеп болады. Осыны еске алып, шала туған балаға ерекше күтім жағдайын жасау керек.

Терморегуляция



1. Бөлмедегі температура 22-24 °С болуы керек.
2. Баланы 4 жөргекке орайды, жылы көрпемен жабады.
3. Баланың күтімін жылытқыш лампаның қасында өткізу керек.
4. III, IV дәрежедегі шала туған балаларды кювезге салып жылытады. Кювездің ішіндегі жағдай жатырдағы жағдайға жақын: T 32-34 °C, ылғалдығы-60-70%, әрдайым ылғалды кювезден шығармай күтім жасауға болады.
5. Кювез жоқ болса немесе баланың шалалығы I-II дәрежеде болса оны 3 жылытқышпен жылытуға болады.
6. Шала туған баланың келесі ерекшелігі тыныс алуының дамып жетілмеуі. олар 1 минутта 40-80 рет дем алады, дем алу үстірт, бір қалыпсыз, дем алуы кей кездерде тоқтап қалуы мүмкін-апноэ.
7. Бұның себебі тыныс алу орталығының дамып жетілмегендігінен ж/е дем алу органдарының анатомиялық физикалық ерекшеліктерінен.

Шала туылған баланың күтімі

Шала туылған сәбилер үйлеріне қайтаруға жарайтындай болып ширағанша емханада ұсталады. Әдетте емханада шала туылған нәрестелерді күту үшін жеке бөлме бөлінеді, оларға аса тәжірибелі медбикелер бекітіледі. Шала туылған баланы қайсыбір себептермен мамандандырылған мекемеге орналастыруға мүмкіндік болмай қалса, онда оны үй жағдайында да күтіп, ширатуға болады.





Күтімі:

- 1. Бөлмені жиі желдетіп тұру керек
- 2. Баланың бас жағын көтеріңкі жатқызу
- 3. Бос жөргектеу, немесе кювезге жалаңаш салу
- 4. Оқтын-оқтын ылғалдатылған оттегі беріп тұру
- 5. Сөткесіне 2 рет кеудесінеқыша қағазынқою. Бұл әрекет баланың демалысын сиретеді ж/е тереңдетеді.
- III-IV дәрежедетуылған шала балаларда ему ж/е жұту шартсыз рефлекстері болмайды. Бұл балаларды тамақтандыру өте қиын.
- Бірінші рет шала туған бала дәрежесіне байланысты анасының емшегіне 3-4 рет тәулігіне беріледі.

Пайдаланылган әдебиет

- 1. *Володин Н.Н.* Новые технологии в решении проблем перинатальной медицины // Педиатрия. 2004. №3.
- 2. *Дементьева Г.Н., Рюмина И.И., Фролова М.И.* Выхаживание глубоконедоношенных детей. Современное состояние проблемы // Педиатрия. 2004. №3. С. 60.
- 3. *Яцык Г.В.* Алгоритмы диагностики, лечения и реабилитации перинатальной патологии маловесных детей. М., 2002.
- . #\"justify\">. Бисярина В.П., Казакова Л.М. Железодефицитная анемия у детей раннего возраста. М., 1979,
- . Прокопцева Н.Л. Патологии недоношенных детей. Феникс, 2007 г.
- . #\"justify\">. #\"justify\">. <http://www.neonatology.narod.ru>



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!

