




Случай № 1

Анамнез заболевания:

- Пациент 56 лет поступил в приемное отделение с жалобами на сильную давящую боль за грудиной продолжительностью 1 час.

ЭКГ при поступлении:


A Electrocardiogram



Данные коронарографии:

- Выявлена окклюзия передней нисходящей артерии
- Выполнена постановка стента с лекарственным покрытием
- После проведения коронарографии пациенту была выполнена вентрикулография

Вентрикулография



**Какое осложнение можно
предположить и какие
действия необходимо
предпринять?**

Фибрилляция желудочков

B Simultaneous Electrocardiographic-Monitor Tracing



Фибрилляция желудочков

- Чаще всего возникает в первые 24 ч после ИМ

Факторы, увеличивающие риск развития фибрилляции желудочков:

Обширный инфаркт

Переднеперегородочный
инфаркт миокарда

Задержка внутрижелудочковой проводимости

Фибрилляция желудочков в сочетании с кардиогенным шоком ассоциирована с 40-60% внутрибольничной летальностью!

Как лечить?

Электрическая дефибрилляция с применением энергии разряда 200— 300 Дж



При неэффективности 2—3 разрядов перед применением следующих разрядов **внутривенно болюсно** вводят **амиодарон в дозе 300 мг**. Менее эффективно в этих случаях применение **лидокаина (100—200 мг внутривенно)**.

Введение препаратов производится на фоне непрерывного наружного массажа сердца!

**Каким образом можно
предотвратить развитие данного
осложнения?**

Раннее применение бета-блокаторов при ОИМ существенно уменьшает частоту возникновения фибрилляции желудочков


Лидокаин для профилактики фибрилляции желудочков не используется, так как повышает риск смерти из-за развития выраженной брадикардии и асистолии



Случай № 2


Анамнез заболевания:

- Пациент 67 лет поступил в приемное отделение с жалобами на жгучую боль за грудиной, которая длится около 12 часов
- На ЭКГ: элевация ST в отведениях II, III, aVF



**Что Вы видите на
вентрикулографии?**


Разрыв свободной стенки ЛЖ




15-30% случаев смерти от ОИМ приходится на долю разрыва свободной стенки ЛЖ

Данное осложнение ассоциировано с обширными инфарктами и расширением зоны инфаркта

**Разрыв
стенки ЛЖ**



**Острый
гемиперикард**



ТАМПОНАДА



Случай № 3

Анамнез заболевания:

- Пациентка 64 лет поступила в приемное отделение с недавно перенесенным нижним инфарктом миокарда
- 2 недели назад в течение 3 дней жаловалась на загрудинные боли, ей была проведена коронароангиография в другой больнице
- По данным проведенной КАГ в другой больнице: тотальная окклюзия ПКА, 70% протяженный стеноз ПМЖА
- Попытка стентировать ПКА не удалась

При поступлении:

- Гемодинамически нестабильна
- АД 90/60 мм рт ст
- ЧСС 100/мин
- ЧДД 25/мин

Данные физикального обследования:

- Систолический шум на верхушке
- Хрипы в нижних отделах легких с обеих сторон



**Предварительный диагноз?
Необходимые методы
исследования?**

19 Jan 06

7:47:44 am

TE-V5M

59Hz

6.0MHz

120mm

TEE

General

Lens Temp=39.0°C

65dB

S1/ 0/1/ 4

Gain= 8dB


Δ=1

Store in progress



0:07:59

HR=102bpm




Разрыв заднемедиальной сосочковой
мышцы



Острая митральная регургитация

**Почему разрыв заднемедиальной
сосочковой мышцы происходит гораздо
чаще, чем переднелатеральной?
Вопрос был в тестовых вопросах на
аккредитации!**

Передняя створка
митрального
клапана



Сухожильные
хорды

Задняя
створка
митрального
клапана

Заднемедиальная
сосочковая мышца


Переднелатеральная
сосочковая
мышца

Передняя створка
митрального
клапана

Переднелатеральн
ая сосочковая
мышца


Заднемедиальная
сосочковая мышца

Задняя створка
митрального клапана




TheMitralValve.org

Переднелатеральная
сосочковая мышца




Получает
кровообращение из
2 сосудов: ПМЖА и
ОА




Разрыв происходит
редко!

Заднемедиальная
сосочковая мышца



Получает
кровообращение из
1 сосуда:
задней
межжелудочковой
ветви (ПКА)



Разрыв
происходит чаще
из-за худшего
кровообращения!



Случай № 4

Анамнез заболевания(1):

- Пациент 50 лет поступил в приемное отделение с диагнозом повторный инфаркт миокарда
- Предыдущий ИМ перенес 3 месяца назад, по поводу которого он прошел стационарное лечение и курс реабилитации
- Находился на постоянной поддерживающей терапии бета-адреноблокаторами, статинами, антитромбоцитарными препаратами.

Анамнез заболевания(2):

- На протяжении 2 суток пациент находился в состоянии кардиогенного шока, отмечались явления рецидивирующего отека легких.
- Параметры центральной гемодинамики поддерживали при помощи инфузии симпатомиметиков (добутамина и допамина).
- У больного в динамике наблюдалось повышение с последующим закономерным снижением уровня кардиоспецифических ферментов (общая креатинфосфокиназа от 1708 до 184 МЕ/л (N 35–200 МЕ/л) и АСТ от 107 до 37 МЕ/л (N 11–40 МЕ/л) в течение 5 суток наблюдения).

- **По данным ЭхоКГ** : у больного отмечается дефект боковой и заднебоковой стенки ЛЖ с формированием аневризмы (приблизительный объем — около 200 мл).
- Полость аневризмы содержит большое количество **тромбов**, которые в основном локализуются по ее краям, наблюдается феномен спонтанного контрастирования кровотока.



Рисунок 2. Эхокардиографическая картина псевдоаневризмы



Рисунок 3. Ток крови в полость псевдоаневризмы





Рисунок 1. Схематическое изображение
псевдоаневризмы

Истинная аневризма



Ложная аневризма






Рисунок 4. Контрольная эхокардиография

Больному была проведена резекция аневризмы (псевдоаневризмы) левого желудочка с тромбэктомией и пластикой разрыва боковой стенки левого желудочка, аортального клапана.

Осложнения ИМ:

Тип осложнения	Проявления:
Ишемические:	Ранняя постинфарктная стенокардия, рецидивирующий ИМ
Механические:	СН, кардиогенный шок, острая митральная недостаточность, аневризмы, разрывы
Нарушения ритма:	Предсердные/желудочковые аритмии, нарушения проводимости
Эмболические:	Инсульт, тромбоэмболии
Воспалительные:	Перикардит

Осложнения ИМ (в хронологическом порядке):

Осложнение	Пояснение:
1.Нарушения ритма	Чаще всего возникают в первые несколько дней после ИМ Частая причина смерти на догоспитальном этапе и в первые 24 часа после ИМ
2.Постинфарктный фибринозный перикардит	В первые 1-3 суток после ИМ (инфильтрация нейтрофилами-асептическое воспаление-отложение фибрина)
3.Разрыв сосочковых мышц	На 2-7 сутки после ИМ. Разрыв заднемедиальной сосочковой мышцы-чаще!

Осложнения ИМ (в хронологическом порядке):

Осложнение	Пояснение:
4.Разрыв межжелудочковой перегородки	На 3-5 сутки после ИМ Макрофаги принимают участие в резорбции некротических масс, фибробласты участвуют в фибриллогенезе (изначально грануляционная ткань тонкая-риск разрыва!!!)
5. Формирование псевдоаневризмы ЛЖ	На 3-14 сутки после ИМ. Стенка аневризмы образована перикардом и тромботическими массами.
6. Разрыв свободной стенки ЛЖ	На 5-14 сутки после ИМ (миомаляция)

Осложнения ИМ (в хронологическом порядке):


Осложнение	Пояснение:
7. Образование истинной аневризмы ЛЖ	Через 2 недели после ИМ (образование рубца), после механических осложнений
8. СН, отек легких	В результате уменьшения сократительной способности миокарда
9. Синдром Дресслера	Через несколько недель после ИМ (аутоиммунное поражение серозных оболочек-фибринозный перикардит)





Случай № 5

Анамнез заболевания:

- У пациентки 67 лет развивалась сильная боль слева после кашля.
- Боль длится 10 дней, не купируется анальгетиками, сопровождается одышкой
- К тому же пациентка заметила некую припухлость слева в грудном отделе
- В анамнезе ХОБЛ, АГ
- Курильщица



Рентген ОКГ и КТ



Грыжа легкого — выпячивания
лёгочной ткани в подкожную
клетчатку через естественные
отверстия или патологически
возникшие дефекты грудной стенки.