УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАПЕВТИКА В УРОЛОГИИ

Отделение урологии ГБУЗ ГК БСМП Улан –Удэ 2014

введение

- Применение ультразвука помогает ускорить и улучшить лечение.
- безопасно для пациента и уменьшает количество врачебных ошибок.
- В Европе и США курсы по применению УЗИ в неотложных состояниях включены во все программы переподготовки врачей.

Российская академия последипломного образования

- В составе Академии 6 факультетов:
- В структуру Академии входят более 100 кафедр,
- В Академии работана академиков РАМН,



ЦКБ №1 ОАО РЖД



Зав. кафедрой эндоскопической урологии профессор, д.м.н. Теодорович О.В.



Первые аппараты узи



Современные аппараты узи






Новый метод скрининг диагностики рака

• Гистосканинг простаты. Специальная программа обрабатывает результат трансректального УЗ исследования и выдает результат наиболее вероятных мест локализации рака в простате. С этих мест берется биопсия простаты

Эластография

• В основе методики лежит определение плотности ткани с помощью ультразвука. Программное обрабатывает принятый отраженный сигнал и отражает на экране в формате







Сканограмма нормальной правой почки



Расширение лоханки и чашечек




Киста почки




Камень почки



Камень мочеточника




Опухоль почки



Камень мочевого пузыря




Опухоль мочевого пузыря



Аденома простаты











Простата после ТУР





Острый везикулит





Полный перекрут яичка





<u>Интервенционный ультразвук</u>

- УЗИ в качестве метода контроля за безопасностью чрескожных пункционных вмешательств на почках было предложено в 1972 г. датскими и американскими исследователями.
- Появляются также сообщения о выполнении чрескожных пункционных вмешательств под ультразвуковым контролем у детей, в том числе у новорожденных и детей раннего возраста.

<u>Интервенционный ультразвук</u>

- Установка чрескожных нефростом
- Антеградная пиелография
- Биопсия органов мочеполовой системы
- Дренирование абсцессов
- Установка цистостом
- Интраоперационное узи

<u>адаптеры на ультразвуковые</u> <u>датчики</u>








Датчик с адептером



<u>Чрескожная пункционная</u> нефростомия (ЧПНС)



- определяют положение почки.
- По адаптеру проводят пункцию ЧЛС иглой с мандреном нижнего или среднего сегментов почки
- по внутреннему просвету иглы проводят жесткий проводник
- По проводнику расширяют канал бужами
- ИСТАНАВПИВАЮТ ПИСНАМ

<u>Чрескожная пункционная</u> <u>нефростомия</u>




<u>Показания к ЧПНС</u>

- Определение функции гидронефротически измененной почки
- Обструктивный пиелонефрит
- Нарушение пассажа мочи после дистанционной литотрипсии
- Отведение мочи при сдавлении дистальных отделов мочеточников опухолевым инфильтратом
- Осложнения гинекологических операций (перевязка или пересечение мочеточника

Осложнения ЧПНС

- повреждение внутрипаренхиматозных сосудов
- перфорация лоханки проводником
- образование сгустков крови в ЧЛС
- уринома
- смещение дренажа
- пристеночный абсцесс
- пиелонефрит
- сепсис

<u>Пункция кисты почки</u>



- определяют положение почки.
- По адаптеру проводят пункцию ЧЛС иглой с мандреном нижнего или среднего сегментов почки
- Эвакуируем содержимое кисты
- Вводим склерозант
 95% спирт


Показания к пункции кисты почки

- большие (более 4—5 см в диаметре) кисты
- боль
- нарушение уро- и гемодинамики
- артериальная гипертензия обусловленная кистой
- прогрессирующее нарастание почечной недостаточности
- гематурия
- нагноение кист

Противопоказания к пункции кисты почки

- терминальная стадия ХПН.
- прием препаратов, разжижающих кровь («Гепарин», «Аспирин», «Варфарин» и их аналоги). Их следует отменить минимум за 7 дней до операции;
- нарушение функции свертывания крови (например, при тромбоцитопении или гемофилии).

биопсия простаты






- определяют положение простаты.
- По адаптеру проводят иглу биопсийного пистолета
- Выполняют забор гистологического материала из 12 точек соответственно зональному


Показания к биопсии простаты

- подозрение на раковые изменения при ректальной пальпации
- изменение нормальной структуры предстательной железы при трансректальном УЗИ, сопровождающееся нарушением симметрии и наружных контуров предстательной железы;
- дифференциальная диагностика рака в аденоматозно измененной предстательной железе.

Троакарная эпицистостомия




Дренирование абсцесса простаты



УЗИ датчики

Лапороскопический

Пальцевой датчик



<u>Выводы</u>

- Ультразвуковой метод стал неотъемлемой частью современной урологии.
- Ежегодно появляются новые научные работы основанные на УЗИ методе исследования такие как гистосканинг и эластография
- Разработка сверхчастотных датчиков УЗИ
- Разработка лапороскопических и миниатюрных датчиков и аппаратов

