

Алкадиены




Непредельные
углеводороды



ОДНИМ СЛОВОМ

- Образование в молекуле единого делокализованного электронного облака в результате перекрывания негибридизованных p – орбиталей называется
- Связь, где двойные связи сосредоточены у одного атома углерода называется
- Свойство каучука при воздействии силы растягиваться, а после снятия нагрузки сжиматься, принимая прежнюю форму называется

- Связь, у которой две двойные связи разделены по меньшей мере двумя простыми связями называется
- Состояние устойчивости системы за счет единого делокализованного электронного облака называется
- Связь, у которой две двойные связи разделены одной простой связью называется
- Процесс нагревания каучука с серой называется
- Диеновые углеводороды имеют общую формулу

являются алкадиенами





Назовите данные вещества,
составьте структурные формулы
возможных изомеров, укажите два
ближайших гомолога.

Решите задачи:

- Рассчитайте относительную плотность паров изопрена по водороду и воздуху.
- Какой объём водорода (н.у.) потребуется для реакции полного присоединения к 32,4 г бутадиена – 1,3?
- Вычислите объём этанола (плотность 0,8 г/мл), необходимого для получения 500мл бутадиена – 1,3, если выход продукта реакции составляет 75% от теоретически возможного.

- Составьте схему строения гуттаперчи, если она представляет собой транс – 1,4 – полиизопрен.
- Составьте уравнения реакций получения бутадиена из метана.
- Составьте уравнения реакций получения бутадиенового каучука из бутана.
- Как можно получить изопрен из метана.